

(Convulsions) উৎপাদন করে। মস্তিষ্কের উক্ত প্রকারের অবস্থা ক্রমে মস্তিষ্কের কোমলতা বা কঠিনতায় পরিণত হইয়া শরীরের স্পর্শ জ্ঞান রহিত (Anæsthesia), পক্ষাঘাত, পেশীকম্প, শারীরিক এবং মানসিক শক্তির ক্ষয় বা হ্রাস হওয়া হেতু মায়ুশূল, মূগীরোগ, অথবা উক্ত প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত দারিদ্ৰিক অসুস্থ প্রকাশ পায়। মূত্রকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ মূত্রকোষের দানাবৃক্ক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration of the kidneys) হয় এবং তদরূপই আলবুমিনুরিয়া বা মূত্রকোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's disease) নামক রোগ এবং অন্যান্য প্রকারের মৌজিক রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বিবাক্ত হইলে সীসা জনিত শূল বেদনা বা চিত্র করের শূল বেদনা (Lead Colic or Painter's Colic) উৎপন্ন হয়, যাহার দরুণ অন্ত্রের কোলন (Colon) নামক অংশের সংকোচনের উদ্বেক হইয়া উদরের মধ্যে ভরানক কষ্টদায়ক এবং আক্কেপিক্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কোষ্ঠবদ্ধ বর্জমান থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে অশক্তি ; সকল বিষয়েই বৈরাগ্য (কস্, কন্-আস্) ; অরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড, নেট্রাম্-মিউট, নাক্স-মক্, মার্ক্, কস্-আস্) ; কথা বলিবার সময় কথাবোধ্য শব্দ অরণ হয় না (ডাক্) ; সর্বদা নিস্তব্ধ এবং বিষম ভাব ; উগ্র বা এলো মেলো প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখাকৃতি বিকৃত হওয়া ; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং অশান্তি ; কথা বলিতে এবং কোন কার্য করিতে অত্যন্ত প্রান্তিবোধ এবং অনিচ্ছা ; বাচিকে অনিচ্ছা,—জীবন যেন একটা বোঝাই জাহাজ বোধ হয় ।

মস্তক । মাথাধোরা ; যথার, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ ; মাথা ধরা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্য হইতে মস্তিকে একটা গোলায় জাহাজ পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে ; মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া ; চক্ষুর জ্ব এবং গৈঁপ (সোছ) পড়িয়া যাওয়া ।

**চক্ষু ।** চক্ষুর যেতাংশ হরিত্রাবর্ণ (চারনা, কষ্ট্, চেলিডন্) ; চক্ষু দিয়া পৃথি পড়া ; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ভবন দেখায় ; দৃষ্টির বিনাশ ; আভাবিক অপেক্ষা বড় হইলে যেক্রপ হয়, চক্ষুর গোলকে সেরূপ বেবনা বা বাতনা (কস্-আস্, স্পাইজেল্) ; চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত (কষ্ট্, জেল্‌স্, নাইট্‌ক্-আস্, ওপিয়াম্) ; চক্ষু তাহা বিস্তৃত ; কুয়া-লার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেক্রপ হয়, চক্ষে সেরূপ আঙ্গা দেখা ; নূরের বস্তু দেখিতে অশক্তি ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল মৃত দেহের জাঘ শিটা, মলিন হরিত্রাবর্ণ ধা ফিকা (কার্কো-বেজ্) ; মুখপানে তাঁক-ইলে মসল উবেগ বা বাতনার চিহ্ন লক্ষিত হয় (আস্, ক্যাম্‌ফার, বিরেট্-আর্) ; দাঁতলাগা (সিকুটা, ইয়েস্, হায়োস্, লরোস্) ; হস্তাধির নিম্নস্থিত গ্রাহির ক্ষীতি ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** শ্রাড়ির ধার দিয়া আগা গোঁড়া স্পষ্ট নীলের রেখা পড়ে ; জিহ্বা শুক এবং সাধা ; জিহ্বার পক্ষাঘাত, বাহার দরুণ জিহ্বা মুখের বাহির করা যায় না (কষ্ট্, ডাক্, জেল্‌স্, ল্যাক্, হায়োস্) ; জিহ্বার ধার লাল বর্ণ এবং উহার মধ্য ভাগ কটা বর্ণের জার-বুক (Furred-tongue) (ব্যান্ট্, কস্) ; মুখের মধ্য শুক (এগিল্, আস্, আই, নান্স-মক্, পাল্‌স্) ; মুখে মিট শব্দ (ইকুলাস্, আই, মার্‌ক্-কর, লাল্‌ক্) ; ভালরূপে মুখ সঞ্চালনে অশক্তি ; মুখে প্রচুর পরিমাণ মিট শব্দ বিশিষ্ট লালের সঞ্চার, অগচ গলার মধ্যে শুকাযুক্তব ; মুখে পচা ভগ্নকয়ুক্ত বা ; জিহ্বা ক্ষীত এবং উহাতে ভারি বোধ ; জিহ্বা হরিত্রা বা সবুজের আভাবুক্ত লেপ বিশিষ্ট ; কথা বলিতে অশক্তি ; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যের সঙ্কোচন (বেল্, হায়োস্, ট্রামন্) ; টন্‌মিল ক্ষীত, প্রদাহকৃত এবং কঠিন (বারাইট্-কার্ক্) ; গলার মধ্যের পক্ষাঘাত এবং তদরূপ কোন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি (বেল্, ওপিয়াম্, নান্স-মক্) ; গলার মধ্য দিয়া উপরের দিকে যেন একটা গোলার জার কোন পদার্থ টেলিয়া উঠিতেছে এরূপ অস্বভূত হয় ; একটা শোকা যেন হায়া দিয়া গাঠিতেছে আচার বহাগলনালীতে এরূপ অস্বভূত হয় ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** হৃদা শুষ্কতা (আলাম, আস্, চারনা,

কন্স); অত্যন্ত প্রবল সিগাসা (একন্স, আস্, ব্রাই, মার্ক্, কন্স-আন্স); মিষ্ট বা টক উদ্ভাবের উঠা (কার্বো-বেজ্, নাক্স-বন্স কন্স, লাল্ কন্স); হৃদয়কৃত উদ্ভাবের উঠা (ক্যাম্, সিগিয়া, ক্রিয়াজ্, বিরেট্-আলব্, কন্স); উদ্ভাবের আহাৰ জ্বা, মলসংযুক্ত পদার্থ, অথবা কটার আভায়ুক্ত বা কাল্চে পদার্থ বমন (আন্স, কন্স); পাকস্থলী প্রদেশে চাপা এবং আঁটা বোধ; হিক্কা; পাকস্থলীতে ভারিবোধ এবং কন্কনানি; পাকস্থলীতে বাটিয়া ধরার জ্বর খিল ধরা। উদরে শূল বেদনার জ্বর বেদনা; উদর পৃষ্ঠদেশপানে আক্কেট (চেলিডন্, পডোফ্, টেবেকাম্); অস্ত্রে অত্যন্ত বাটিয়া ধরার জ্বর বাতনা; নাতি যেন উচু হয়; উদরের উপরস্থিত পেশীগুলি কঠিন এবং উহার স্থানে স্থানে গোলার জ্বর স্কীত; নাতি প্রদেশে অসহ্য বেদনা বা বাতনা যাহা উদরের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; চাপ দিলে বেদনাদির কতক উপশম হয়; উদরে কর্তনবৎ বা চিন্তিনে বেদনা; উদরে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুলি দ্বারা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং জ্বালা উৎপাদক বায়ু নিঃসরণ।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ; মল পরিমাণে অল্প, হয় নেন্ত, নতুবা ভেড়ার মলের জ্বর গোলার জ্বর শুট্‌লি শুট্‌লী (আলান্, ক্যালী-কার্ক্, ওপিগাম্, ম্যাগনেস্-মিউর), কাল বা সবুজ রঙ্গের; মল অতি কঠে নির্গত হয়; অনেক কাল ধরিয়া উদরাময় এবং মল হরিদ্রারব; মলত্যাগের সময় গুলি দ্বারের কষ্টদায়ক সঙ্কোচন এবং উহাতে বাটিয়া বা কসিধা ধরার জ্বর অহতুত হওয়া।

মূত্রযন্ত্র। প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত কষ্টানুভব; মূত্র ফোঁটার ফোঁটার নির্গত হয় (একন্স, বেল্, ক্যাঙ্ক্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না; মূত্রাবরোধ বা মূত্র নালীর গোড়ার আক্কেপ (মার্ক্-কর); মূত্র কাল্চে এবং পরিমাণে অল্প (অস্-মিয়াম্); মূত্র আল-বুমেয়ুক্ত (মার্ক্-কর, অস্-মিয়াম্, কন্স, ফাইটোল্); মূত্রনালী দ্বারা রক্ত নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের জীসহবাসের ইচ্ছা থাকে না (আগ্-নাশ্, আর্জেন্ট্-নাইট্‌ক্, ক্যাঙ্কার), অথবা জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গ বারবার খাড়া হওয়া (আগারিকান্স; ক্যান্স, গ্রাফ, নাই-ট্রিক-আন্স); পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষাধারের প্রদাহ এবং ক্ষীতি; অণ্ডকোষের সংকোচন, উহাতে বাটগা ধরার জ্বার অহুত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তরু নিঃসারক সূত্রে (Spermatic Cord) চিড়িক মারা। জীলোকের যোনিদ্বারের আক্ষেপ (হামোমেসিস); শ্বেত প্রদর; শুনে দুই না থাকা।

শ্বাস যন্ত্র। অল্পকাল স্থায়ী, শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি এবং গলা দিয়া পূর্ব সংযুক্ত বা রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গমন (চারনা, ডাল্‌ক, ক্যালী-কার্ক, লাইকোপ্‌, ফস্‌, মিলিয়া, সাইলিসি); ফুফুসে, পুষের সঞ্চার (ফস্‌); বৃক্‌ চাপা বোধ (সোরিনাম); শ্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে বংশ্বশে বোধ; শ্বাস প্রাশাস কষ্টকর বা হাঁপানির জ্বার; আক্ষেপিক হাঁপানি কাশি; বৃক্‌ এবং পার্শ্বে খোঁচাবিধাব জ্বার বেদনা বা বাতনা, যাহার দরুণ অনেক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসেব ব্যাঘাত ঘটে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অত্যন্ত বেদনা বা বাতনা,—উরুদেশে পেশীতেই এই বেদনা অধিক অহুত হয় এবং সঞ্চার সময় ও রাত্রিতে যাহার বৃদ্ধি হয়; কটিবাত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানের পেশীকর এবং তদরুণ চলিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পন্দন এবং ঝাকনি; হাত পায়ে পাতা ঠাণ্ডা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের জ্বার অবশবোধ; মনিবন্ধের পক্ষাঘাত; হাত কাঁপে; নিদ্রাঙ্গ নায়ুশুলের জ্বার প্রবল বেদনা, বাহ্য কুচকি হইতে ইটু পর্যন্তই অধিক অহুত হয় এবং বাহ্য ক্রমাগত বর্ধমান না থাকিয়া বোধীকে থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ করে; উরুদেশ এবং পায়ে পাতার পক্ষাঘাত।

চক্ষু। চক্ষু শুষ্ক, হরিজা বর্ণ (ট্রাই, চায়না), অপবা নীলের আভাস্ত (ল্যাক)।

নিদ্রা। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা।

বাসহারা। কেঠিবড়; শূল বেদনা; ব্রায়শূল; কটিবাত; পক্ষাঘাত; আক্ষেপ (Convulsions); মৃগীরোগ; বক্ষাকান্স; কামলরোগ; মূত্রকোষের ট্রাইট্‌স্‌ ডিজিজ্‌ বা আল্‌বুমিনারিয়া; যোনিদ্বারের আক্ষেপ; হিষ্টেরিয়া;



মস্তিষ্কের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস পায় ; পেশীকর বিশিষ্ট পক্ষাঘাত এবং তদনুসারে আক্রান্ত স্থানের পেশীর স্পন্দন ও উহাতে স্পর্শজ্ঞান না থাকা ; মণিবন্ধের পক্ষাঘাত ; মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জার পুরাতন প্রদাহ ; স্থানিক আক্ষেপ বা খিলখরা ; মলত্যাগের সময় গুরু এবং গুরু ঘরের আক্ষেপ ; আল্‌বুমিনিয়া জনিত অন্ধতা ; ধর্মোন্মত্ততা (Religious Melancholia) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ; ক্রীলোকের মূর্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; ডাক্তার বেয়ারের মতে পুরাতন আকারের মাথা ধরার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং মানসিক অবসন্নতা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত শীর্ণ হওয়া (আল্‌. ফস্‌নেট্রা-মিউর) ; পেশীকর, বিশেষতঃ পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গের পেশী কঠিন, রক্তাক্ততা ; স্পর্শজ্ঞান রহিততা ; স্পর্শজ্ঞানের অতিরিক্ত চেতনা ; আক্ষেপ ; সার্বজনিক বলক্ষয় ; গা মাটি মাটি করা বা অলসবোধ ; মূচ্ছার ভাব ; সমুদ্র শরীরে সন্ধিবাৎ বা ব্রাহ্মণুলের জায় বেদনা ; ঘর্ম্ম একবারেই হয় না ; পক্ষাঘাত হওয়ার পূর্বে মনের বিকার, শরীর কল্পন, আক্ষেপ বা বৃহৎ ব্রাহ্ম প্রদেশে খোঁচা বা ছুরী বিধানের জায় বেদনা বা বাতনা ; পুরাতন আকারের মৃগী-রোগ, বাহার আক্রমণের পূর্বে পায় ভারি ও অবলবোধ এবং জিহ্বা ফীত হয় ; আক্রমণের পর রোগী অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথার গোলমাল এবং অবসন্নতা অগ্রভব করে ; রাত্রিতে বিছানার শয়ন করিয়া থাকিলে, জলাদি পান করিলে অশ্রুতের বৃদ্ধি ; এবং আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে অশ্রুতের উপশম ইত্যাদি প্রাথমিক কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । প্রাথমিক কার্যের সঙ্গে আলুমিনা, ওপিয়াম, প্রাটিনা এবং জিঙ্কামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহাও কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ক্যাঙ্কেরিয়া কার্বোনিকা, লাইকোপডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, কফরাস, রাস্‌টক্স এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আলুমেন্‌, আলুমিনা, বেলাডোনা, ককি-উলাস, হায়োসায়ামাস্‌, নাক্স-ট্রিকা, ওপিয়াম, প্রাটিনা, ট্র্যামোনিয়াস্‌, জিঙ্কাম ইত্যাদি প্রাথমিক প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১২ ক্রমও ব্যবহৃত হয় । পুরাতন আকারের মুগী-রোগে এই ঔষধের ৩য় দশমিক ক্রমের ঙ্গাড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায়, প্রতিদিন ২ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিয়া ২১৩ টি রোগীর চিকিৎসার বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

### পাল্‌সেটিল্লা,—পাল্‌স্ ।

( PULSATILLA,—PULS. )

আর্শেনী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, রুসিয়া, তুরস্ক দেশের বালুকাময় স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশের কোন কোন স্থানে এই গাছ জন্মে । ফল হওয়ার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া ইহার ছাল, বাকল, পাতা মূল বা শিকড় ইত্যাদি গাছের সমুদয় অংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া যথা-নিযমে প্লেস্ট্রিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় শ্লেষ্মিক ঝিল্লী এবং সাইনোবিয়াল ঝিল্লী ( Synovial Membranes ), শিবা, চক্ষু, কর্ণ এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়, প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ার উপর এই ঔষধের কার্য্য অতি প্রবল । শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার বা বৃদ্ধি হইয়া নিঃসরণের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, বা কখন কখন উহার সঞ্চারের বাধাও ভাঙে । শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর নিঃসরণের অতিরিক্ত সঞ্চার হয়, শ্লেষ্মা নিঃসারক বস্তুর কার্য্যের বাধাও ভাঙে, ভ্রাণবিক মণ্ডলী উত্তেজিত এবং অবসন্ন হয়, এবং তদরূপ অজীর্ণ, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, জননেন্দ্রিয় এবং মূত্র যন্ত্রের অসুখ, চক্ষু এবং কর্ণের শ্লেষ্মা জনিত অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পায় । শ্লেষ্মা জনিত অসুখ উৎপন্ন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি বা শক্তি বিশেষ । মস্তিষ্ক এবং কশেরুকা মজ্জার উপর কার্য্য করার শক্তি থাকার দরুণ, শ্লেষ্মা উৎপাদন করার ক্ষমতা ব্যতীতও জননেন্দ্রিয়ার উপর ইহার অল্পপ্রকার কার্য্য করার শক্তি আছে । সাইনোবিয়াল ঝিল্লীতে (Synovial Membranes) ইহা পেশী এবং সন্ধি-

বাতের জ্বর প্রদাহ এবং শিরার প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি ও বিস্তৃতি উৎপাদন করে। 'জীলোকের জননেল্লিরের' উপর প্রবল কার্য, জীলোকের শান্ত প্রকৃতি বা স্বভাব, সহজেই সকল বিষয়ে সম্মত হওয়ার স্বভাব, এবং সামান্য কীরণেই কঁাদা বা দুঃখ প্রকাশ করার স্বভাব এই ঔষধের কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন । শাস্ত, ভয়, ভীতু এবং সমুদয় কার্যেই সহজে সম্মতি দেওয়ার এবং সামান্য কারণেই কান্দাব্যর স্বভাব (এপিস, নেট্রাম-মিউব, নাক্স-বম্, ইয়েস, লিনিয়াম্ টাইগ্রিনাম্); মূত্ৰা নিকটবর্তী একপ ভাবিলে ঘেরূপ হয়, মনের সেক্রপ উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কাঁপনি (একন্, আস্); রাত্রি এবং সন্ধ্যার সময় মনে ভূতের ভয় (একন্, আস্); সন্ধ্যার সময় হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা, যাঁহাব দরুণ রোগী আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হয়; গরমে ঘে রূপ হয়, রাত্রিতে মনের সেক্রপ উদ্বেগ; বিরক্ত না হইলেও সর্বদা বিড়্-বিড়্ এবং আঁকার করার স্বভাব; নিজের অবস্থার বিষয় ভাবিয়া মনের মালিন্জ এবং কোন বিষয়ই ভাল না লাগা (নাক্স-বম্); সর্বদা চটী, অসন্তুষ্ট এবং খিট্-খিট্ করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্)।

মস্তক । মাথার গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যেন মাথার মধ্যে কিছু নাই; নেসা করিলে ঘেরূপ হয় সেক্রপ মাথাঘোরা (ককিউলাস্, চায়না, নাক্স-বম্, রাস-টল্); মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে মাথাঘোরা (বেল্); প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই মাথা-ঘোরা (ব্রাই), যাঁহার দরুণ বোণী পুনরায় শয়ন করিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে মাথাঘোরা; মাথার চিমাযোধ এবং মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁৎলিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, কণালে সেক্রপ অতৃপ্ত হয় (চায়না, পালস্, সাজুনেবিয়া); শিরঃশীড়, যাঁহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটা যাইবে (ব্রাই, ক্যাম্প্, নেট্রাম-মিউব) এবং মস্তক হইতে পালস্, সাজুনেবিয়া পরিমাণে বাগ্ম মাথা ঘরা (ব্রাই, হাপপাক্, প্যাসিস্, নাক্স-বম্)। তৎক্ষণাত্ যুক্ত দ্রব্য খাইয়া মাথাধরা; মাথার পশ্চাৎভাগে, এক পার্শ্বে কঁটা ঘাঘরা

মাথার ভ্রায় ঐবল বেদনা বা ব্যতনা ; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার সময় চক্ষে কনকনানি, মাথায় চাপিয়া ধরার ভ্রায় নপ্পা পিয়া বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বাহার উপশম হয় (এপিস্, আর্জেন্ট্-নাইট্‌ক্) ; কপালে,— চক্ষুর উপরিভাগে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা, চক্ষু উপরের দিকে উঠাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাত্তাগে ও সমুদয় মাথার মধ্যে সূচীবিধানের ভ্রায় বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা ব্যতনা ; সন্ধ্যার সময় মাথায় নপ্পা পিয়া বেদনা বা ব্যতনা (নাক্স-মক্) ; কপালের দুই পার্শ্বে এবং কর্ণের পশ্চাত্তাগে চাপিয়া বা বাটিয়া ধরাব ভ্রায় বেদনা ; আহারের পর মাথা ঘোরা ; মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ; মাথা ধবা, সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্-কীৰ্ম্ম এবং প্রচাপনে বাহার উপশম হয়।

চক্ষু । চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার শুষ্কত্ব এবং কেতুব হইলে যেরূপ হয়, উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখার দরুণ ব্যাধার চক্ষু মুছিয়া ফেলার ইচ্ছা (আলাম্, ক্রোকাশ্) ; বাণি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, পুত্ৰকাদি পড়িবার সময় চক্ষে সেরূপ চাপাবোধ (আস্, কষ্ট্, ইম্বেস্, নেট্রাঙ্-মিউর, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর যোজক কিল্লীর প্রদাহ এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের ক্রেন নিঃসরণ ; চক্ষে জালা এবং চুলকানি, বাহার দরুণ ব্যাধার চক্ষু চুলকাইতে বা রগড়াইতে ইচ্ছা হয় ; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং তদরূপ চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং ত্রাক্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকা (আলাম্, এথ্‌জা, ক্যাক্-কার্ক্, লাইকোপ্, গ্রীক্, মার্ক্, সাল্‌ক্) ; চক্ষুর পাতায় ব্রণ (Styes), বিশেষতঃ চক্ষুর উপরের পাতার (লাইকোপ্, গ্রীক্) ; সন্ধ্যার সময় চক্ষুর পাতা এবং উহার কোণে চুলকানি, কামড়ান এবং জালা ; বাতাস লাগিলে বা ঘরের বাহির হইলে চক্ষু দিয়া জল পড়া (সাল্‌ক্) ; কুরাসা বা সৰু বা মিহি কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপ্সা দেখা (কষ্ট্, হায়োস্, লরোস্, কস্, মার্ক্, পিটোল্, রানান্‌কুলাস্, সাল্‌ক্) ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (ডাল্‌ক্) ; উক ঘরে গেলে চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার দেখা।

**কর্ণ।** কর্ণের বহির্দেশ লালবর্ণ এবং ক্ষীত (একন্, বেগ্, এপিস্) ; কানের মধ্যে বেদনা, যাহা ছুবিধিধান বা ছিঁড়িবা ফেলার আয় অনুভূত হয় (বেগ্, সাইলিন) এবং বাহ্যিতে কানের মধ্যে দপ্‌দপিয়া বা চিড়িক মারার আয় বেদনা বা যাতনা (মার্ক্), কানে অত্যন্ত প্রথর বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কান দিয়া কোন পদার্থ জোবে তেলিয়া বাহির হইতেছে ; কোন পদার্থ কানের মধ্যে দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে যেকূপ হয়, কানে সেকূপ কম শুনা ; কান বন্ধ হওয়ার আয় অনুভূত হয় এবং কানের মধ্যে অনেক দূরবত্তী শব্দের আয় সৌ সৌ শব্দ হয় (ক্যাক্-কার্ক্, গ্রাক্, ক্যালী-কার্ক্) ; কান দিয়া গর্জ্জন শ্রোত্রা এবং পূর্ব নিঃসরণ ; কানের মধ্যে হলকুটানের আয় অনুভূত হয় ; হামের পর কান দিয়া পূর্বাদি নিঃসরণ ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কান পাকিয়া পূর্বাদি নিঃসরণ ।

**নাসিকা।** তবল বা শুকনা সন্ধি ; বাবদার হাচি ; স্বাদ বা ঘ্রাণশক্তি থাকে না (আণ্ট-জিট্) ; নাসারন্ধ্র টাটার বা চড়্ চড়্ কবে ; নাকের পাতায় ছাগ উঠিয়া যাওয়ার আয় জ্বালা (লাইকোপ্) ; নাক দিয়া সবুজবর্ণের শ্রোত্রা নির্গমন (গ্রাক্, মার্ক্) ; নাক দিয়া হরিদ্রার আভা-যুক্ত গাঢ় বা তরল শ্রোত্রা নির্গমন ; ঘরের মধ্যে থাকিলে অস্থখের বৃদ্ধি (সিপা, নাজ্-বন্) ; শীতবোধ ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা ; মাথায় গোলনেলে বোধ ; স্মারবিক শিরঃপাড়া (একন্, সিপা, মাজ্-নোরিয়া) ; সন্ধ্যার সময় এবং উষ্ণ ঘবে নানারন্ধ্র যেন কক্ক হইয়া থাকে ; প্রাতঃকালে হরিদ্রা-বর্ণের, অগ্নিদির স্বাদ বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত শ্রোত্রা নিঃসরণ (নাইট্রিক্-অাস্) ; পূর্বাতন সন্ধিতে যেকূপ হয়, নাকের মধ্যে সেকূপ দুর্গন্ধ (মাল্ফ্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি ও রক্তরোধ (ব্রাই, হামামেলিস্, সিপিয়া) ; নাকেব গোড়া চাপাবোধ (একন্, ক্যালী-বাই) ; নাকের হাড়ে বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন হাড় ভিন্নাভন্ন হইবে ।

**মুখমণ্ডল।** মুখমণ্ডল ফিকা, শিটা বা হরিদ্রাবর্ণ ; মুখমণ্ডল পর্যায়ক্রমে লালবর্ণ এবং শিটা বা ফিকা হয় ; নিম্ন ওষ্ঠ ক্ষীত এবং উহার ঠিক মধ্যাংশ ফাটানুত ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য।** বায়ুশুলি একবার কসিয়া ধরিয়া

চর্চাৎ ছাড়িয়া দিলে যেক্রপ হয়, দাঁতের গোড়ায় সেক্রপ খোঁচা বিধার জ্বার প্রবল বেদনা বা যাতনা ; সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, বিছানায় উষ্ণতাতে, দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (কাম্) ; কোন প্রকার গবম দ্রব্য মুখে গইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (কাম্) ; খাওয়ার সময় এবং দাঁত খোঁচাইলে দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি ; দন্তগুণ এবং উদার সঙ্গে সঙ্গে কানে বেদনা, একপেশে মাথা ধরা (মাধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং শীতবোধ ; ঠাণ্ডা জলে দাঁতের বেদনার ক্রমিক উপশম হয় ; বহির্বাযুতে এবং দাঁত অনাচ্ছাদিত রাখিলে দাঁতের বেদনা বা যাতনার উপশম । জিহ্বা শুষ্ক এবং চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; জিহ্বা গাঢ়, সাদা বা হরিদ্রার লেপযুক্ত (ব্রাই, মার্ক্, নাক্স-বম্, পডোফ্) ; লিহ্বার মধ্য ভাগে আগুনে পোড়ার জ্বার জ্বালা (আইরিস্, প্লাটিনা, সাল্ফুনেরিয়া, সাল্ফ্-আস্, বিরেট্-বিবাইট্) ; ভিজা অবস্থায়ও জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ; রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে জিহ্বায় স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ; মুখে অত্যন্ত চূর্ণক্ অবশ্য, আণিকা, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাক্স-বম্) ; মুখের মধ্য এবং অগ্রাধ বহা গলনানীর উপরিভাগ শুষ্ক এবং প্রাতঃকালে স্বাদ বা গন্ধ শূন্য শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; মুখে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট লালের সঞ্চার (কাম্, ফস্) ; প্রাতঃকালে মুখে পচা মাংসের জ্বাৰ স্বাদ, যাহার দক্ষণ বম-নের উল্লেখ হয় (আণিকা, মার্ক্) ; মুখে চট্‌চটিয়া পচা এবং তিক্তস্বাদ, আচারের পরই যাহা অধিক অল্পভূত হয় (লাই, কলোস্, নাক্স-বম্) ; প্রাতঃকালে মুখে বিষাদ ; আগার দ্রব্যাঙ্গ, প্রধানতঃ কটী, তিক্ত লাগে (ব্রাই, চারনা, কলোস্, নাক্স-বম্, সাল্ফ্) ; প্রাতঃকালে মুখে শুষ্কভব, কিছু পিপাসা থাকে না । জল উত্তিয়া গেলে বা চাড়িয়া কেলেলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অল্পভূত হয় (আমন্-কার্ণ, কার্কা-বেজ্, কষ্ট, ফস্) ; প্রাতঃকালে গলার মধ্যে অত্যন্ত তক বোধ (এপিস্, নাক্স-মফ্) ; প্রাতঃকালে গলার মধ্যদেশ চট্‌চটিয়া অগ্নি শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত ; লিহ্বার সময় গলার মধ্যে কসিয়া ধরার জ্বার যাতনা বা চাপাবোধ ; কোন পোকা উপর দিকে হানা দিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এক্রপ অল্পভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । রোগী শাইতে চাহে, কিন্তু কি প্রকারের জ্বা তপ আগিবে রোগী তাহা বলিতে পারে না ; তৈলাক বা চক্ষিযুক্ত

আহার দ্রব্য অকুচি (পিটোল্, ডিপ্‌সাল্‌ফ্); মাংস অকুচি, (গ্রাফ্, পিটোল্); কটীতে অকুচি (নেটাম্-মিউর); মাখনে অকুচি (পিটোল্); হুঙ্ক এবং তামাকে অকুচি (ইয়েস্); মদ্যপানের ইচ্ছা; সকল প্রকার অল্পখেই পিপাসা থাকে না (আন্টি-টার্ট্, এপিস্); আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্যের গন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট ঢেঁকুব বা উদগার উঠা (আন্টি ক্রুড্, কস্, চায়না, গ্রাফ্, ক্যাক্ কার্স্); উদগারে গলাদিয়া তিক্ত, টক, পিত্তযুক্ত উগ্র স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠে (ব্রাই, নাক্স-বম্, ফস্); উদগারে গলাদিয়া পচা মাংসের স্বাদবিশিষ্ট জল উঠা; বমনোদগ; মূখে জল উঠা (লেডাম্, নাক্স-বম্), আহার এবং পানের পর উদগারে বিষী স্বাদ বিশিষ্ট জল উঠা (আস্); প্রাতঃকালে, নরঃপ্রবেশের সময়, নরঃপ্রবেশ হইলে অথবা গর্ভাবস্থায় বমনোদগ (গ্রাফ্, ক্যাকা-কার্স্, নাক্স-মফ্, মিপিয়া), পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পডোফ্; অথবা অনেকক্ষণ পূর্বে যে সকল দ্রব্য খাওয়া গিয়াছে, সেকসকল উদবস্থ দ্রব্য বমন, অথবা আহারের পর বমন; চক্ষিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া পাকস্থলীর অস্থখ (সাইক্লেনেন্, টারেক্সেকাম্; শাকাদি খাইয়া পেটের অস্থখ (টোপকাক্, নাক্স-বম্); ফল বা বরফের কুঞ্জী খাইয়া পেটের অস্থখ; আহারের প্রায় এক ঘণ্টা পর পাকস্থলীতে বেদনা বা যাতনা (নাক্স-বম্); একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেরূপ হব, পাকস্থলীতে সেরূপ ভারবোধ (একন্, ইক্স্লাস্, আস্-ব্রাই, নাক্স-বম্); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙি লেই উক্ত প্রকারের মাণি বোধ অধিক হয়; প্রাতঃকালে এবং আহারের পর পাকস্থলীতে খিল ধবান জ্বাব বেদনা বা যাতনা; ক্ষুধা হইলে যেরূপ হব, পাকস্থলীতে সেরূপ মোচড়টিয়া ধবান জ্বাব যাতনা (এবিস্ কানোভেন্সিস্); আহারের পর পাকস্থলীতে চাপিবা ধবান জ্বাব বা চিন্‌চনে বেদনা; টাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেরূপ যাতনা অহুত হয় (নাক্স-বম্), গুরু জ্বাণা হইলে যেরূপ হব, আহারবহা গলনালীতে সেরূপ জ্বাণা-ব; পাকস্থলীর মধ্যে স্পষ্ট দণ্ডপানি (আন্টি টাট্, আসাফিটিডা)। উদরে দ্বিভ বায়ু সঞ্চার জনিত শূল বেদনা; উদরে প্রবল গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া (লাইকোপ্); উদরের মধ্যে দ্বিভ বায়ু যেন চলিয়া বেড়ায় (আলোজ্, কামো-বেজ্), সঞ্চার সময়ই যাহা

অধিক অম্লভূত হয় ; উদরের নানা স্থানে দূষিত বায়ু ক্রম হইরা স্থানে স্থানে যেন চাপিয়া ধবে, শুষ্কতার দ্বারা বায়ু নিঃসরণও যাহা দূরীভূত হয় না (চোষণ) ; রাত্রি হই প্রহরের পরই উক্ত প্রকারে দূষিত বায়ু অধিক সঞ্চিত হয় : শূল বেদনা এবং পেট কামড়ানী যাহা উদরেক্ষ প্রদেশেই অধিক অম্লভূত হয় ; পাকস্থলী এবং উরুর পূর্ণ, ক্ষীত এবং বিকৃত, সামান্য চাপ দিলেই যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে যেক্রম হয়, উরবে (বার্ণারিস্) এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে সেক্রম চাপাবোধ ; বসিয়া থাকিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ এবং অসাড় হয় ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; প্রসব বেদনায় যেক্রম হয়, নিম্নদিকে তৈলিয়া নামার জায় উরবে সেক্রম প্রবল বেদনা ; আহারের পূর্বে পেট ফাঁপে ; অন্তপ্রদাহ (Enteritis) এবং উহার দ্রুত উদর প্রাচীরে অত্যন্ত বেদনামূলক ; শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং উদরে গড় গড়, কল কল শব্দ হওয়া, — এই প্রকার শূল বেদনা সন্ধ্যার সময়ই অধিক হয় ।

মল এবং মলদ্বার । অন্ধদর্শ বোগ (Blind-Piles) এবং শুষ্কতার বেদনা বা যাতনা ; শুষ্কতার অংশের বলী বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ্, কাক্স-কার্ক, লাক্, মিউক-অস, সাইলিসি) এবং অংশের বলীতে চিড়িক মারি, টাটানি এবং চুলকানি (গাল্ফ্) ; মলত্যাগের পর শুষ্কতার চাপাবোধ, বারম্বার বাহ্যের বেগ, বাহ্যের দ্রুত মনে হয় যেন তবল ভেদ হইবে ; রাত্রিতে পিত্তের জায় সবুজ, জলবৎ তরল ভেদ এবং দাস্তের পূর্বে উরবে গড় গড়, কল কল শব্দ হয় ; সবুজ শ্বেতা ভেদ (এপিস্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক্, অর্স্, বেল্, ইপিকাক্, মার্ক্, সাল্ফ্) ; চট্-চট্ তরল, সরস শ্বেতা মিশ্রিত পদার্থ ভেদ, অথবা কেবল শ্বেতা ভেদ ; বারম্বার ভেদ (মার্ক-কর) ; রক্ত মিশ্রিত শ্বেতা ভেদ হয় বটে, কিন্তু পেট বেদনা বা যাতনা থাকে না ; উদরাময়ের দ্রুত রোগি বিশেষ ভয় হয় না (কস্-অস্) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্টবোধ এবং উরুর সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশে কষ্টদারক চাপ এবং বেদনামূলক ; কলাদি খাটয়া উদরাময় ; তৈলাক বা চর্বিযুক্ত দ্রব্য খাটয়া পেটের অগ্রথ বা উদরাময় ; রক্ত এবং শ্বেতা মিশ্রিত উদরাময় এবং দাস্তের সময় শীত বোধ ।



মূত্রেযন্ত । বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা (ক্যাছ, ক্যাম্প, মার্ক-কর); স্পর্শ করিলে মূত্র কোষ প্রদেশ বেদনায়ুক্ত হয় ; মূত্রাধারে অত্যন্ত চাপা বোধ, কিন্তু মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা থাকে না ; মূত্র ত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্র নালীতে জ্বালামুতব (ক্যানাবিস-স্যাট, ক্যাছ) ; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্র নালীতে কঠিন-বৎ ঘাতনা অস্বভূত হয় ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (আস্, বেগ, হারোস) ; রাত্রিতে স্বপ্নে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ (বিহানায় প্রস্রাব করা) (আণিকা, কুপ্রাম, গ্রাক), প্রবানতঃ ছোট বালিকাগণের কাশিবার এবং বায়ু নিঃসরণের সময় (কষ্ট, নেট্রাম্-মিউর) ; বারম্বার মূত্র ত্যাগ ; প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এগিস্, আপোসাইনাম্, আজেন্ট, সিপ, বার্বেরিস) ; মূত্র জলের ত্রায় বর্ণহীন বা কটাবর্ণ, রক্তমিশ্রিত ; রক্তমূত্র (Hæmaturia) এবং মূত্রের সঙ্গে পুঁষ নিঃসরণ ও মূত্রকোষে বেদনা (আস্, ক্যানাবিস, ক্যাছ, ফস) ; প্রমেহ রোগে ধাতুর ত্রায় ক্রেন নিঃসরণ (ফাইটোল) ।

জননেন্দ্রিয় । উদর হইতে শুক্র নিঃসারক মূত্রের (Spermatic Cord) মধ্য দিয়া অণ্ডকোষে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা ঘাতনা (বার্বেরিস, হামামেলিস, মার্ক) ; অণ্ডকোষের ক্ষীতি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে টাটানি এবং ছিঁড়িয়া ফেলার ত্রায় বেদনা ; অণ্ডকোষাধারের ডাইন অংশের ক্ষীতি (ক্রিমেন্ট) ; পুরুষাঙ্গের গোড়ার প্রষ্টেট্ গ্রন্থির (Prostrate gland) বিবৃদ্ধি ; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে ধাতু নিঃসরণ (চায়না, ফস) ; প্রমেহ রোগে মূত্রনালী দিয়া গাড় হরিদ্রা বা সবুজের আভায়ুক্ত হরিদ্রাবর্ণের ক্রেন নিঃসরণ (আগ্‌নাশ্, হাইড্রাট্) । স্ত্রীলোকের রক্তঃস্রাবের সময় (জরায়ুর অস্থব থাকিলে), একখানি পাথর চাপিয়া রাখিলে ঘেৰুণ হয়, উদরে এবং কোমরের পশ্চাত্তাঙ্গে সেরূপ চাপিয়া ধরার ত্রায় বেদনা বা ঘাতনা (আলাম্, সিমিসিক, কলোফিলাম্) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহজে ঝিঁ ঝিঁ ধরিবার স্বভাব ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; জরায়ুর দিকে কসিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা ঘাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে

বমনোৰ্বেণ ; রক্তঃস্রাবের সময় পায়ের পাতা জলে ভিজার দরুণ হঠাৎ রক্তঃরোধ ; জরাসুর বামপার্শ্বে প্রসব বেদনায় ন্যায় সঙ্কোচক বেদনা, বাহ্যিক দরুণ রোগী হাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অল্পকাল স্থায়ী, স্বল্প রক্তঃস্রাব (সিমিসিক্, সাল্‌ক্) ; একবারে রক্তঃরোধ, নতুবা সবিরাম রক্তঃস্রাব (সিমিসিক্) ; রক্ত গাঢ় এবং কাল্‌চে (ইয়েস্), দিনের বেলা চলিয়া বেড়ানোর সময়ই রক্তঃস্রাব অধিক হইয়া থাকে (কেবল রাত্রিতে রক্তঃস্রাব হইলে ম্যাট্রেন্স্-কার্ক্) ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, অল্পকাল স্থায়ী স্বল্প রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে খিল ধরা ; ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তঃরোধ ; বালিকাগণের গোণে এবং কষ্টকর প্রথম রক্তঃস্রাব (গ্রাফ্) এবং রক্ত কাল্‌চে থানা থানা এবং পচা দুর্গন্ধযুক্ত, অথবা রক্ত সাদাটিয়া শ্লেষ্মার ত্রায পদার্থ মিশ্রিত ; তলপেটে রক্তঃস্রাবজনিত বেদনা এত প্রবল হয় যে উহার দরুণ রোগী বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছটকট করে এবং চীংকার করিয়া কাঁজে ; রক্ত কাল্‌চে এবং গাঢ় বা মাছ মাংস ধোয়া জলের ছায় অত্যন্ত ফিকা লালবর্ণ তরল রক্তঃস্রাব ; চক্ক বা লনির ন্যায় গাঢ় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (ক্যাক্-কার্ক্, কোনাফাম্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্-আস্) এবং উহাও সঙ্গে সঙ্গে ঘোনির ক্ষোভি ; কোন প্রকারের ঘটনা দ্বিতীয় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; উগ্র, জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ (আলাম্, কোনাফাম্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, ফস) ; অনিয়মিত প্রসব বেদনা ; জরাসুর মধ্যে ক্রমের অস্বাভাবিক অবস্থান (বেল্, কলোফিলাম্, নাস্-বম্) ; সম্ভাবন প্রসবের পর স্তনের দুধের হ্রাস বা উত্তার সঞ্চার একবাবে বন্ধ হওয়া (আগ্লাস্, হায়োস্) ; সম্ভাবন প্রসবের পর ঘোনিহার দিয়া দুধের ভার সাদা ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ ; সম্ভাবন প্রসবের পর তলপেটে অত্যন্ত বেদনা (ভাদলির কামড়, —আদ্যার ব্যাথা, —After pains) ; যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বালিকাগণের স্তন ডেলার ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে এবং উহা দিয়া কখন কখন পাতলা দুধের ন্যায় তরল পদার্থ নির্গত হয় ।

খাসবন্ত । কণ্ঠনালীতে হাড়হুড়ী এবং উহাতে টাচিয়া ফেলার ভার অল্পকাল হওয়ার দরুণ চক্ক দিয়া জল পড়ে এবং শুষ্ক কাশির উল্লেখ হয় ;

কঠিনালীতে সঙ্কোচন, রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলেই বাহ্য অধিক অম্লভূত হয়; স্বরভঙ্গ এবং গলার মধ্যে খণ্ড খণ্ডে বোধ, যাহার দরুণ রোগী জোরে একটা কথাও বলিতে পারে না (কষ্ট, হিপ্পোসাল্ফ, ফস্); সন্ধ্যার সময় বা রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে শুষ্ক কাশি (কোনায়াম্, মেজি-রিয়াম্, নাক্স-বম্, কমেস্, সাল্ফ); বিছানার উঠিয়া বসিলে কাশি থাকে না, কিন্তু শয়ন করিলেই আবার কাশির উদ্রেক হয় (হারোস্); কাশির দরুণ গলার মধ্যে শুষ্কাম্লভূত হয়, ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ হয়; গলা দিয়া অতি কষ্টে শ্লেষ্মা নির্গত হয়; গলা দিয়া হরিত্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক); গলা দিয়া তিক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন; গলা দিয়া চাপ্ চাপ্ থানা থানা রক্ত নির্গমন (নাক্স-বম্); বুকের নিম্নাংশে আঁটাবোধ, যাহার দরুণ মনে হয় যেন উক্ত অংশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালেই এই প্রকারেব যাতনা অধিক অম্লভূত হইয়া থাকে (বেল্ফস্); বৃক্ক আঁটা বোধ; বৃক্ক খিল ধরার জ্বার সঙ্কোচন হেতু অত্যন্ত কষ্টাভূতব; বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে শ্বাস প্রাণে ঘন ঘন এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং হৃৎস্পন্দন হয়; বুকের মধ্যে টাচিরা ফেলার জ্বার জ্বালা এবং টাটানি, যাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্); বুকের মধ্যে ক্ষত হওয়ার জ্বার যাতনা (সোরিনান্); শয়ন করিয়া থাকিলে, রাত্রিতে, শ্বাস টানিলে, অথবা কাশিলে বৃক্ক এবং পার্শ্বে সূচী-বিধানের জ্বার বেধনা বা যাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালৌ-কার্ক); কাশি, এবং গলা দিয়া সহজেই হরিত্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে (ক্যাক্-কার্ক, ফস্, আস্, ষ্টানাম্, সাল্ফ); কাশি এবং তদ্রূপ গলা দিয়া কাল জমাট রক্ত পড়ে (কলিনন্, নাইট্-ক্-আস্); চীৎ হইয়া শয়ন করিলেই শ্বাস কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপ্রদেশে আঁকড়াইয়া ধরার জ্বার বেধনা বা যাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া রাখিলে কতক্ণের জন্ত বাহ্য উপশম হয়; মধ্যাহ্নে আহারের পর হৃৎস্পন্দন এবং মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; বৃক্কঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য এবং মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন। নাড়ীর শ্রেত্যক বার স্পন্দনই পাকস্থলীর মধ্যে অম্লভব করা যায়।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। বাতরোগে ঘেঁরুণ হয়, ঘাড় কসিয়া ধরার

জ্বর সেরূপ বেদনা এবং গ্রীবা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (কল্চ্);  
 ষাড় এবং পৃষ্ঠদেশে ঘাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা; অনেকক্ষণ মাথা  
 হেট্ করিয়া উপড় হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাত্তাগে সেরূপ  
 বেদনা বা যাতনা (আনিকা, চায়না); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁগিয়া গেলে  
 যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাত্তাগে সেরূপ বেদনা (সাল্‌ফ্); নড়িলে চড়িলে  
 কোমরের পশ্চাত্তাগে বেদনা বা যাতনা; বসার পর কোমরের পশ্চাত্তাগে  
 উক্ক প্রকারের বেদনা বা যাতনা; প্রসব বেদনার সময় যেরূপ হয়, কোমরের  
 পশ্চাত্তাগে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (কলোফিনাম্, সিমিসিফ্, ক্রিয়াঙ্),  
 বাহার দরূপ মনে হয় যেন কোমর এক গাছি কিড়া দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া  
 রাখা হইয়াছে; কোমবে কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা;  
 ক্রান্ত হইলে যেরূপ হয়, গুহ্বারের উপরিভাগে, সন্ধ্যার সময় সেরূপ বেদনা  
 বা যাতনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্ধি ক্ষীণ এবং  
 লালবর্ণ (ব্রাই) এবং উহাতে ছল ফুটানের জ্বর বেদনা, বা যাতনা (এপিস্);  
 অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা বা যাতনা (একন)  
 বাহ্য এক স্থান হইতে অঙ্গ স্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে এবং স্নানান্তে ও উক্ক-  
 তাতে বাহার বৃদ্ধি হয় (মার্ক্) এবং গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিলে বাহার  
 উপশম হয়; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংকি সরিয়া  
 একবারে অসাড় হয় এবং উহাতে স্ফুৎ স্ফুৎ ও কুট্ কুট্ করে। পিটিলে  
 যেরূপ হয়, বাহ্যেতে সেরূপ অবশ্য এবং ভারিবোধ; বৃদ্ধের সন্ধি বাহ, হাত  
 এবং আঙ্গুলে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা (ব্রাই, গেডাম্,  
 রাস্-টক্স), কলুইয়ের সন্ধির ক্ষীণ এবং উহাতে মোচড়াইয়া পড়া বা মচ্কা-  
 ইয়া যাওয়ার জ্বর বেদনা বা যাতনা। কুচ্কির সন্ধিতে মচ্কাইয়া  
 বাওয়া বা সরিয়া পড়ার জ্বর বেদনা; কুচ্কির সন্ধি হইতে হাঁটুর সন্ধি  
 পর্যন্ত কসিয়া ধরা, চিড়িক্ মায়া বা হঠাৎ থাকা লাগার জ্বর বেদনা বা  
 যাতনা; কটিদেশ বা পাছা এবং উরুদেশের পেশী ও অস্থিতে মোচড়াইয়া  
 পড়ার জ্বর বেদনা; উরুদেশ এবং শাখ কসিয়া বা ঘাটিয়া ধরার জ্বর  
 বেদনা এবং তদরূপ অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাপ্রসূতা এবং শীতবোধ; হাঁটুর

সন্ধির ক্ষীতি, কিন্তু উহাতে বেদনা থাকে না ; হাঁটুর সন্ধি অত্যন্ত ক্ষীত এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ভ্রার বেদনা ; পা এবং পায়ের পাতার কসিয়া ধরা, ভাঙ্গি এবং প্রান্তিবোধ ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিলে পায়ে ঝিলধরা ( সাল্‌ফ্ ) ; পায়ের পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, উষ্ণ এবং ক্ষীত (ব্রাই) এবং উহাতে বাটিয়া ধরার ভ্রার বা জ্বালাযুক্ত বেদনা বা বাতনা ; পায়ের পাতার তলারও উক্ত প্রকারের বেদনা বা বাতনা অমূল্য হইয়াছে ; পায়ের শিরার প্রদাহযুক্ত ক্ষীতি বা বিতৃতি ( ভামামেলিস্, জিক্ ) ; শেষ বেলার, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে, পায়ের গোড়ালী (গোড় মুড়াতে) ছিঁজ করার ভ্রার বেদনা (জিক্) ; পায়ের আঙ্গুলের কাঁকে কাঁকে ছাল উঠিয়া বাওয়ার ভ্রার ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা, চড়্‌চড়ানী এবং চুলকানি ।

চর্ম্ম । শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালা, কামড়ানী, চুলকানি,—বিছানার উষ্ণতা, সন্ধ্যার সময়, রাত্রি হই প্রহরের পূর্বে, চুলকাইলে এবং চলিবার সময়, শরীর উত্তপ্ত হইলে বাহার বৃদ্ধি হয় (ক্রিমিটস্, মার্ক্, মেজি-রিন্দাম্, সাল্‌ফ্ ) ; গার হামের ন্যায় ফুসুড়ী ( আণ্টি-কুড্, ব্যাপ্ট্, ককিয়া, রাস্-টন্ ) ; গার আমবাতের ন্যায় ফুসুড়ী ( এপিস্ ) ; শুকরের মাংস বা চর্বিযুক্ত দ্রব্য খাইয়া পায়ে জল বসন্তের ভ্রার ফুসুড়ী বাহির হওয়া ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ ( Erysipelas ) এবং তদ্রূপ আক্রান্ত স্থানের ক্ষীতি ও কঠিনতা এবং স্পর্শ করিলে, নাড়িলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা ও ছল ফুটানের ভ্রার বেদনা বা বাতনার উদ্রেক হওয়া ( বেল্ ) ।

নিদ্রা । অপরাক্ত এবং সন্ধ্যার প্রারম্ভে অনিবার্য ঘুমের ইচ্ছা ; সন্ধ্যার সময় ঘুম হয় না ; প্রথমে রাত্রে ঘুম হয় না ; শেষ রাত্রে ঘুম হয় ; অস্থির নিদ্রা বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরমবোধ ; ভ্রম খাইলে স্বেদন হয়, ঘুমেরঘোরে স্বেদন বারম্বার জাগিয়া উঠা ; এলোমেলো, ভ্রম উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা ( আণিকা, অরাম্, রাস্-টন্, সাল্‌ফ্ ) ; বারম্বার হাইতোলা ; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ ( মার্ক্, নাক্স-বন্, ফস্ ) ; মনের মধ্যে নানা প্রকারের ভাব আসিয়া ঘুমের ব্যাধাত জন্মায় ।

জ্বর । উষ্ণ বয়েও অনবরত আত্যন্তিক শীতবোধ ; সন্ধ্যার সময়

শীতের বৃদ্ধি (আস্, বেল্, ফস্, রাস্-টঙ্ক্) ; গরম জল ছিটাইয়া দিলে  
 যেৰূপ হয়, গায় সেৰূপ উষ্ণাভাব এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উষ্ণে ; সন্ধ্যার সময়  
 এবং রাত্রিতে শুষ্ক এবং অত্যন্ত জ্বালাবৃদ্ধ উষ্ণাভাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
 শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (চাযনা) ও হাতের তাবুতে অত্যন্ত জ্বালাভাব,  
 বাহ্যার দক্ষণ হাত কোন একটা ঠাণ্ডা বস্তুর উপর বা ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে ঠাণ্ডা  
 হয় ; পিপাসা থাকে না (ইয়েস্, ফস্) ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘৰ্ম্ম (ক্যাক্-কার্ক্,  
 নাইটিক্-আস্, রাস্-টঙ্ক্) ; শরীরের এক পার্শ্বে ঘৰ্ম্ম ; সন্ধ্যায় বা পালা-  
 জ্বর, যাঁহাতে শীতলাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উষ্ণাবস্থা অল্পকাল স্থায়ী হয় ও  
 পিপাসা একবারেই থাকে না ; কখন কখন শীতলাবস্থা বা ঘৰ্ম্মাবস্থার পূর্বে  
 পিপাসা থাকে, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় কদাচিত পিপাসা থাকে । সন্ধ্যায় বা  
 পালা-জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পেটের অম্লধ থাকে (আণ্টি-কুড্, ইপিকাক্,  
 নাস্-বম্) ।

ব্যবহার । শ্লেষ্মাজনিত অম্লধ, প্রধানতঃ যে সকল অম্লধে শ্লেষ্মা  
 গাঢ়, গন্ধহীন, হরিত্রায় আভাযুক্ত, সবুজবর্ণ হয় ; রহং এবং ক্ষুদ্র সন্ধিবাত-  
 জনিত অম্লধ ; স্ত্রীলোকের রজঃরোধ ; কঠকর রজঃস্রাব এবং বাৎকের বেদনা  
 (Painful Menstruation) ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; শ্বেতপ্রদর ;  
 সন্তান প্রসবের পর প্রসূতীর তলপেটাदिতে বেদনা (After-pains) ;  
 সন্তান প্রসবের পর ক্লেন (Lochia) নিঃসরণ কষ্ট হওয়া ; পায়ের শিরার  
 সাদা ক্ষীতি (Phlegmasia Alba Dolens) ; স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ;  
 স্তন ক্ষীত এবং উহাতে টাটানি ; জরায়ুর সকল প্রকারের অম্লধ ; রজঃ-  
 রোধ এবং অনিয়মিত রজঃস্রাব হেতু অম্লধ ; হিষ্টিরিয়া ; একশিরার ব্যাবাম  
 (Orchitis) ; মেলঞ্চোলিয়া (Melancholia) ; বায়ুশূল ; চক্ষুপ্রদাহ ; কান দিয়া  
 পুঁথ পড়া ; কর্ণশূল ; অতিরিক্ত দ্রুত মদলা দ্বারা বীণা বা তৈলাক বা চর্কিবৃক্ক  
 জবা বা শুকরের মাংস খাইয়া অম্লধ ; হান ; আমবাত ; রাত্রিতে স্বপ্নে বা  
 অনিচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মভাগ (বিচানায় প্রস্থাব করা) ; শিরার ক্ষীতি এবং  
 বিস্তৃতি ; পেটের অম্লধ সম্বলিত ক্ষর ; ঠাণ্ডা লাগিয়া কানে কন শুনা ;  
 নাক দিয়া রক্ত পড়া ; উদরানয় ; আমাশয় ; বমন সম্বলিত অজীর্ণ রোগ ;  
 পাকস্থলীতে বেদনা ; মেদ্রা বা পিত্তসংযুক্ত উদরানয় ; মূত্রাশয়ের শ্লেষ্মাজনিত

অস্থখ; প্রমেহ রোগ; অণ্ডকোষের প্রদাহজনিত ক্ষীতি; কৃত্রিম প্রসব বেদনা (False Labour-pains); সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে ফুল (Placenta) নির্গত না হওয়া; প্রসব বেদনা আরম্ভ হইতে না হইতেই একবারে কমিয়া বা চলিয়া যাওয়া; আক্ষেপিক প্রসব বেদনা; রক্তোৎকাশ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অস্থখ; হাত পায়ে পাতার প্রদাহজনিত শোথের দ্বায় ক্ষীতি; হাঁপানি জনিত অস্থখ; বৃক্‌ জালা এবং মুখে বিস্ত্রী এবং টক্‌ স্বাদি বিশিষ্ট জল উঠা; সর্দি; কাশি; চক্ষুর পাতার ত্রণ বা আঞ্জনী (Stye on the Eyelids); চক্ষুর পাতার স্পন্দন এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া; স্ত্রীলোকের স্তনদগ্ধ শুকনাইয়া যাওয়া; তরুণ এবং পুরাতন আকারের সবিবাহ বা পাল্লা-জর ইত্যাদি অস্থখে পাল্‌সেটিল। ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সমুদয় শরীরে দপ্পনানি; শাস্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক বাহার। সর্বদা কঁাদে, কঁাদ কঁাদ হয়, বা সামান্য কারণেই দ্রুত প্রকাশ করে, তদ্বাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী; সকলপ্রকার যাতনা বা অস্থখের সঙ্গে সঙ্গেই শীতবোধ; বেদনাদি একস্থান হইতে অল্প স্থানে অনবরত সরিয়া পড়া; জালাযুক্ত, হল কুটানের দ্বায় বেদনা বা যাতনা; গা ভাঙ্গার ইচ্ছা; বিগুহ বায়ু সেবনের ইচ্ছা; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই সমুদয় শরীরে অস্থখ বোধ, চলিয়া বেড়াইলে যাতা থাকে না; সন্ধ্যার সময়, ঘোর সন্ধ্যার সময়, একদিন পব একদিন সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, বিহানার উচ্চতাতে, শয়ন করিয়া থাকিলে (প্রধানতঃ বামপার্শ্বে), উষ্ণ ঘরে, আহারের পর (প্রধানতঃ তৈলাক্ত, চর্কিযুক্ত দ্রব্য, শুকরের মাংস, বরফের কুন্ডা, ফল বা শাকাদি খাইলে) অস্থখের বৃদ্ধি; এবং বহির্কায়ুতে, ঠাণ্ডা স্থানে বাস এবং চীত হইয়া শয়ন করিলে অস্থখের হ্রাস হয় ইত্যাদি পাল্‌সেটিলার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। পাল্‌সেটিলার সমগুণ বিশিষ্ট অল্প কোন ঔষধ আছে কি না সন্দেহ। তবে কোন বিষয়ে পাল্‌সেটিলার কার্যের সঙ্গে সিমিস্কিউগা, আন্টিমোনিয়াম্‌ ক্রুডাম্‌, কলোফিলাম্‌, কোনারাম্‌, সাইক্রেমেন্‌, হাশামেলিস্‌, পিপিয়া, আর্সিনিক্‌, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্‌, ক্যামোমিলা, চায়না, ককিউলাস্‌, কলো-

সিঙ্ক, ফেরাম, ইগ্নেসিয়া, ক্যালী-বাইক্লরিকাম, লাইকোপডিয়াম, মার্কিট-  
রিয়াম, নাক্স-বমিকা, নাক্স-মফেটা, প্লাটিনা, ফফরাস, রাস্টর, সাইলি-  
সিয়া, সালফার এবং জিঙ্কামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ককিয়া, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-  
বমিকা ইত্যাদি পাল্লেটিলার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যব-  
হৃত হইয়া থাকে । পেটেব অন্থে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন আমরা  
সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি । অণ্ডকোষের প্রদাহ-  
দিতেও ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী । স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ  
প্রদাহেও (Ovaritis) ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন উপকারী । চক্ষু এবং  
কর্ণের অন্থে এবং বাত রোগে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য । ক্ষুদ্র শঙ্কিবাভ  
(Gout) ৬ এবং ১২ ডাইলুশন উপকারী । জ্বরায় এবং ডিম্বকোষের অন্থে  
৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । কাশি এবং সন্দিহু ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য্য ।  
শিরায় অন্থেও ৬ষ্ঠ ডাঃ ব্যবহার্য্য । কৃত্রিম প্রসব বেদনা এবং সপ্তম প্রস-  
বের পর পেটে বেদনা ( ভাদলির কামড়,—আদ্যার ব্যাথা,—After-  
pains ) ইত্যাদিতে ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী । কখন কখন কৃত্রিম  
প্রসব বেদনায় ২০০ ডাঃ দ্বারা অন্ত্যান্ত ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার  
দর্শিতে দেখা যায় । যেত প্রদর এবং রজঃস্রাব সম্বন্ধীয় অন্থে  
৩০ ডাঃ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । রজঃস্রাব সম্বন্ধীয়  
অন্থে কোন কোন চিকিৎসক ১ম দশমিক এবং মূল আরোক এক ফোঁটা  
মাত্রার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । ডাক্তার হিউগ্জ (Dr. Hughes) বলেন  
যে, কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনায় (Painful Menstruation)  
১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় তিনি  
বিশেষ ফল পাইয়াছেন ।



## রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন,—রাস্ টক্স ।

(RHUS TOXICODENDRON,—RHUS TOX.)

তিন প্রকার রাস্ আছে । বথা:—(১) রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রন, (২) রাস্ রাডিকান্স এবং (৩) রাস্ বিনিনেটা । এখানে কেবল রাস্ টক্সিকোডেণ্ড্রনের বিষয়ই উল্লেখ করা হইবে । উত্তর আমেরিকাতে এই গাছের জন্ম হয় । মে এবং জুন মাসে ফুল হওয়ার পূর্বে এই গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া ৪০° ডিগ্রী ওয়ার্ম প্রুফ্ (40° Over-proof) স্পিরিটে বথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । লৈঙ্গিক বিল্লী, লিম্ফেটিক গ্রন্থি (Lymphatic glands), চর্ম, পেশী এবং সন্ধির উপর এই ঔষধের কার্য অতি প্রবল । প্রথমতঃ আক্রান্ত স্থানের উত্তেজনা হয় এবং তৎপর উক্ত উত্তেজনা প্রদাহে পরিণত হইতে পারে । অথবা প্রদাহ না হইলে উহাতে সিরাম (Serum) নামক ফেন বা জলের স্তায় পদার্থ সঞ্চিত হইয়া শোথ হয় বা কাটিয়া বাইরা উহা হইতে জলের স্তায় কলতানি পড়ে । এই প্রকার উত্তেজনার অবস্থা চর্মেরই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । এই গাছের পাতা গায় লাগিলে অথবা উহার নিকট থাকিলেও অনেক সময় চর্ম লালবর্ণ এবং উহাতে ভয়ানক আকারের জলপূর্ণ ফোন্সার স্তায় ফুসুড়ী বিশিষ্ট বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ (Erysipelas) প্রকাশ পাইতে পারে । চর্মের উপর কার্যের স্তায় লৈঙ্গিক বিল্লীর উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দকণ উহাতে বিকচ (Eczema) এবং ফোন্সার স্তায় ফুসুড়ী প্রকাশ হইয়া পাকে । চক্ষুর বোজক বিল্লীর (Conjunctivæ) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । এতদ্বির শরীরের অন্যান্য বস্তুর লৈঙ্গিক বিল্লীর উপরও ইহার কার্য অধিক বা কম পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । শরীরের যে সকল আঁশাল অংশে মাংসক বিল্লী আছে (Sero-fibrous tissues), ঐ সকল অংশ আক্রান্ত হইয়া উহার পেশী এবং সন্ধিতে বাতের স্তায় প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া পেশীর আবরক কঠিন পর্দা (Fascia), পেশীর কঠিন অগ্রভাগ

(Tendons) স্নায়ুর আবরক পর্দা (Sheaths of nerves), সন্ধির লিগামেন্ট্‌স্ (Ligaments) এবং অঙ্গাণু অংশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরের সমুদয় অংশের নিস্ফেটিক্ গ্রন্থিগুলিই বর্ধিত এবং প্রদাহযুক্ত হয়। কোষিক কিল্লোতে (Cellular Tissues) ফেনবৎ পদার্থ বা সিরাম (Serum) সঞ্চিত হইয়া উহার পরিপোষণ কার্যের অবসরতা, হ্রাস বা বিকৃতি হইয়া থাকে, বা উহার ব্যাঘাত জন্মে। প্রকারান্তবে ইহা হেল্লিরাদির কাথোর জড়তা এবং মস্তিষ্কের এমন অবস্থা উৎপাদন করে যাহা বিকারের লক্ষণাক্রান্ত জব বা মোহ-জ্বর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রাম কালীন লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে উহার উপশম, রাস্-টক্সের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন । সর্বদাই চিন্তা এবং ভয়ের ভাব যাহা স্বেচ্ছায় সময় এবং রাতিতেই অধিক হইয়া থাকে (আর্স্, ক্যাক্-কার্ন্, মার্ক্); উক্ত প্রকার চিন্তাদির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত থাকার ইচ্ছা (কার্কো-বেজ্, ইথ্রেস্) এবং কাঁদিবার ইচ্ছা (লাটেকোপ্, নেটাম্-মিউর, পাল্‌স্), ঘরে বসিয়া থাকিলে বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বায়ুতে সেড়াইলে বাহ্যিক উপশম হয়; মনের উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্থিরতা, বাহ্যিক দ্রবণ রোগী সিঁছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না (এক্‌ন্, এথুজ্‌, আর্স্, ক্যাম্‌ফার); মুহূর্ত্তম; (আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বন্, সিকেল্); সর্বদা খিট্-পিট্ করা, অবৈধা হওয়া, চিড়্-চিড়্ করা এবং সহজেই বিবক্ হওয়া (ব্রাই); সহজে সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে অশক্তি; অল্প দিনের খটনাও স্মরণ রাখিতে অশক্তি (কস্-আস্); চুপে চুপে, বিড়্-বিড়্ করিয়া অঙ্গাণু বলা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসরতা এবং জ্ঞান রহিত হওয়া; আশ্রয় হত্যাক্ ইচ্ছা।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার গোলমেলে এবং চিনা বোধ; নেসা করিলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ মাথা ঘোরা এবং চলিতে টলিয়া পড়া (চায়না, ককিউলাস্, নাক্স-বন্, পাল্‌স্); সিঁছানা হইতে উঠি

কার সময় মাথা ঘোরা (ব্রাই, ফস) ; মাথার পূর্ণ এবং ভারিবোধ ও কপালে একটা ভারি বস্তু চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ নিয়মিত ঠেলিয়া নামার জায় অনুভূত হয় ; চলিবার সময় বা সিঁড়িদিয়া নামিতে বা মাথা থাকিলে মনে হয় যেন মস্তিষ্ক ঢল্ ঢলে হইয়াছে এবং মাথার হাড়ের মধ্যে যেন বারম্বার আঘাত করিতেছে (চায়না, নাক্স-মস্ক, হায়োস্, সাল্-ফ্-আস্) ; মাথার পশ্চাৎভাগে কন্কনানি, বাড় পশ্চাৎ দিকে বাঁকা করিলে যাহা থাকে না ; স্পর্শ করিলে মাথায় লাগে (চায়না, মার্ক্, মেজিরিয়াম) ; মাথার কল্-তানি এবং পূর্ব বিশিষ্ট কুসুড়ী এবং উহাতে পুরু চুমটী (থোসা) পড়ে ও উহার দরুণ বস্ত্রাদির বৃদ্ধি হয় (গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, ষ্টাকিস্, সাল্-ফ্) ।

চক্ষু । চক্ষু এবং চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ ও ক্ষীত হওয়া এবং রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতার লাগিয়া থাকা (আন্টি-ক্লুড্, কষ্ট্, গ্রাফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, আল্-স্, ফস্, সাল্-ফ্, জিঙ্ক্) ; সমুদয় চক্ষু এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানের ক্ষীতি (আন্) ; চক্ষুর পাতার শোথ এবং উহার স্থানে স্থানে বিসর্পে যেরূপ হয় (Frysipelatous) সেরূপ ফোঁসার ন্যায়, জলপূর্ণ কুসুড়ী ; চক্ষুর যোজক ঝিলী এবং চক্ষুর পাতার উপস্থিতির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি (Meibomian glands) বিবৃদ্ধি এবং চক্ষুর পাতার পক্ষ (Lashes) পড়িয়া যাওয়া ; চক্ষু এবং চক্ষুর পাতায় জ্বালা এবং চুলকানি (সাল্-ফ্) ; বালি প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে সেরূপ চাপা বোধ এবং কন্কনানি (আস্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্-ফ্, পাল্-স্, সিপিয়া, সাল্-ফ্) ; চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতের জ্বালা জড়তা বা কঠিনতা (ক্যাল্মিয়া) ; চক্ষু ঘুবাণের সময় বা চাপ দিলে চক্ষুর গোলক টাটার (স্পাইজেল্) ; চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা মিহি কাপড় রাখিলে সেরূপ হয়, চক্ষে যেরূপ ঝাপসা দেখা (কষ্ট্, পিটোল্, ফস্, পাল্-স্, সাল্-ফ্) ।

কর্ণ । কর্ণশূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায় কর্ণের মধ্যাংশ ক্ষীত হওয়া ; কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পূর্ব হওয়া ; রাত্রিতে কানের মধ্যে চিড়িক মাঝা এবং দপ্-দপিয়া বেদনা ; কান দিয়া রক্ত সংযুক্ত পূর্ব নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা ।

নাসিকা। বায়ুদ্বারা প্রবল হাঁচি; রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়া; অরবিকারে, এবং মাথা-হেট করিয়া উপুড় হইলেই নাক দিয়া রক্ত পড়া; নাক শোথের দ্বারা ক্ষীত (এপিস্); নাসিকার অগ্রভাগ লালবর্ণ (বেল্) এবং স্পর্শনে বেদনামুক্ত হয়; নাকের মধ্য টাটায়; বাম নাসারন্ধ্রের নীচে টাটানি; নাক দিয়া সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ।

মুখমণ্ডল। স্থাপকৃতি রুগ, বসিয়া যার এবং ঢকু নীলের আভাযুক্ত রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় (কস্, সাল্‌ক্); মুখ মণ্ডলের সিসপের দ্বারা প্রবাহ এবং ক্ষীতি (গ্রাক্) এবং উহাতে জ্বালা, চিড়িক দ্বারা এবং হুড়্, হুড়ী; মুখ মণ্ডলের আক্রান্ত স্থানে ফোকার দ্বারা জল পূর্ণ কুহুড়ী (সিষ্টাস্); নিম্নমুখি সঞ্চালনে কানের নিকট খিল ধরার দ্বারা বেদনা বা যাতনা; নিম্নমুখির কোণের নীচের গ্রন্থিগুলিতে খাল ধরা বা চাপিরা ধরার দ্বারা বেদনা বা যাতনা; গুষ্ঠের কোণে কত এবং উহাতে জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি (আন্টি-ক্রুড্, গ্রাক্, লাইকোপ্, সাইলিসি); মুখমণ্ডলে কল্‌তানি বিশিষ্ট কুহুড়ী এবং উহাতে পুরু চুমটি (খোসা) পড়া (লাইকোপ্, মার্ক্, টাকিস্)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য। দাঁতের গোড়ার দপ্‌দপ্‌ করা বা হুড়্‌হুড়্‌ করার দ্বারা বেদনা বা যাতনা, বাস্তবিক উত্তাপ প্রয়োগে বাহার উপ-দ্রব হয়; দাঁত যেন আত্যাবিক অপেক্ষা লম্বা হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (আর্স্, মার্ক্, সাইলিসি); জিহ্বার ফোকা পড়া; জিহ্বা লালবর্ণ, শুষ্ক, এবং কাটাযুক্ত (ব্যাপ্ট্, বেল্) এবং কাটাবর্ণ স্নেহা দ্বারা আবৃত; জিহ্বার জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি এবং উহার অগ্রভাগ লালবর্ণ (আর্স্, আর্কেন্ট্-মেট্); মুখগহ্বর শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আর্স্, ব্রাই); নিজাববহার মুখ দিয়া লাল বহিরা পড়া; মুখে দুর্গন্ধ (আর্গিকা, অরাম্, হিপ্-সাল্‌ক্, আরোড্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, নাইট্‌ক্-আর্স্, নাক্স্-বম্); মুখে গচা স্বাদ (মার্ক্); মুখে তিক্ত স্বাদ (নাক্স্-বম্); মুখে উদরস্থ অজীর্ণ আতর ভ্রবোর স্বাদ (ব্রাই, কলোস্, চায়না, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) বিশেষতঃ রুটীর (নেটাস্-মিউর); গলার মধ্যে শুষ্কানুভব (এপিস্, নাক্স্-বম্); গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি; গলার মধ্যে হুটী বিধানের দ্বারা

বেদনা, বাহার দরুণ গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয়; গলার বহির্দেশ ক্ষীত; স্বেচ্ছাচেনের দরুণ যেরূপ হয়, স্কোন কঠিন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, কোন তরল দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ কষ্টানুভব (বেল, হায়োস, নাক্স-বম্, প্রায়াম্); কর্ণমূলস্থিত এবং হরারির নিম্নস্থিত গ্রন্থি (Parotid and Submaxillary glands) ক্ষীতি এবং কঠিনতা (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, আয়োড)।

- পাকস্থলী এবং উদর। গলার মধ্যের শুষ্কতার দরুণ অত্যন্ত লিপাসা এবং শীতল জল পানের ইচ্ছা (একম্, অস্, ব্রাই); ঠাণ্ডা হৃৎ খাণ্ড-য়ার ইচ্ছা; পেটে খালি বোধ এবং ক্ষুধা, কিন্তু কোন দ্রব্যে রুচি থাকে না বা খাইতে ইচ্ছা যায় না; আহ্বারের সম্পূর্ণ অরুচি (আলান্ অস্, চারনা, হিপ-লান্ফ, মার্ক, ফস, সাল্ফ); উদগার ভাবরূপ উঠে না; আহ্বার বা পানের পর বমনোদগে; একখানি পৃথক চাপিরা থাকিলে যেরূপ হয়, আহ্বারের পর পাকস্থলীতে সেরূপ ভারি এবং পূর্ণবোধ (অস্, ব্রাই, মার্ক, নাক্স-বম্, পাল্গ); আহ্বারের পর পাকস্থলীর মধ্যে এবং উহার উপরে চাপাবোধ; আহ্বার দ্রব্যে, বিশেষতঃ কটীতে, তিক্ত স্বাদ (মার্ক); খাইতে খাইতে হঠাৎ বমন; পাকস্থলীতে প্রবল দগ্ধপানি (নাক্স-বম্, পাল্গ)। উদরের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগে কসিয়া ধরার দ্বারা বেদনা বা যাতনা যাহা নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে বিস্তৃত হয় এবং তদরূপ মনের অত্যন্ত উদগে এবং বমনোদগে; উদরে এবং উহার পার্শ্বে টাটানি, যে পার্শ্বে বেদনা সে পার্শ্বে শয়ন করিলে, শাশ ফিরিলে, নড়িতে আরম্ভ করার সময় বাহার বৃদ্ধি হয়; উদরের অত্যন্ত ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, আহ্বারের পর যাহা অধিক হয় (চারনা, লাইকোপ্, নাক্স-বম্, নাক্স-বম্); গেটকামড়ানী এবং উদরে কর্তনবৎ বা হঠাৎ থাকা লাগার দ্বারা বেদনা যাহা আহ্বারের পূর্বই অধিক অনুভূত হয় এবং মূলত্যাগের পর বাহার উপশম হয় (কলোস্); উদরে শূল বেদনা বা উদর আকড়াইয়া ধরার দরুণ রোগী মাথা হেট করিয়া জড়নড় বা বাঁকা হইয়া চলিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট, কলোস্, আইরিস্, নাক্স-বম্, কুম্); কুচকির গ্রন্থির ক্ষীতি (বাগী) (ক্যাক-কার্ক, ক্রিমোটিন্, আয়োড); নাক্তি প্রদেশে কসিয়া ধরার দ্বারা আক্কেপিক বেদনা।

মল এবং মলকার। শুষ্ক সঙ্কোচন; মল পাঁচলা, রক্তের ছিটবুর্ক; মল তরল কালচে, কটাবর্ণ (অ্যাস্); রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; চট্‌চট্টিয়া আঠা (কলচ্‌, হেলিবোরাস), তরল, লাল এবং হরিদ্রাবর্ণ; রাত্রিতে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা বা পেট কামড়ানী, শিরঃপীড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা; মল ভিজা গঁদের জায়; দান্তের পূর্বে পেটে শূল বেদনার জায় বেদনা এবং কৌণপাড়া; দান্তের সময় উদরে কঠিন-বৎ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ ও মলত্যাগের পর বেদনা-মির বিরাম বা উপশম; বেদনা হীন, ক্লেণায়ুক্ত মলভেদ।

মূত্রযন্ত্র। দিবারাত্রি অনবরত বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ, বা যুষের ঘোরে স্বপ্নে মূত্র ত্যাগ (আর্থিকা, কষ্ট্‌, পাল্‌স্); মূত্র লালবর্ণ, উষ্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্‌, এপিস্) এবং অত্যন্ত জ্বালা উৎপাদক ও কাল্‌চে বাহা নির্গত হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই ঘোলাটিয়া হয় (সিনা, ডিজিট্‌, গ্রাফ্‌); মূত্রাবরোধ বা ফোঁটার ফোঁটার রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গমন (ক্যানাবিন্‌-স্যাট্‌-নাক্স-বম্‌); মূত্রে নীহারের জায় সাদা তলানি পড়ে (ক্যান্স্‌, কল্‌চ)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের মাথা এবং উহার আবরক চর্মের ক্ষীতি এবং উহা কাল্‌চে লালবর্ণ, বিসর্পের জায় (Erysipelatous); অঙকোবাধার (পোতা) কঠিন এবং পুরু হয় এবং অত্যন্ত চুলকার; পুরুষের মাথার আবরক চর্ম প্রসাহযুক্ত এবং তদ্বর্ণ সযুচিৎ হইয়া পুরুষের মাথা অনাচ্ছাদিত থাকে (Paraphimosis); মূত্র কোবাধারের শোথ (পোতা ফুলা); পুরুষ, অঙকোবাধার (পোতা) এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট কবুড়ী (হিপ্‌-সাল্‌ক্‌, গ্রাফ্‌); কিকা রক্তের উগ্র রক্তঃস্রাব, বাহার দ্রবণ বোনিতে কামড়ানীর জায় ঘাতনো অগ্রভূত হয়; যোনিদ্বাবে বেদনা এবং টাটানি বা চড়্‌চড়ানি; যোনিব বহির্দর্শে বিসর্পের জায় (Erysipelatous) প্রসাহ; বৃষ্টিতে ভিজিয়া জরায়ুর কার্যের বৈলক্ষণ্য; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia), রক্ত চাপ চাপ, থানা থানা এবং জরায়ুতে প্রসব বেদনান জায় বেদনা (বেল্‌, ক্যাম্‌, সিনিসিফ্‌); সন্তান প্রসবের পর স্তনে হৃৎ থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সার্বাঙ্গিক উচ্ছ্বাস

(একন্, হারোস্, পাল্‌স্); গর্ভাবস্থার কৌণপাড়া বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বা কোন প্রকারের ভারি বস্ত্র উঠান হেতু গর্ভাবস্থার উপক্রম হওয়া; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে দূষিত ক্রেন (Vitiated Lochia) নিঃসরণ বা উক্ত নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে খোঁচা বিধার জ্বার বেদনা ও মাথার বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া যাইবে (ব্রাই); সন্তান প্রসবের পর অনেক কাল ধরিয়া জরায়ু হইতে ক্রেন নিঃসরণ, অথবা ক্রেন নিঃসরণ একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; কোন ভারিজন্য নিশ্বাস বন্ধ করিয়া উঠাইবার দরুণ জরায়ু স্থান ত্রুট হইয়া নিম্নদিকে সরিয়া পড়ে (Prolapsus uteri); সন্তান প্রসবের পর পায়ের শিরার সাদা ক্ষীতি (Milk-Leg); বিকারের লক্ষণ বিশিষ্ট জরায়ু প্রদাহ ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং কণ্ঠনালীতে টাচিয়া ফেলার জ্বার জ্বালা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে খস্‌খসে বোধ এবং টাটানি (অস্-মিরাম্); শ্বাস প্রস্থাপ ঘন ঘন; কাপড়ের নীচ হইতে হাত বাহির করিলেও কাশির উদ্রেক হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্); বায়ুনের মধ্যে হৃৎস্রুড়ীর দরুণ শুষ্ক খুস্‌খুসে কাশি (নাল্‌-বম্, ক্রমেক্স), সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে বাহার বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিবার অব্যবহিত পরই কাশি; আক্কেপিক কাশি, যাহার দরুণ মাথা কাঁপে; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছিড়িয়া ফেলা বা স্থচীবিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা (একন্, ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্, পাল্‌স্); বুকে অত্যন্ত আঁটাবোধ এবং তদরুণ অত্যন্ত উত্তেজ; বুকে এবং উহার পার্শ্বে স্থচীবিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা, বিশ্রাম্, কাণীন বা হাঁচি এবং নিশ্বাস প্রস্থাপে বাহার বৃদ্ধি হয়; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত কুক্ষুসপ্রদাহ, পূর্ব শরীরে শোথিয়া যাহা উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত কথা বলা, বক্তৃতা করা বা গান করার দরুণ স্বরভঙ্গ; ভয়ানক কাশি, যাহার দরুণ মনে হয় যেন বুক কাটিয়া যাইবে; সন্ধ্যার সময় কাশি এবং কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার জল্যাঙ্গি বমন (কার্কো-বেজ্, ডুসিরা, ফেরাম্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । স্থির এবং নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিলে হৃৎস্পন্দন; হৃৎপিণ্ডে হ্রস্বল বোধ এবং উহার কাঁপনি; হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক

অস্থ্র এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বামবাহতে বেদনা এবং অবশ বোধ (একন্, ক্যাল্মিয়া) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা বাত রোগের জ্বর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (বাডায়াগা, চেলিডন্) এবং সঞ্চালনের সময় উহাতে কসিয়া বা যাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (একন্, কাক্-কস্); মোচ-ড়াইয়া পড়িলে বা খেঁতলিবা গেলে ঘেরূপ হয়, স্বদ এবং পৃষ্ঠদেশে সেরূপ বেদনা বা যাতনা (একন্); অবশ হইলে বা অনেককাল অস্থ্রিধাত্রে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে ঘেরূপ হয়, গ্রীবাব পেঙ্গিতে সেরূপ বেদনাজন্ম, যাচী শেষ বেলা বা সঞ্চার সময়ই অধিক অস্থ্রত হয়; পৃষ্ঠদেশে স্থচাবিধানের জ্বর বেদনা বা যাতনা, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইলে যাহার বৃদ্ধি হয়; মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হওয়ার পর সোজা হইয়া দাড়াইলে উক্ত বেদনা বা যাতনা আরো অধিক অস্থ্রত হয়; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে শক্ত বোধ এবং উহাতে কন্কনানি (একন্); স্থিভাবে বসিলে বা শয়ন করিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া 'যাওয়ার জ্বর বেদনা (বার্কেরিস্), নড়া চড়াতে বা কোন প্রকাবের কঠিন ত্রোষকা-দিতে শয়ন করিলে বাহার উপশম হয় (নেট্রাম-মিউর, রোডডেঙ্কন্, কটা); গিলিবার সময় হঠ স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা; যেন কোন ঠাণ্ডা পদার্থ হড়্ হড়্ করিয়া বা হামা দিয়া যাইতেছে, পৃষ্ঠদেশে একরূপ ঠাণ্ডা বোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । মোচড়াইয়া পড়িলে, কোন জ্বর জ্বর উঠাইলে বা জোরে টানিয়া বিস্তৃত করিলে ঘেরূপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ যাতনা বোধ এবং উদার স্বীতি, কঠিনতা এবং উহাতে পক্ষাঘাতের জ্বর অবশবোধ; বিশ্রামের পর প্রথম সঞ্চালনে বা প্রান্তঃকালে বিছানা হইতে উঠিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ এবং উদার কঠিনতা, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীরসার সঞ্চালনে বাহার উপশম হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঁপনি অথবা কাঁপনির জ্বর অস্থ্রত হয়; যে অঙ্গ ভর করিয়া শয়ন করা যায়, প্রধানতঃ বাহ, সে অঙ্গ অবশ বা অসাড় হয়; স্থির ভাবে থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের জ্বর কসিয়া বা যাটিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা ।



স্বস্ত্যের সন্ধিতে বাতের বেদনার জায় ছিড়িয়া ফেলা বা স্ফীতি বিধানের জায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহুতে অবশ বা অসাড়বোধ; বাহুর পক্ষাঘাত, উহাতে ঠাণ্ডা বোধ এবং উহাতে স্পর্শজ্ঞান থাকে না; স্বস্ত্যের সন্ধি, বাহু, কনুই, মণিবন্ধ, হাত এবং আঙ্গুলের সন্ধিতে বাতের জায় স্ফীতি বিধান বা ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা বা বাতনা (একনু, ব্রাই, লেডাম), ঠাণ্ডা এবং আর্জ বাতাসে, বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিশ্রাম কালীন বাহ্যিক বৃদ্ধি হয় (বেডোডেড্রন); বোঁগলের গ্রন্থি বন্ধ (ব্যারাট্টা-কার্ক, লাইকোপ, সাইনিসি); হাত এবং হাতের আঙ্গুলের স্ফীতি। পা এবং পায়ের পাতার পক্ষাঘাতের জায় জ্বর বোধ এবং উহার দুর্বলতা বা বাহ্যিক দৃষ্টি চলিবাব শক্তি প্রায় রহিত হয়; বসিয়া থাকিলে পায়ের ক্রান্তি বোধ, চলিয়া বেড়াইলে বাহ্যিক থাকে না (রাস); পায়ের কনুনিয়া বেদনা বা বাতনা, বাহ্যিক দৃষ্টি রোগী থাকিলে তাব বাহ্যিক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে, বুনা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে পর কুচ্চিক এবং হাঁটুর সন্ধিতে বাতের ধরার জায় বেদনা বা বাতনা; পা এবং পায়ের পাতায় খিল ধরা, বাহ্যিক দৃষ্টি রোগী চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; অনেককণ বসিয়া থাকিলে পায়ের পাতার সন্ধি স্ফীত হয়; সন্ধার সময় পায়ের পাতা স্ফীত হয়; ভিজিয়া কোমরে বাতের বেদনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী স্পন্দন; পুরাতন বাতরোগ এবং আক্রান্ত স্থান কোমল না হইয়া বরং কঠিন বা শক্ত হয়; বাম বাহু এবং বাম পায়ে হামা দিয়া বাওয়ার জায় অবশবোধ বা স্ফু স্ফীতি (সিঁসি ধরা)।

চর্ম্ম। সমুদয় শরীরে চুলকানি (গ্রাফ, সাল্ফ); চুলকানি চুল বা লোমসংযুক্ত অংশেই অধিক অহত হয়; সমুদয় শরীরে হামের জায় লাল কুস্কুড়ী (আর্টি-ক্রুড, ব্যাপ্ট, কফিয়া, পাল্ফ); গায় কোঁকা এবং কুস্কুড়ী ব্রণের জায় জলপূর্ণ কুস্কুড়ী এবং উহাতে জ্বালা ও চুলকানি (গ্রাফ, মার্ক, সাল্ফ); বিকচ (Eczema) বাহ্যিক উপরের অংশের ছাল উজ্জিয়া যায় এবং ক্ষত হয়, উহাতে পুরু থোসা বা চূনটী পড়ে ও উহা হইতে হর্গকযুক্ত কল্তানি নির্গত হয় (গ্রাফ, হিপ-সাল্ফ, লাইকোপ, সাল্ফ); বিসপের জায় প্রদাহ এবং স্ফীতি (অপিস, বেল) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকার

নার কুস্কুড়ী ব্যক্তি হয় ; আমবাতি এবং তদক্ষণ চুলকানি এবং জালা ; প্রত্যেক বৎসর শীত কালে গায় কুস্কুড়ী হয় ; কুস্কুড়ী চুলকাইলে জালা করে ; প্রত্যেক বৎসরই মাণার দানের স্থায় এক প্রকার কুস্কুড়ী প্রকাশ পায় ; মাণার এক প্রকারের ক্ষক কুস্কুড়ী, বাহার দক্ষণ মাণার ছাল উঠিয়া যায়, কুস্কুড়ীগুলি রাত্রিতে চুলকায় এবং উগাতে পুঁষ হয় ও চুমটি পড়ে ; ওঠের চতুষ্পার্শ্বে গোলাপী রঙের কুস্কুড়ী এবং উহা হঠাৎ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুমিশ্রিত ছেকড়া ছেকড়া পুঁষ পড়ে ; গায় আঁচিল হয় ; শরীরের স্থানে স্থানে লাল হয় এবং আবের (Tumour) স্থায় ক্ষীত হয় ; গায় ভাসান বিস্তৃত রকমের শোড়া বা ; আরক্ত জরের পর কণ-মূলস্থ গ্রন্থির প্রদাহ ; গ্রন্থি প্রদাহ, ক্ষীতি, কঠিনতা এবং পাকিয়া উঠাতে পুঁষ হওয়া ।

নিদ্রা । রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে নিদ্রাশূন্যতা এবং তদক্ষণ বিহা-নার বারম্বার এশাশ ওপাশ কবিতা ছট্‌ফট্‌ করা (একন্‌ব্রাই, প্রাক্‌ ফস্) ; বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া এবং ভাব উৎপাদক স্বপ্ন দেখা (আর্নিকা, অরাম্‌, পাল্‌স্) ; নিদ্রা শূন্যতা এবং প্রবল বেগে বারম্বার হাইতোলা ।

জ্বর । বাবম্বার শীতবোধ, প্রধানতঃ সন্ধ্যার সময় (ফস্) ; শরীরের পশ্চাত্তাগে শীত বোধ এবং সমুখ ভাগে উষ্ণত্ব ; হাত এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ; সন্ধ্যার সময় জ্বরের আক্রমণ এবং সমুদয় শরীরে শীত এবং কম্প, গা ভাঙ্গা, মাথা ধরা, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা ; সবিবাহ বা স্বল্প বিবাহ জর (একাত্তিক, দ্বিত্বিক এবং ত্রাত্তিক আকারের জ্বর) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নৃশিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ ; প্রাতঃকালে প্রচুর ঘর্ম্ম (কার্ক্‌, কার্ক্‌, নাইট্‌ক্‌-আস্‌, পাল্‌স্) ; উষ্ণ অন্নাদি পান করিলে ঘর্ম্ম ; নাড়া এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট, (ডিজিট্‌, মার্ক্‌, মিউর-আস্‌) ; শীত কম্প এবং অস্ত্রান্ত প্রকারের বাতনা বা লক্ষণাদি সন্ধ্যার সময়ই অধিক হইয়া থাকে (আর্স্‌, বেল্‌, পাল্‌স্) ; আত্মিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার (Typhoid Fever) ; জিহ্বা শুষ্ক এবং কটাবর্ণ ; দাঁত কাল্‌চ ময়লা (Sordes) দ্বারা আবৃত ; তরল ভেষ্য ; অত্যন্ত উর্জলতা ; নিম্নাঙ্গের শক্তির অনেক হ্রাস, বাহার দক্ষণ উক্ত অঙ্গ সঞ্চালন করা কঠিন হইয়া পড়ে ; রাত্রি দুই প্রহরের পর অত্যন্ত অস্থি-

দ্রুত, বাহার দক্ষ উপশমের আশার রোগী বিছানার বারবার ওপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে; অপরাহ্ন ৭টার সময় সবিরাম জ্বরের আক্রমণ; গায় শীতল জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেদ্রুপ শীতবোধ এবং তৎপরে শরীর গরম হইয়া বারবার গা ভাঙ্গার উচ্ছ্বাস; শেষ রাত্রিতে বা প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম ।

ব্যবহার । শরীর উত্তপ্ত হওয়ার পর জল বুটিতে ভিজিয়া অম্লধ ; থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া বা অন্যান্য প্রকারের আঘাত জনিত অম্লধ ; বাতরোগ এবং বাতরোগ জনিত অম্লধ ; কটি এবং কুচকিবাতি ; গ্রন্থির ক্ষীণতা, কঠিনতা এবং উহাতে পুঁষ হওয়া ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস (Erysipelas) ; পুঁষ এবং জল পূর্ণ ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ফোকার স্তায় ক্ষুদ্রতী ; শোথ ; পক্ষাঘাত ; সবিরাম-জ্বর ; স্বল্পবিরাম-জ্বর, আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বাত জ্বর ; ফোটক জ্বর ; হৃৎপিণ্ডের বাস্ত্রিক অম্লধ ; সামান্য রক্তের শৈথিল্য রোগ ; চক্ষু প্রদাহ ; বিকচ (Eczema) ; আভ্যন্তরিক যন্ত্রের প্রদাহ জনিত স্রাবিক অম্লধ ইত্যাদিতে রাস্ট্র-টেক্স ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । চাঁচলে যেরূপ হয়, হাড়ে সেদ্রুপ বেদনা বা যাতনা (ফস্-আস্) ; রাত্রিতে, প্রথমে রাত্রি দুই প্রহরের পর, যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি (আস্, বেल्, ক্যাক্-কার্ক্, সাল্‌ফ্) ; স্থিরভাবে থাকিলে বা বিশ্রামে বা চলিতে আবস্থ্য করার সময় বেদনাদির বৃদ্ধি (কোনারাম্, লাইকোপ্, সিপিয়া, সাল্‌ফ্) ; বড় বৃষ্টির পূর্বে, বসন্ত বা শরৎকালে হইতে উঠিলে, জল বুটিতে ভিজিলে, আর্দ্র বাতাসে, উত্তর পূর্ব দিকের বাতাসে, বহির্বায়ুর পরিবর্তনে, ঠাণ্ডাতে অম্লধের বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত চলিলে, আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিলে, উষ্ণ, শুষ্ক বাতাস বা উষ্ণ প্রয়োগে, আক্রান্ত অঙ্গ বিস্তৃত করিলে, অম্লধের উপশম ইত্যাদি রাস্ট্র-টেক্সের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ডান্‌হাম্ (i) Dunham বলেন যে, স্থিরভাবে বা বিশ্রামে থাকিলে বেদনাদির বৃদ্ধি এবং নড়াচড়াতে অম্লধের উপশম রাস্ট্র-টেক্সের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ । তিনি আরো বলেন যে, পেঙ্গী এবং সন্ধিগত স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা বা যাতনার বৃদ্ধি হওয়া এবং আক্রান্ত অঙ্গ প্রথম সঞ্চালন করার সময় উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনার উদ্রেক হওয়া, এবং আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমাগত সঞ্চালনে বেদনাদির হ্রাস

হওয়া রাস্ট্রের প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষণ । কিন্তু উক্ত উপশম অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় না ; কারণ, আক্রান্ত অঙ্গ অনেকক্ষণ ক্রমাগত সঞ্চালন করার লক্ষণ পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় এবং ক্রান্ত হইয়া রোগী বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয় । বিশ্রাম কালীন প্রথমতঃ রোগী আরাম অনুভব করে ; কিন্তু কতকক্ষণ পরই আবার বেদনাদি আরম্ভ হয় এবং তদক্ষণ রোগী তাহার আক্রান্ত অঙ্গ পুনরায় সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয় ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । রাস্ট্রের কার্যের সঙ্গে ক্রোটন, রানান্-কিউলাস্, লেডাম্, রডোডেণ্ড্রন, ব্রাইওনিয়ার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে রাস্ট্রের কার্যের সঙ্গে এপিস্, আগিকা, আসিনিক্, কষ্টিকাম্, ক্রিমেটিস্, ডাণ্কেমেয়া, নাক্স-বমিক্, ফক্ষ-রাস্, ফক্ষরিক্-আসিড্, পাল্‌সেটলা, কটী, মিলিয়া, সাইলিসিয়া, সাল্‌ফার ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যান্‌ফার, কাক্যা ক্রোটন, সাল্‌ফার টেট্রাং রাস্ট্রের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাওয়া যায় । তরুণ চর্ম্মবোগে এবং উর্বরায়, আমাশয়ে ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশন এবং পুরাতন আকারের চর্ম্ম রোগে ১ এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য্য । পুরাতন আকারের বাত বোগে ১২ এবং ৩০ ডাঃ বিশেষ উপকারী । পক্ষাঘাত এবং গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহে ১ম দশমিক ক্রম বিশেষ উপকারী । হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব মহাত্মা সারুয়েল হানিম্যান বলিয়া গিয়াছেন যে, রাস্ টক্স অত্যন্ত আন্তে আন্তে কার্য্য করে এবং ঔষধ প্রয়োগের পর অন্ততঃ ৩৬ ঘণ্টার পূর্বে ইহার উপকারীতা কিছুই টের পাওয়া যায় না । একটী ইংরেজের অর বিকারের পর পাথের পক্ষাঘাতের চিকিৎসার ফল হানিম্যানের উক্ত কথাই পোষকতা করে । উক্ত রোগীকে যে দিন প্রাতে রাস্ টক্স ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পর দিবস ত্রিদি হই প্রহরের সময় হইতে রোগী অনেকটা উপশম অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এতদ্বিন্ন বাত রোগের চিকিৎসার ফলও হানিম্যানের উক্ত কথাই পোষকতা করে । পাঠকগণ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া

দেখিলেও বোধ হয় হানিমানের উক্ত কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন ।

## সিপিয়া সাকাস,—সিপিয়া ।

(SEPIA SUCCUS,—SEPIA.)

কাটেল্ নামক মৎস্যের (Cuttle Fish) আতুরীতে যে এক প্রকার কাল্চে কটাবর্ণের তরল পদার্থ থাকে তাহা উক্ত আতুরীতে রাখিয়াই শুকাইয়া সুগার অব্ নিক্কের সঙ্গে মিশাইয়া যথা নিয়মে ইহার ৩য় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে হয় । ৩য় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আবেক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । যকৃত, পিত্ত নিঃসারক যন্ত্র এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য থাকার দৃক্ণ ইহা উক্ত যন্ত্রাদির উৎপাদক শক্তির হ্রাস করে । ইহার কার্য্য আঁত শিথিল, এবং ইহা দ্বারা উৎপন্ন বেদনা, যন্ত্রণাদি এবং কোন কোন লক্ষণ অনেক সময় অত্যন্ত অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায় । ইহা উক্ত যন্ত্রাদির অবসন্নতা এবং জড়তা উৎপাদন করিয়া থাকে । ইহা দ্বারা যকৃতের কার্য্যের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না, কিন্তু ইহা যকৃতের নিঃসরণে অনেক পরিবর্তন উৎপাদন করা হেতু, নিঃসরণ টক এবং তুর্গদযুক্ত হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন যকৃতের আকারেও অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় । জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রের শৈল্পিক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার প্রধান স্থানিক কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় । মুখাকৃতি হরিজার আভাবুক, মেটে, মোমের ত্রায় রঙ্গবিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শবীরের কোমলাংশকে শোথের ত্রায় ক্ষীভ ও টল্ টল্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা এবং সমুদয় বিষয়ে অমনোযোগের ভাব উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অত্যন্ত স্নায়বিকতা ; সামান্য গোলমালও সহ্য হয় না (ককি-উলাস, সাইলিসি) ; অত্যন্ত বিমর্ষভাব এবং অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে

ক্রন্দন (লাইকোপ্, নেট্রাম্-মিউর, প্লাটিনা, পাল্‌স্); সমুদয় বিষয়েই মনের অপ্রকৃষ্টতা ও সর্বদা ভবিষ্যতেব দুর্ঘটনা বিষয়ে চিন্তা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং চিন্তা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গরম বোধ (একন্); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা, চিড়্‌ চিড়্‌ কবা এবং সহজেই বিরক্ত হওয়া (ব্রাই, ক্যাম্); কোন বিষয়েই চিন্তা থাকে না; সমুদয় বিষয়েই বৈবরণা (বাবে'রিস্, কস্-আন্স্), এমন কি রোগী আপন পরিবারস্থ লোকের বিষয়েও কোন চিন্তা করে না; সর্বদা অলসভাব এবং শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা (নাক্স্-বম্, কস্, সাল্‌ফ্); মনে সহজে ভাবাদিব উদয় হয় না এবং কথা বলিতে বা লিখিতে গেলে ভাষা সহজে স্মরণ হয় না (নাক্স্-মক্, কস্); স্মরণ শক্তির তরলতা বা হ্রাস (আনাকার্ড্, ক্রিয়াজ্, মার্ক্, ল্যাক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স্-মক্) এবং কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি।

মস্তক । মাথাব, প্রধানতঃ কপালে, কণ্ঠদায়ক্ গোলায় বোধ; বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আগারিকাশ্, ক্যাক্-কার্ক্); মাথার চাপিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা, যাহার দরশন মনে হয় যেন মাথা কাটিয়া বাইবে (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্, সাক্স্-নোরিয়া), মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে, বা মাথা ঝাঁকিলে যাহাব বৃদ্ধি হয় (বেল্, ব্রাই); মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন, যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় (নাক্স্-বম্, নেট্রাম্-মিউর) এবং যাহা বেলা তই প্রহর বা সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত করে ও বহির্বাযুতে যাত্রার উপশম হয় (পাল্‌স্, সাক্স্-নোরিয়া); বাম চক্ষুর কোটির এবং মাথাব বাম পার্শ্বে ভারি বোধ এবং চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম চক্ষু হইতে মাথার বাম পার্শ্বে দিয়া মাথার পশ্চাৎভাগে ছুরী বিধানের জ্বাৰ বেদনা, আহারের পর যাহার উপশম হয়; মাথার সমুখ ভাগে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ গুশ্‌গুশে, স্ফীতি বিধান বা চিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ প্রথর বেদনা; কপালের বাম পার্শ্বে হইতে মাথার বাম পার্শ্বে উপরিভাগ পর্যন্ত ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা; এক পেশে মাথা বেদনা (আধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ; মাথার ত্রিক উপরি ভাগে ঠাণ্ডা বোধ

(বিরেট্-আব্) ; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া (আব্, গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, ফস্) ; মাথার ঠিক উপরিভাগে এবং পশ্চাৎভাগে কল্-তানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী (গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; মাথার হাড় এবং চুলের গোড়া স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয় বা টাটার (চারনা, ফেবাম্, হিপ্-সাল্ফ্, ষ্টাফিস্, সাল্ফ্, বিরেট্-আব্) ; মাথা অত্যন্ত চুলকাই (কষ্ট্, গ্রাক্, সাল্ফ্) ।

চক্ষু । চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষু ক্ষীত, লালবর্ণ, জ্বালাযুক্ত এবং উহাতে চাপিয়া ধরিলে ভয়াবহ বেদনা ; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চক্ষু দিয়া জল পড়া ; পক্ষাঘাত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপা বোধ এবং চক্ষু বুদ্ধি থাকার ইচ্ছা ; (কষ্ট্, কোনাসাম্, জেন্স্, প্লাষাম্) ; ঠাণ্ডা বাতাসে চলিয়া বেড়াইলে চক্ষের মধ্যে টাটানি, খশ্-খশে এবং জ্বালাভূত, গ্যাসেস্ আলোক বা পুস্তকাদি পড়িলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বালির কণা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ চাপা বোধ, চক্ষু রগড়াইলে যাহার বৃদ্ধি হয় (আস্, কষ্ট্, হিপ্-সাল্ফ্, পাল্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; লিখিলে বা পড়িলে চক্ষু সহজেই ক্লান্ত হয় ; ঘোষ বাতির আলোকেই উক্ত অসুখ অধিক্ অসুস্থ হইয়া থাকে (কস্, কুটা, মিরিকা) ; রাত্রিতে চক্ষুর পাতার পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্স-কার্ক্, গ্রাক্, লাইকোপ্, মার্ক্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতার ধার শুক এবং উষ্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি (ষ্টাফিস্, সাল্ফ্) ; এক খানি সন্ধ্যা বা পাতলা কাপড় চক্ষের সম্মুখে রাখিলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ঝাপসা দেখা (কষ্ট্, ক্রোকাশ্, নেট্রাম্-মিউর, পিট্রোল্, ফস্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর সম্মুখে যেন আগুনের কণার ছায় চিহ্ন (বেল্, সাইক্লোমেন্, নেট্রাম্-মিউর, ফস্, সাল্ফ্) এবং এঁকা বাঁকা রেখা ভাসে ; চক্ষুর সম্মুখে দাগ যেন অনেক কাল ভাসে (আগারিকাশ্, মার্ক্, ফস্) ।

কর্ণ । কানে সকল প্রকারের শব্দই লাগে বা সহ্য হয় না (একন্, বেল্, লাইকোপ্, সাইলিসি) কানের মধ্যে সৌ সৌ, কোঁস্ কোঁস্ শব্দ হয় (বেল্, লাইকোপ্, নাইট্রিক্-আস্) ; কানের পাতার মধ্যে এবং উহার

পশ্চাৎভাগে দাঁদের ত্রায় ফুলকানি বিশিষ্ট ফুলুড়ী ; কান দিয়া পাতলা পূঁষ পড়া ।

নাসিকা । নাসিকা প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীত ; নাসারন্ধ্রে ক্ষত এবং উহাতে টাটানি (আলাম্, আণ্টি-ক্লুড্, গ্রাক্, মার্ক্) ; প্রবল শুষ্ক সদি যাহা বায় নাসারন্ধ্রেই অধিক অহুত হইয়া : তরল সদি এবং নাক দিয়া প্রচুব পরিমাণে জলবৎ তরল স্লেয়াব ত্রায় পদার্থ নির্গমন ও বার-বার হাঁচি (একন্, সিপা) ; নাক দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়া, রক্তস্রাবের সময় যাহা অধিক হয় (ফন্) ; নাক দিয়া সবুজ বর্ণের চাপ চাপ ডেলা ডেলা গাঢ় স্লেয়া নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা, হরিদ্রাবর্ণ (হিপ-সাল্ফ্, নেট্রো-মিউর), লালবর্ণ এবং উজ্জল ; গালের উপবিভাগ হইতে নাকের উপর দিয়া আড়া আড়ি ঘোড়ার জিনেব ত্রায় হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে ; মুখমণ্ডলে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে (ফেরাম্) ; মুখে চতুর্দিক তীব্রভাৱে আভাযুক্ত ; ওষ্ঠে দাঁদের ত্রায় ফুলুড়ী ; টুটিতে বর্ণের ত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলকানি বৃক্ক ফুলুড়ী ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । অকালে দাঁত ক্ষয় ; দাঁতের ঘোড়ায় কানিয়া ধরা, ছিড়িয়া ফেলা বা সূচা বিধানের ত্রায় বেদনা বা ব্যতনা বাহা কণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; আহার বা পানের পথ অথবা উচ্চ বা ঠাণ্ডা কোন পদার্থ মুখে দিলেই এই বেদনা অধিক অহুত হয় ; মাড়ি বেদনাযুক্ত, ক্ষীত, কালচে লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত হয় এবং উহা ওষ্ঠের সহজে রক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইটিক্-অ্যাস্, ফন্) ; জিহ্বার উপর ক্ষুদ্র এণ বা ফোকার ত্রায় ফুলুড়ী (বোরাক্স, নাক্স-বন্, নাইটিক্-অ্যাস্) ; জিহ্বা মাঝে লেপযুক্ত (আণ্টি-ক্লুড্, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্ফ্) ; পড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে বেক্রপ হয়, জিহ্বার অগ্রভাগে সেক্রপ অহুত হয় (মার্ক্, আইরিস্, প্লাটিনা) ; মুখে তর্গন্ধ (আণিকা, হিপ-সাল্ফ্, অ্যগ্রেড্, মার্ক্, নাইটিক্-অ্যাস্, নাক্স-বন্) ; ওষ্ঠ, মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিন্, নাক্স-বন্) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চায়না, নাক্স-বন্, পাল্ফ্, সাল্ফ্) ; মুখে টক স্বাদ (ক্যাক্-কার্ক্, চায়না, ম্যাগ্-কার্ক্, নাইটিক্-অ্যাস্, নাক্স-বন্) ; মুখে চট্‌চটিয়া আঠা



স্বাদ বাহা প্রাতঃকালেই অধিক অম্লভূত হয় ; গর্ভাবস্থার দম্ভশূল । গলার মধ্যে হল ফুটানের স্থার অম্লভূত হয় ; গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ এবং টাটানি ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কসিয়া ধরা বা টাটিয়া ফেলাব স্থায় বেদনা বা বাতনা ; গলার মধ্যে প্রচুর স্লেথার সঞ্চার ; কসিয়া গলাবন্ধ বোধিয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে টন্সিল্ প্রদেশে সেক্রপ চাপা বোধ ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে খশ্খশে এবং জালা বোধ, গলায় থেকুর দিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় খাওয়ার অত্যন্ত প্রবল অনিবার্য ইচ্ছা, নতুবা খাওয়ার ইচ্ছা একবারেই না থাকে ; সমুদয় দ্রব্যই অরুচি ; সকল দ্রব্যই লোস্তা লাগে ; বারম্বার তিক্ত বা টক উদ্যার উঠা (নাক্স-বম্, ফস্, পাল্ন্), অথবা পচা ডিম্বেব গন্ধ এবং স্বাদ বিশিষ্ট উদ্যার (আগারিকাশ্, আগিকা, বোরাক্স্) বাহা আহার বা পানের পরই অধিক অম্লভূত হয় ; গর্ভাবস্থাব বমন বা বমনোদ্বগ (কোনায়াম্, ক্রিয়াজ্, নাক্স-বম্, বিরেট্-আব্) ; প্রাতঃকালে বমনোদ্বগ, কিছু খাইলেই বাহা নিবারিত হয় ; আহারের পর বমনোদ্বগ ; আহার দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্বগ ; দুর্লভতা, মাথাঘোবা এবং চক্ষুব সম্মুখে স্কন্ধকার দেখার সহিত বমনোদ্বগ ; পিত্ত এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ; স্পর্শনে পাকস্থলীতে বেদনা (হায়োস্, নেট্রাম্-কার্ক্, সাইলিসি) ; পাকস্থলী এবং উদরে কষ্টদায়ক খালি খালি বোধ (সিমিনিক্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্‌নেস্, পিট্রোল্, পাল্ন্, সাল্‌ফ্) ; এক খানি পাথর বসাইয়া রাখিলে যেক্রপ হয়, আহারের পর পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপা বোধ (ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্ন্) ; পাকস্থলীর মধ্যে দন্দপানি (আন্টি-টার্ট্, আসাফটিডা, পাল্ন্) । যকৃত প্রদেশে স্থচী বিধানের স্থায় বেদনা (আস্, ব্রাই, চায়না, ক্যালী-কার্ক্), পূর্ণ এবং চাপা বোধ ও টাটানি (এপিস্, বেল্, ব্রাই) ; উদরের বাম পাশে স্থচী বিধানের স্থায় অম্লভূত হয় ; উদরে চাপা এবং ভারি বোধ ; উদর ক্ষীত, ভারি, বিস্তৃত এবং বেদনায়ুক্ত হয় (ব্রাই, চায়না, গ্রাক্) ; উদর ক্ষীত হইয়া ঢপ্ ঢপ্ করে ; সন্তান শ্রমের পরও উদর ক্ষীত থাকে ; উদরের মধ্যে প্রবল গড়্ গড়্, কল্ কল্ শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, আইকোপ্) আহা-রের পরই বাহা অধিক হয় ; উদরের উপর কটা বর্ণের দাগ পড়ে ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক এবং শুষ্কদ্বারে আলো এবং চুলকানি (সাল্‌ফ্‌); শুষ্কদ্বারে কন্‌কনানি, টাটানি এবং স্থী বিধানের দ্বার অল্পভূত হয়; অস্ত্রের জড়তা (আলাম্‌, ক্যাম্‌ফার্‌, ওপিয়াম্‌); বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে কেবল শ্লেষ্মা বা দূষিত বায়ু নির্গত হয়; কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় না, অথবা নির্গত হইতে হইতে মল শুষ্কের মধ্যে থাকিয়া যায়; মল ভেড়ার মলের দ্বার (আলাম্‌, ক্যালী-কার্ক্‌, ওপিয়াম্‌, প্রাথম্‌); মল সাদাটিয়া বা কটাব আভাযুক্ত; মলের সঙ্গে স্তব্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্রমি নির্গমন (ফেরাম্‌, মার্‌ক্‌, স্পাইজেল্‌); মল কঠিন এবং অতি কঠিণে নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক দ্বারে চাপা বোধ, বাহ্য মলভ্যাগের পরও দূরীভূত হয় না; (ক্যাক্টাস্‌) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারে চাপ পড়ার দরুণ বারম্বার মূত্রভ্যাগের ইচ্ছা; দিবা রাত্রিতে বারম্বার মূত্রভ্যাগ (আম্‌বা, বোরাক্স্‌, কোনাগাম্‌, ফন্‌-আস্‌); অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিস্তৃত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রাধারে সেরূপ অল্পভূত হয়; মূত্রভ্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাগ্ৰস্ত (একন্‌, আস্‌, ক্যাঙ্ক্‌, কোনাগাম্‌, নেট্রাম্‌-কার্ক্‌); মূত্র ঘোলাটিয়া, কাদাব রঙ্গ বিশিষ্ট এবং উহাতে লালচে তলানি পড়ে; মূত্র গাঢ়, চট্‌চটিয়া আঠা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ক্রিয়াজ্‌) এবং উহাতে হরিত্রাবর্ণের কাইরের দ্বার তলানী পড়ে; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং দুর্গন্ধযুক্ত ও উহাতে সাদা তলানি পড়ে (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, কল্‌চ্‌, গ্রাফ্‌); প্রথম রাত্রে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রভ্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা ।

জননেন্দ্রিয় । স্ত্রীলোকের জরায়ুতে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এত চাপা বোধ হয় যে উহার দরুণ মনে হয় যেন বস্ত্রিকোটরস্থ সমুদ্র যন্ত্র নিম্নদিকে ঘোনি দ্বার দিয়া তৈলরা বাহির হইয়া পড়িবে (বেল্‌, লিগিয়াম্‌-টাটগ্ৰি, নেট্রাম্‌-মিউর, প্রাটিনা) এবং তদরুণ রোগী এক পায়ের উপর অপর পা আড়াআড়ি চাপিয়া রাখে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট; ভিষকোবে যুগ্মবেদনা; ঘোনি এবং ঘোনি দ্বারে অত্যন্ত শুষ্কভূতব এবং স্পর্শনে উহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়; জরায়ু স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় (Prolapsus uteri) (আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, কোনাগাম্‌); জরায়ু এবং ঘোনিদ্বার স্বস্থানভ্রষ্ট হয় এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে আলায়ুক্ত বেদনা বা বাতনা (মার্ক) ; অরারুর গ্রীবার আলায়ুক্ত এবং খোঁচা বিঁধার জ্ঞার বেদনা বা বাতনা ; নির-  
মিত সময়ের অনেক পূর্বে স্বল্প রজঃস্রাব ; নিরমিত সময়ের অনেক পর স্বল্প  
রজঃস্রাব, নিরমিত সময়ে স্বল্পরজঃস্রাব, —রক্ত কালচে (নাক্স-বন্) ; যোনির  
লেখিয়া ( Labia ) নামক অংশ, যোনিদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান  
( Pereneum ) এবং উরুর মধ্যবর্তী স্থান লালবর্ণ এবং উহাতে টাটানি  
( ক্রিয়াজ ) ; শেষ রজঃস্রোধ হওয়ার সময় অসুখ ; ষ্ঠেতপ্রদর এবং তদ্রূপ  
যোনিদ্বার দিয়া হরিদ্রা, বা ছুধের জ্ঞার ক্লেদ নিঃসরণ ( ক্যাক্স-কার্ক,  
কোনারাম্, লাইকোপ্, \*সাল্-ক্-আস ) ; ক্তকারক ষ্ঠেতপ্রদর নিঃসরণ  
(আলাম্, আস্, ক্রিয়াজ ) ; পূর্বের জ্ঞার ষ্ঠেতপ্রদর নিঃসরণ ; যোনিদ্বার  
দিয়া প্রচুরপরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ ক্লেদ নিঃসরণ ; রজঃস্রাবের পূর্বে  
ষ্ঠেতপ্রদর নিঃসরণ ; ষ্ঠেতপ্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনি দ্বারে চুল-  
কানি ; কেবল দিনের বেলায় ছুধের জ্ঞার ষ্ঠেতপ্রদর নিঃসরণ ; গর্ভসঞ্চাবে  
পাঁচ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গর্ভস্রাব ; স্তনের বোঁটার চুলকানি, বাহার  
দরূপ স্তনের বোঁটা দিয়া রক্ত পড়ে এবং উহাতে ক্ত হওয়ার উপক্রম  
হওয়া (গ্রাফ) ।

ঔস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুক কাশি এবং গলার  
মধ্যে ফুৎফুড়ী ; প্রাতঃকালে কাশি এবং গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত  
লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট স্লেয়া নির্গমন (আস্থ্রা, মাগ্-কার্ক, ফস) ; থক্ থক্  
করিয়া শুক কাশি, সন্ধ্যার সময়, শয়ন করিয়া থাকিলে এবং রাত্রিতে যাহার  
অধিক উদ্রেক হয় (কোনারাম্, হায়োস্, পাল্-স্, সাইলিসি) ; বায়ুনলের  
উপরিভাগে ফুৎফুড়ীর দরূপ কাশি (হিপ্-সাল্-ক্, ফস, ক্রমেজ, সাস্থ্নেরিয়া,  
সাইলিসি) ; বুকের মধ্যে স্লেয়ার অত্যন্ত ঘড়্ঘড়ী (ইপিকাক্, আন্টি-টার্ট্,  
ফস) ; কণ্ঠহারী শুককাশি, পাকস্থলী হইতে যাহার উদ্রেক হয় বলিয়া অসু-  
কৃত হয় (ব্রাই) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেষ্ট এবং  
তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন ; গলাদিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁষ সংযুক্ত, দুর্গন্ধ  
যুক্ত এবং লোন্তা স্বাদবিশিষ্ট স্লেয়া নিঃসরণ (আস্থ্রা, কার্কো-বেজ, লাই-  
কোপ, ফস) ; সবলাবহায় গলাদিয়া রক্ত পড়া, চলিয়া বেড়ানোর সময় বা

সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই বৃকে কষ্টাশ্রুতব এবং স্বাসকষ্ট (একন্, আর্স) ; প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্বাসকষ্ট ; কাশির সময় বৃকে স্ত্রী বিধানের জ্বাষ বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক), বাম পার্শ্বেই বাহা অধিক অনুভূত হয় (ফস) ; বৃকের উপর কটাবর্ণের চিহ্ন বা দাগ পড়ে ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন ; সন্ধ্যার সময়, বিছানার শরন করিয়া থাকিলে, উদরস্থ আহার দ্রব্য পরিপাক হওয়ার সময়, হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকের বাম পার্শ্বে স্ত্রী বিধানের জ্বাষ বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা, বাহার দক্ষণ উক্ত অংশ নোহান যায় না, চলিয়া বেড়াইলে বাহার উপশম হয় (বাস-টক্স) ; হৃই স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে এবং বাম স্বক্কাস্থির নিম্ন-ভাগে কন্কনানি ; কোমর এবং গুহদেশের উপরিভাগে কন্কনানি এবং ঘুশুশে বেদনা বাহা উরুদেশ এবং পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; চলিয়া বেড়ানোর সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে দুর্লভতা এবং ক্লান্তি বোধ (নাইট্রাট্) ; কোমরের পশ্চাৎভাগে দণ্ডপিয়া বেদনা (ব্যারাইটা-কার্ক, থুজা) ; হৃই স্বকের মধ্যবর্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বাষ বা পক্ষাঘাতের জ্বাষ বেদনা এবং দুর্লভ বোধ, সন্ধিগুলিতেই বাহা অধিক অনুভূত হয় ; সন্ধিতে বাতের বেদনা ; হস্ত পদাদি সহজেই অসাড় হয় বা উহাতে ঝিঁ ঝিঁ ধবে (সাইলিসি, সালুফ) ; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা । হাড় স্থানত্রষ্ট (Dislocated) হইলে যেক্রপ হয়, স্বক্কে সেক্রপ প্রবল বেদনা (ব্রাই, কটা) ; খেঁতালিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেক্রপ হয়, বাহুর উপরি অংশে সেক্রপ বেদনা (আর্গিকা, জেল্‌স) ; হাতে উষ্ণাশ্রুতব ; কহুইয়ের সন্ধির বাক্ চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্‌সুড়ী । ডাইন উক্তে স্ত্রীবিধানের জ্বাষ প্রথর বেদনা, বাহার দক্ষণ উপশয়ের আশায় রোগী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হয় ; ডাইন উক্তে ক্ষত হওয়ার জ্বাষ টাটানি ; উরু এবং উরুর সন্ধিতে বেদনা বাহা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কুচ্ছির সন্ধির ভাজে আলা এবং টাটানি ; পায়ের পাতা ক্ষীত এবং উহাতে ভারিবোধ ; পায়ের পাতায় দুর্লভবৃত্ত ঘণ্ড (ব্যারাইটা-কার্ক, নাইট্‌ক্-আস),

বাহার দরুণ পাবেব আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া বাইরা চড়্ চড়্ করে বা টাটার (সাইলিসি) ; পায়ের পাতা বরকের ঞায় ঠাণ্ডা (গ্রাফ্, ফন্, বিরেট্-আৰ্) ; রাত্রিতে বিছানায় পাবেব ডিমে (থোড়ায়) খিলখরা (কলোস্, রাস্-টক্স্, সাল্ফ্, বিরেট্-আৰ্) ।

চর্ম্ম । শরীরের নানা স্থানে চুলকানি (রাস্-টক্স্, সাল্ফ্) ; মুখমণ্ডল বাহ, হাত, পৃষ্ঠদেশ, কুচ্কী, উদর এবং জননেত্রিয়ে চুলকানি ; গায়ের স্থানে স্থানে লাল দাদের ঞায় ফুস্ফুসী এবং উহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও জালা-মুভব ; যকৃতের অস্থখের দরুণ যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেক্রপ কটার আভাযুক্ত বা লালচে দাগ পড়ে ; শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত, যাহা সহজে শুকায় না এবং যাহাতে চুলকানি এবং হলফুটানের ঞায় অমুভূত হয় ।

নিদ্রা । দিনের বেলা, প্রধানতঃ পূর্বাহ্নে, নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার অত্যন্ত ইচ্ছা এবং রাত্রিতে ঘুম একবারেই হয় না (ফন্-আন্) ; ঘুমের ঘোরে উচ্চেষ্টরে কথা বলা (নেটাম্-মিউর, সাল্ফ্) ; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে বারম্বার হাত পায়ের ধাক্কা লাগার ঞায় কাঁকনি বা স্পন্দন ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিবার অনিচ্ছা এবং অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ ; রাত্রিতে ঘুম হয় না এবং ঘুম হইলেও উহার দরুণ রোগী আপনাকে আপনি স্নহ মনে করে না এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সে অত্যন্ত হর্ষল হইয়া পড়ে ও শরীর কন্ কন্ করে বা টাটার ; রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ভয় থাইয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠা (কফিয়া মার্ক্, সাল্ফ্) ।

জ্বর । সবিরাম বা পালা জ্বর এবং উহাব সঙ্গে শীতলাবস্থার পিপাসা, হাত পায়ের বেদনা, হাত এবং পায়ের পাতা বরকের ঞায় ঠাণ্ডা ; আঙ্গুল যেন অসাড় হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ; শীতলাবস্থার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, বাহার দরুণ রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে এবং তৎপর প্রচুর ঘর্ম্ম হয় । শরীরের স্বাভাবিক সজ্জাপের অভাব (লেডাম্, সাইলিসি) ; সন্ধ্যার সময়, বহির্কায়ুতে এবং প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে শীতবোধ ; দিনের বেলা, উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ ; গরম জল ঢালিয়া দিলে যেরূপ হয়, গায় সেক্রপ উষ্ণামুভব ; সামান্য নড়া চড়াতেই উষ্ণামুভব ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ এবং তদরুণ অত্যন্ত উদ্বেগ হয় ; উষ্ণতা যেন শরীরের নিয়ন্তাণ

হইতে উর্দ্ধদিকে মাথা এবং মুখমণ্ডলে উঠে একপং অহুত হয়; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ম হয় (ক্যাল্‌ক্-কার্ক, চায়না, মার্ক্, ফস্, সাইলিসি, ষ্ট্যানাম্, সাল্‌ক্-আস্); প্রাতঃকালে ঘ্রুণভাঙ্গিলে প্রচুর ঘর্ম (ক্যাল্‌ক্-কার্ক, নাস্‌-বম্, নাইট্রিক্-আস্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); চলিয়া বেড়ানোর সময় প্রচুর ঘর্ম; সামান্য নড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ম হয় (আস্‌, ক্যাল্‌ক্-কার্ক, হিপ্-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্, ফস্, সাইলিসি); রাত্রিতে বৃকে, (প্রধানতঃ স্তনে), পৃষ্ঠদেশ এবং উরুতে শীতল ঘর্ম হয়।

ব্যবহার। স্বল্প রজঃস্রাব বা রজঃবোধ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব (Metrorrhagia); স্বেতপ্রদর; জরায়ু স্বহান ব্রষ্ট হওয়া; বৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis); সন্তান প্রসবের পরও গর্ভাবস্থার দ্বার পেট উচু থাকা; গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (Morning sickness); প্রমেহ রোগ; বারম্বার গর্ভস্রাব হওয়ার ঝুঁকি; হিষ্টিরিয়া; শুষ্কবায়ু; একপেশে মাথা বেদনা (আধ্‌কপালিয়া মাথাবেদনা); বিকচ (Eczema); দাঁদ বা দাদেন দ্বার ফুসুড়ী; চক্ষু প্রদাহ; বহুত এবং পেটের অসুখ; কোষ্ঠবদ্ধ; কেন্দ্রিকা মজ্জার উত্তেজনা (Spinal irritation); উদরাময়; পক্ষাবাত; কাশি; আভ্যন্তরিক গহ্বের ক্ষোটক রোগ (Tuberculosis); হপিংকফ্ বা কাশি; সন্ধিবাত্তজনিত অসুখ; সবিরাম বা পালান্‌জর; দন্তশূল (প্রধানতঃ গর্ভাবস্থায় এবং হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর); পুরাতন সর্দি; রাত্রিতে প্রথম ঘুমের সময় বিজানাব প্রস্রাব করা; বৃদ্ধা জীলোকের পেট বড় হওয়া; স্তনের বোটার ছাল উঠিয়া যাওয়া; শিশুগণের গায়ের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া ক্ষত হওয়া ইত্যাদি অসুখে সিপিয়া ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী, প্রধানতঃ জীলোকের পক্ষে উপযোগী (পাল্‌স্); জীলোকের শেষ রজঃরোধের সময়ের অসুখ (ল্যাক্, সাস্কুনেরিয়া); জীলোকের যেপ্রকার অসুখে হঠাৎ অত্যন্ত বলকর হইয়া বারম্বার মূর্ছা হয়; বেদনা বজ্রপানির সময় শীতবোধ এবং শরীরের কাঁপনি (আস্, বেল্, পাল্‌স্); শরীরে স্বাভাবিক সন্তাপের অভাব (লেডাম্); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ক্লান্ত হওয়া; ঠাণ্ডা বাতা-

সাদি একবারেই সমুদ্র না ; সমুদ্র শরীরেই নাড়ীৰ স্পন্দনের জ্ঞান, প্রাধানতঃ বুকের বাম পার্শ্বের সমুদ্র অংশের, স্পন্দন ; গর্ভাবস্থা, সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করানোর সময় এবং স্মৃতিকাবস্থায় অস্থিত বিশেষ উপযোগী ; অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার সময়, প্রাতঃকালে, বিশ্রামকালীন ( রাস্ট-টক্স ), আহারের পর, বসিয়া থাকার অবস্থায় এবং স্ত্রী বা পুরুষ সচবাসের পর অস্থিতের বৃদ্ধি ; এবং বহির্বাযুতে, উষ্ণ প্রয়োগে এবং প্রবল শারীরিক পরিশ্রমে অস্থিতের উপশম ইত্যাদি সিপিয়ার কৃতকণ্ডলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, অজ্ঞাত প্রাকৃতিক লক্ষণের সঙ্গে জীলোকের যোনি, কুচক্ষি এবং উরুদেশে দাঁদের জ্ঞান শুকনা ফুসুড়ী থাকাও সিপিয়ার একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । প্রকৃত পক্ষে পাল্‌সেটোলা ব্যতীত অজ্ঞ কোন ঔষধের কার্যের সঙ্গে সিপিয়ার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য নাই । তবে কোন কোন বিষয়ে সিপিয়ার কার্যের সঙ্গে লাইকোপডিয়াম, লিলিয়াম টাইগ্রিনাম, মিউরেজ, একোনাইট, আর্গিনিফ, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ক, কার্কো-বেজ, চায়না, মার্কিউরিয়াম, নাক্স-বমিকা, রাস্ট-টক্স এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট, আন্টিমোনিয়াম জুডাম, আন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, রাস্ট-টক্স ইত্যাদি সিপিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জরায়ুর অস্থিত অনেক সময় ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন দ্বারা অজ্ঞাত ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় ।

— — —

## সাইলিসিয়া,—সিলিকা,—সাইলিসি ।

( SILICIA,—SILICA,—SILIC. )

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত সিলিকা ক্রয় করিয়া উহা যথানিয়মে স্তূগার অব্ মিক্কেব সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উহার ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শতভাগিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ইহার ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আবোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** শরীরের প্রায় সমুদয় যন্ত্রের উপরই ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার দরুণ যন্ত্রাদির মৈত্রিক বিলী, গ্রন্থি, অস্থি এবং সন্ধিগুলিই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । ইহা শরীরের পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া গণ্ডমানা ( Scrofula ) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ ( Rachitis ) উৎপাদন করে । উক্ত অস্থির গতির ন্যায় এই ঔষধের কার্য্যও আন্তে আস্তে, গভীর ভাবে এবং অনেক কাল ব্যাপিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে । শরীরের কোমলাংশ, অস্থির আবরক কঠিন পর্দা ( Periosteum ), অথবা অস্থিতে পুঁয়োৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । প্রতিক্রিয়াতে স্নায়বিক মণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া উঠার উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা উৎপন্ন হয় এবং তদরুণ কসেরুকা মৰ্জ্জার উত্তেজনা ( Spinal-irritation ), জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং তৎপর উহার অবসন্নতা ও পক্ষাঘাত হইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** মন কোন বিষয়েই স্থির থাকে না ; মনে গোলমালে বোধ ( জেল্‌স্, নাক্স-বম্ ) ; সৰ্ব্বদা মনের অস্থিরতা এবং পুঁত্ পুঁত্ করা ; সামান্য শব্দেও চমকিয়া উঠা এবং চিন্তাশূন্য হওয়া ( ককিউলাস্ ) ; সৰ্ব্বদা নিরাশা, নিস্তরুভাবে থাকা এবং জীবনে দিকার বা বাচিবার অনিচ্ছা ; চিড়্ চিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং মানসিক অবসন্নতা ( নাক্স-বম্ ) ; সামান্য বকনের অন্তর কাজ করিলেও মনে হয় যেন অত্যন্ত গর্হিত কাজ করা হইয়াছে ( ইগ্রেস্ ) ; সহজেই মন টলে এবং সৰ্ব্বদা বুক দুড়্ দুড়্ করে ও



চিন্তার ভাব ; সর্বদাই বিমর্ষ ভাব এবং রোগী মনে কবে যেন সে মরিবে ; কোন বিষয়ে চিন্তা কবার অশক্তি ( জেল্‌স্, ল্যাক্ ) ; রোগী শিশু হইলে তাহার নিকট কোন কথা বলিলে সে কাঁদে ( ক্যাম্ ) ।

মস্তক । নেসা করিলে যেকূপ হয়, মাথায সেরূপ অনুভূত হয় ( জেল্‌স্, ক্যানাবিস্-স্যাট্, নাক্স-বম্ ) ; মাথাঘোরা, যাহার দরুণ রোগী সম্মুখ দিকে বারম্বার টলিয়া পড়ে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, গাড়ী ঘোড়ায় চাপিলে, অথবা উপরের দিকে তাকাইলে যাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথায রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং উচ্চাতে জ্বালালুভব ; মাথায চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মস্তক এবং চক্ষু উহার কোটির হইতে ঠেলিয়া বাহির হইবে ( একন্, ব্রাই, ক্যালী-আমোড্ ) ; মাথায দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা ঘাড় হইতে আরম্ভ হইয়া মাথায উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথায প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ; প্রাতঃকালে মাথায চাপিয়া ধরার ভ্রায় প্রবল বেদনা এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ এবং বমনোদ্বেষণ ; মাথায দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা কপাল এবং মাথায উপরিভাগেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ ( পাল্‌স্, আলোজ্, ক্যাস্ট্, ক্যালী-বাট্, নাক্স-বম্ ) ; মাথায ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় অত্যন্ত যাতনা, যাহা মাথায এক পার্শ্বেই সচরাচর অধিক অনুভূত হয় এবং যাহা মাথায পশ্চাৎ ভাগের উন্নত স্থান হইতে আবস্ত হইয়া উপর এবং সম্মুখ পানে বিস্তৃত হয় ; মাথা ধবা এবং উহাব দরুণ চক্ষুয উপরিভাগে মোচড়াইবা পড়া বা থেঁত-লিয়া যাওয়ার ভ্রায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চক্ষু মেলিতে পারে না ; কপাল এবং কপালের দুই পার্শ্বে স্ফীতি বিধানের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা ; মাথায পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা, মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তা, গোলমালে, নড়াচড়াতে, খাকি লাগিলে, আলোকে, মাথা হেট করিয়া উপুড় হইলে, ঠাণ্ডা বাতাসে, মাথা কপিয়া বাঁধিলে মাথা বেদনার বৃদ্ধি ( অ্যাজেট্-নাইট্রিক্ ) ; মাথা গরম কাপড় দিয়া বাঁধিলে মাথা ধরার বৃদ্ধি ( ম্যাগ্-মিউর ) ; গরম, ভিজা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং উষ্ণ ঘরে মাথা বেদনার বৃদ্ধি ; মাথায অব্যাদেশহিত মমুদয়ই যেন জীবিত একরূপ

অম্লভূত হয়; অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে মাথা ধরার উদ্রেক বা বৃদ্ধি; রাত্রিতে মাথা প্রচুর ঘর্ষ দ্বারা আবৃত (চায়না), বাহ্যিক দ্রবণ মাথা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা হয়; মাথা বড় এবং উঁচর ঠিক উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontanelles) এবং শরীর শীর্ণ এবং শিটা; উদর ক্ষীণ এবং উষ্ণ (ক্যাক্স-কার্ক); মাথায় সামান্য চাপ, এমন কি টুপীর চাপও, সহ হয় না (কার্কো-বেজ, চায়না, মার্ক); মাথার পশ্চাত্তাগে আর্দ্র, শুষ্ক, অথবা ছর্গন্ধ যুক্ত কল্কানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; মাথায় পূঁখু, সংযুক্ত, জালাযুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট পোস পাঁচড়া (হিপ-সাল্‌ফ্‌, গ্রাফ, লাইকোপ্‌, রাস-টক্স, সাল্‌ফ্‌); মাথায় চুলকানি (ক্যাক্সার, সিপিগ, মাল্‌ফ্‌) বাহ্য চুলকানের পর বেদনায়ুক্ত হয় এবং জ্বালা করে (মার্ক); মাথা এবং গ্রীবা দেশে পূঁখ বা জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী, গরম ভাবে বাঁধিয়া রাখিলে দ্বিবার উপশম হয়।

চক্ষু । চক্ষুপ্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষু লালবর্ণ হয়, উঁহাতে জ্বালায় উদ্রেক হয় এবং চিড়িক মারে ও উঁহা হইতে প্রচুর পরিমাণে জল পড়ে (আলম, ক্যাক্স-কার্ক, লাইকোপ্‌, মার্ক, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফ্‌); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে (ক্যাক্স-কার্ক, গ্রাফ, লাইকোপ্‌, ফস্‌, সাল্‌ফ্‌, রাস-টক্স); বালি পরিপূর্ণ থাকিলে যেরূপ হয়, চক্ষুর মধ্যে প্রাতঃকালে সেকরপ শুষ্কাত্ব (আর্স্‌, কঠ, হিপ-সাল্‌ফ্‌, পাল্‌স্‌, রাস-টক্স, সিপিগ); চক্ষু বুজিয়া চাপদিলে চক্ষে ছিড়িয়া ফেলা বা খোঁচা বিধার দ্বারা বেদনা বা যাতনা; ডাইন চক্ষুর জল নিঃসাবক গ্রন্থি এবং উঁহার আধারের ক্ষীণতা এবং উঁহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু চর্মে প্রদাহ; দৃষ্টিশীনতা; পাখীৰ ডানা ঝাড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেকরপ অথবা ক্রাশার দ্বারা অম্লভূত হু (ফস্‌); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) নাগী (Pistula); চক্ষুর পাতায় বড় আঙ্গনি (Stye) বাহ্য বারম্বার হয় এবং বারম্বার সারিয়া যায়; পড়িবার সময় মনে হয় যেন পুস্তকাদির সমুদয় অক্ষর একত্র জড়াইয়া গিয়াছে (নেট্রাম-ইউ); পুস্তকের অক্ষরাদি যেন মলিন বা ফিকা কালী দিয়া মুদ্রিত; চক্ষুর সম্মুখে ঝাল দাগ ভাসে (আগারিকাশ্‌, সাইক্লোমেন্‌, মার্ক, ফস্‌, সিপিগ, সাল্‌ফ্‌); কর্ণিয়াতে কঠ, দাগ পড়া এবং উঁহার অস্বচ্ছতা (ইউফ্‌স্‌, নাই-

টিক্-আস্, সাল্ফ্); চক্ষুশালোক অভ্যন্ত লাগে বা সহ হয় না; চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ বা অশ্বনের কণাও জায় কণা ভাসে (নাক্স্-বম্)।

কর্ণ । কর্ণের বহির্দেশ ক্ষীত, এবং কর্ণের মধ্যদেশ হইতে জলের জায় তরল ক্লেদ নিঃসরণ এবং কানের মধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ হওয়া; কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইট্ কার্ণ্, হিপ্-সাল্ফ্), গিলিবার সময়ই বাহা অধিক অনুভূত হয়; কান বন্ধ হয় (কোকাণ্, মাজেনিজ্) বাহা হঠাৎ শব্দ হইয়া সময়ে সময়ে পুলিয়া বায়; কানে কম শুনা, বিশেষতঃ মহুঘোর স্বর (ফস্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ এবং গানের শব্দের জায় শব্দ হয় (চায়না, মার্ক্, সাল্ফ্); কানে কোন প্রকারের শব্দই সহ হয় না (একন্, বেগ্, লাইকোপ্, সিপিয়া)।

নাসিকা । বারবার ঐবল হাঁচি অথবা হাঁচি হওয়া হওয়া হইয়া হয় না; নাক দিয়া ক্ষতকারক প্রেয়াদি নিঃসরণ (আস্, আমন্-কার্ণ্, এরাস্, মার্ক্-কর); শুষ্ক সর্দি এবং নাসারন্ধ্র একবারে বন্ধ হইয়া থাকে (নাক্স্-বম্); পর্যায়ক্রমে তরল এবং শুষ্ক সর্দি (আলান্, নাক্স-বম্, ফস্); নাকের মধ্যে শুষ্ক, বেদনাভূত এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় ক্ষত হইয়া উহাতে চুমটী পড়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেগ্, ব্রাই, ফস্-আস্); নাকের মধ্যে চুলকানি (সাল্ফ্); আঘাত লাগিলে ঘেরূপ হয়, নাকের হাড় সে রূপ বেদনা বা বাতনা; ভ্রাণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (ক্যানী-বাই, সিপিয়া); অনেকক্ষণ ধরিয়া নাসিকার অগ্রভাগের চুলকানি।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং বাতনার চিহ্ন বিশিষ্ট; নিম্ন ওষ্ঠের লাগ অংশে ক্ষত; ওষ্ঠের কোণে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষত (আন্টি-ক্রুড্, লাইকোপ্, গ্রাক্, রাস্টক্স্) এবং উহাতে চুলকানি; টুটিতে দাঁদের জায় ক্ষত (হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাক্); ইন্ডাস্ট্রিয় নিম্নস্থিত গ্রন্থির অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষতি (হিপ্-সাল্ফ্)।

মুখগহ্বর এবং গলারমধ্য । উচ্চ আহার ভ্রব্য খাইলে বা মুখ দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস টানিলে দাঁতের গোড়ায় বেদনা বা বাতনা (ক্যাক্-কার্ণ্, মার্ক্, সাল্ফ্); দাঁত নড়ে এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বালিয়া অনুভূত হয় (আস্, মার্ক্, রাস্-টক্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি ক্ষীত এবং

বেদনায়ুক্ত হয় ; দন্ত মাড়ি ত্রণ (Gum-boils) : মুখের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিলেই মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনাব উদ্ভব হয় ; জিহ্বা অত্যন্ত টাটায় ; এক গাছি চুল লাগিয়া থাকিলে বেকুপ হয়, জিহ্বার সম্মুখ ভাগে সেরূপ অল্পভূত হয় ; মুখ দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয় (আগ্নিকা, হিপ্-সাল্ফ, আযোড, মার্ক, নাইট্রিক্-আস্) ; মুখের মধ্যে শুকবোধ (আস্, এপিস্, নাক্স-মক্, সিপিয়া, পাল্‌স্) । ক্ষত হইলে বা ডেলার জ্বায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বেকুপ হয়, গিলিবার সময় গলার মধ্যে সেরূপ বেদনা, যাতনা বা টাটানি ; গিলিবার সময় গলার মধ্যে চাপিয়া ধরাব জ্বায় বেদনা বা যাতনা এবং কুট্-কুটানি ; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় নাক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় তৃষ্ণা, নতুবা ক্ষুধা একেবারেই থাকে না ; অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, রাস্-টঙ্ক, সিকেল্) ; প্রাতঃকালে মুখে তিক্তস্বাদ (ব্রাই, পাল্‌স্, চায়না, সাল্‌ক্) ; টক্ উদগার উঠা (কার্কো-বেজ্, নাক্স-বম্, ফন্, পাল্‌স্) ; জল ভাল লাগে না, বাহার দরুণ জল খাইলেই বমন হয় ; আহারের পর পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপা বোধ (আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, সিপিয়া) ; পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালাহুতব (আস্, ক্যাছ্, কস্, সাস্থ্-নেরিয়া) ; চাপিলে পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনাভূত হয় (হারোস্, নেট্রাম্-কার্ক, সিপিয়া, পাল্‌স্) ; পাকস্থলীতে নিঙ্‌ড়ান বা আঁকড়াইয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা, আহারের পরই নাহা অধিক অল্পভূত হয় ; ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু কোন দ্রব্যে রুচি থাকে না, বাহার দরুণ কোন দ্রব্য মুখে দিলেই বমনোদ্যোগ হয় । বকৃত প্রদেশের ক্ষীতি এবং উহাতে অস্থখ এবং চাপাবোধ ; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত ও কঠিন (আস্, ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাক্-কার্ক, মার্ক্) ; উদরে প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু সঞ্চার এবং উহাতে গড়্‌গড়্‌, কল কল শব্দ হওয়া (আগ্নিকান্, আলোজ্, হিপ্-সাল্‌ক্) ; শুষ্কতার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাক্) ; উদরে কনঠবৎ এবং চিন্তিনে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ; উদরের মধ্যে জ্বালাহুতব (আস্) ; কুচকীর গ্রন্থির ক্ষীতি (বাগী) ।

**মল এবং মলদ্বার ।** শুষ্ক দ্বারে কঠিনবৎ এবং হল ফুটানের স্তায় বেদনা বা যাতনা ; মলত্যাগের সময় শুষ্কদ্বারের মধ্যে জ্বালা এবং হলফুটানের স্তায় যাতনা ; শুষ্কদ্বার বেন সর্বদা তিজা থাকে (কার্কো-বেজ্, কার্কো-আনিমেল্, মার্ক্-কর) ; শুষ্কভাবে জ্বালা (আস্, ক্যাহ্, সান্‌ক্), শুষ্ক, কঠিন মলত্যাগেব পাই যাপি অধিক উদ্বেক হয় ; অনবরত বাহ্যে বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (নাক্স-বন্) ; উদরাময় এবং মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (আস্, আসাকিটিডা, লেপ্‌টেণ্ডা) ; কাইয়ের স্তায় তরল শ্লেষ্মা ভেদ ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল পরিমাণে অল্প, কঠিন পদার্থ যুক্ত, ফিকা রঙ্গবিশিষ্ট এবং শুষ্ক জড়তা বদ্বয় যেকপ হয়, মল নির্গত হইতে দেরূপ কষ্টানুভব (আলাম্), ও মল একবার কতক পরিমাণে নির্গত হইয়া পুনরায় শুষ্কদ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; রক্তশ্রাবের সময় এবং উহার পূর্বে কোষ্ঠবদ্ধ ; অমাবশ্টা, পূর্ণিমাতে উদরাময় ; মলের সঙ্গে ক্ষুদ্রবৎ গোল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁচি নির্গত হয় ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শ রোগ এবং অশ্ৰু অত্যন্ত কষ্টদায়ক অর্শেব অন্তর্কর্ষী বাহ্য প্রত্যেক বার মল ত্যাগের সময় শুষ্ক দ্বারের বাহির হইয়া পড়ে (আলোজ্, ক্যাক্-কার্ক্, ল্যাক্, মিউর-আস্, পাল্‌স্) ।

**মূত্রযন্ত্র ।** বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় এবং মূত্রাধাবের সঙ্গেচক যন্ত্রের উত্তেজনার দ্বয় অত্যন্ত যাতনা ; মূত্রে লাল বাণির স্তায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্) ।

**জননেন্দ্রিয় ।** পুরুষের হয় জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, নতুবা উল্ল ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা উহা একবারেই না থাকা ; রাত্রিতে পুরুষাদ্ অত্যন্ত শ্রবল বেগে খাড়া হয় (গ্রাক্) ; রাত্রিতে শ্রবণে খাড়া নিঃসরণ (চারনা, ডিজিট্, ফন্-আস্) ; মল ত্যাগের সময় বেগ দিলে খাড়া নিঃসরণ (আগ্‌নাশ্, সেনিগা) ; পুরুষাঙ্গের মাধার আবরক চর্ম ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্তায় লালবর্ণ হয় এবং চুল্‌কায় (মার্ক্) ; জীসহবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত হ্রাস বা প্রায় বিনাশ (আর্জেট্-নাইট্রাশ্, হিপ্-সাল্‌ক্, লাইকোপ্, ম্যাগ্-কার্ক্) ; অণ্ডকোষাধার বা পোতার নানা স্থানে চুলকানি বিশিষ্ট ফুস্‌ড়ী (পিট্রোল্, সাল্‌ক্) ; অণ্ডকোষাধারের শোথ (পোতার জল হওয়া,—Hydrocele) ; পোতায় ঘর্ষ হওয়া (রডোডেণ্ড্‌ন) ।

রক্তস্রাবের বৃদ্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে বারম্বার  
বরফের জায় ঠাণ্ডা বোধ; রক্তঃস্রাব (কলোফিলাম, সিমিসিক,  
পালস্); নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে রক্ত-  
স্রাব; শিশুকে স্তন দ্বারা পান করণের সময় জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে  
টাট্কা রক্তস্রাব; স্বস্তুর সময় রক্তস্রাবের পদবিবর্তে জরায়ু হইতে সাদা  
জলের ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ (পালস্); প্রচুর পরিমাণে উগ্র, ক্ষত কারক স্বেত  
প্রদর নিঃসরণ; তলপেটের সমুদয় বস্ত্র যেন নিম্নদিকে ঠেগিয়া নামিতেছে  
বোনি হারে একরূপ অম্লভূত হয়; বোনিতে চুলকানি, জ্বালা এবং টাটানি  
(শাল্ফ্); স্তন ক্ষীত, কঠিন এবং বেদনায়ুক্ত (কোনারাম), যাহার দরুণ যেন  
হয় যেন স্তনে কোড়াপি হইবে (মার্ক্, কাইটোল্) এবং যাহা স্তনের বোটার  
নিকটই অধিক অম্লভূত হয়; বাম স্তনের বোটার ছুঁয়া দিয়া কাটার জায়  
বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; স্তনের বোটার ক্ষত এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি।

ঋণময়ন্ত্রে । স্বরভঙ্গ; কণ্ঠনালীতে ঋণ্ণগ্ণে স্রাব (হিপ্-সাল্ফ্,  
কার্কো-বেজ্, রাস-টল্, ক্যালী-বাই); শুষ্ক শ্বশ্বশ্বশ্ব কাশি এবং উহার  
সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ ও গলার মধ্যে স্ফুটস্ফুটী ও চড়্ চড়ানির দরুণ বৃক  
টাটানি (ফস্, কমেজ্, সান্নুনেরিয়া, সিপিয়া); কাশি, সন্ধার সময় এবং  
রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উদ্রেক হয় (কোনারাম্, পালস্,  
সিপিয়া); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলে কাশি; গলা দিয়া গাঢ়, হারিভাবের,  
ডেলার জায়, পূর্ব সংযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন (কার্কো-বেজ্, লাইকোপ্,  
টাকিস্); গলা দিয়া চট্চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা নির্গমন (টোনারাম্); বাস প্রস্থান  
বামবোধ এবং ঘন ঘন, হাঁপানির জায়; বেলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া  
পড়িলে যেদর হয়, কাশির সময় বৃকের মধ্যে স্ফুট বেদনাজুড়া (আণিকা,  
এপিদ্); বৃক এবং উহার পার্শ্বে বাটিয়া ধবার জায় বেদনা বা বাতনা (বাই,  
ক্যালী-কার্ক, ফস্, সিপিয়া); বক্ষস্থি (Sternum) প্রদেশে চাপিয়া ধরার  
জায় বেদনা বা বাতনা।

জ্বংপিপ্ত । বসিয়া থাকা কালীন জ্বংস্পন্দন বা উহার দ্রুতপানি,  
যেহা সমুদয় শরীরেই অম্লভূত হয়; প্রত্যেকবার নড়া চড়াতেই জ্বংস্পন্দন।

প্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । প্রাণদেশ এবং কর্ণমূলস্থিত প্রাণগুলি ক্ষীত

ও কঠিন হয় এবং পাকিয়া উহাতে পূর্বের সঞ্চার হয় (ব্যারাইটা-কার্ক, ক্যাক-কার্ক, আরোড); ষাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া (চেলিডন্, ইয়েস্); পৃষ্ঠ দেশের দুর্বলতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের জ্বায় অবশবোধ, বাহার দক্ষণ চলিয়া বেড়ান এক প্রকার অন্তর্বহ হইয়া পড়ে; কোমর এবং গুহ দ্বারের উপরিভাগে কন্-কনানি, খোঁচা বিঁধার জ্বায়, জালায়ুক, দপ্‌দপিয়া বেদনা; হুই স্বক্কাহির মধ্যবর্তী স্থানে এবং উরার নিম্নভাগে ছিড়িয়া কেগার জ্বায় বেদনা বা যাতনা; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইবার সময় এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা এবং তদক্ষণ উক্ত অংশ নোয়ান যায় না; মারিলে যেকূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুটকি প্রদেশে নেকূপ বেদনাশুভব; গাড়াতে চাপিয়া অনেক ক্ষণ বেড়াইলে যেকূপ হয়, গুহ দ্বারের ঠিক উপরি ভাগের হাড়ে সেক্ষণ বেদনা বা যাতনা; গুহ দ্বারের উপরি ভাগের হাড়ের মধ্য দিয়া হল ছুটো-নের জ্বায় অগ্নুভূত হয় এবং চাপিলে উক্ত স্থানে বেদনা বা যাতনার উল্লেখ হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। নখ কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণ, অব্‌ডু খাব্‌ডু এবং নট্‌কা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, বাহার দক্ষণ রোগী কদাচিত্ত চালতে পারে; সামান্য কারণেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরা (সিপিয়া, সাল্‌ক্); পা এবং পায়েব পাতা ববকের জ্বায় ঠাণ্ডা (বিরেট্-আব্); অঙ্গ প্রত্যঙ্গে টাটানি এবং অবশবোধ। বাহুতে ভারিবোধ এবং উহাতে পক্ষাঘাতের জ্বায় অবশবোধ; সমুদয় অঙ্গের কাপনি, হাতেই বাহা অধিক অগ্নুভূত হয়; বোগলের গ্রন্থিরঅ্যাম্‌স্‌ ক্ষীতি (ব্যারাইটা-কার্ক, লাই-কোপ্); মণিবন্ধ এবং হাতের পাতাব তালুতে ছিড়িয়া কেগার জ্বায় প্রবল বেদনা বা যাতনা; চাপিয়া শয়ন করিলে বাহু অবল বা অসাড় হয়; সামান্য পরিশ্রমেই হাতে ঝিল ধরে এবং উহাতে অবশবোধ হয়; হাতে প্রচুর ঘর্ম; রাত্রিতে হাত যেন অসাড় হইয়া থাকে; অঙ্গুলীর অগ্রভাগ গুহ; হাত গুটানের সহায়কারী পেশীর (Flexor-muscles) অগ্রভাগে (Tendons) সঙ্কোচন, অঙ্গুলী সঞ্চালনের সময় বাহা অত্যন্ত বেদনানুরূপ হয়; পাকিয়া পূর্ব

হওয়ার উপক্রম হইলে বা আঙ্গুল হাঁড়া (Whitlow) হইলে যেকোন হয়, আঙ্গুলে ছিড়িয়া ফেলা, কাসিয়া ধরা বা বাটিয়া ধরার জ্বার সেকোন বেদনা বা যাতনা এবং অবশবোধ (হিপ্-সাল্ফ, নার্ক্) । নিম্নাঙ্গে ভারি এবং প্রান্তিবোধ ; উরুর সন্ধি এবং উক্তে ছিড়িয়া ফেলা বা কাসিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; কুচকিৰ সন্ধিতে পূঁথ হওয়ার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; অত্যন্ত কাসিয়া বাধিয়া রাগিলে যেকোন হয়, হাঁটুর সন্ধিতে সেকোন বেদনা বা যাতনা ; পায়ের ডিনে (খোড়ায়) খিল ধবার জ্বার কাসিয়া বা বাটো ধরা ; পায়ের পাতা ক্ষত এবং লালবর্ণ ; প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সময় পার বমনোৎপাদক দুৰ্গন্ধ, কিন্তু ঘষ হয় না ; পায়ের পাতায় অত্যন্ত দুৰ্গন্ধযুক্ত ঘষ (ব্যাণাইটা-কার্ক, নাই-ট্রিক্-অস্, গ্রাক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের কাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার ক্ষত (সপিগা) ; পায়ের পাতায় তলায় খিল ধরা (কার্কো-বেজ্, সাল্ফ্) ; পায়ের পাতার তলায় ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বার ক্ষত এবং উহাতে জ্বালা (কার্ক্, কার্কো, সাল্ফ্) ; পায়ের বুদ্ধাঙ্গুলেতে অনবরত হিঙ্গ কদা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; পায়ের আঙ্গুলের নখ আঙ্গুলের কোণে প্রবিষ্ট হওয়া (Ingrowing toe-nails) এবং তদ্বৎ আঙ্গুলের কোণে দিগ্ দুৰ্গন্ধযুক্ত পুঁথ নিঃসরণ ; কড়িতে (Jorn-) হুতা বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা (সাল্ফ্) ; পায়ের আঙ্গুলের নখের নাচে হুতা বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা ।

চর্ম্ম । সান্নাতি যাও সহজে শুকাই না এবং উহাতে প্রচুর পুঁথের সঞ্চার হয় (গোরায়্, হিপ্-সাল্ফ্, গ্রাক্, সাল্ফ্) ; গায় অত্যন্ত বেদনা-বুদ্ধ বা কষ্টদায়ক রূপের জ্বার ক্ষত ক্ষত দুস্কৃতা (দিকুটা, ক্রোটন, সাল্ফ্) বাহ্য অবশেষে পুঁথ পুঁথ ক্ষতে পরিণত হয় ; গায় দাদ বা বিকচের জ্বার দুস্কৃতা (গ্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; ত্রণ হওয়ার ধাতু ; শরীরের নানা স্থানে ত্রণ হয় ; গায় ক্ষত এবং উহাতে ছাল কুটান বা বাটিয়া ধরার জ্বার জ্বালাবদ্ধ বেদনা বা যাতনা ; দুৰ্গন্ধযুক্ত ছালার জ্বলের জ্বার ছেক্ড়া ছেক্ড়া পর্দার জ্বার পদার্থ বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহাতে মাংসের অস্বাভাবিক ব্রন্ধি (Proud-flesh) (অস্, কার্কো-বেজ্, গ্রাক্) ; পর্দা বিশিষ্ট স্থানে মুক্ত আকারের সাংঘাতিক ক্ষত এবং উহাতে পুঁথের সঞ্চার ; গ্রন্থির বেদনাইন



ক্ষীতি ; গ্রন্থির পূর্ব সঞ্চিত ক্ষীতি (গ্রাফ্, হিপ্পো-সাল্ফ্) ; নানী বা এবং উহা ইহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূর্ব নিঃসরণ ও ঘাঘের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান কঠিন, ক্ষীত এবং নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ (আণ্টিমোনিয়াম্, ক্যাঙ্ক-কার্ক, ক্যালী-আমোড্) ; বা উকাইয়া গেলে ঘাঘের স্থানে বিপ্রি দাগ থাকিয়া যায় ।

নিদ্রা । আগারের পর ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা (ক্যালী-কার্ক, নাক্স-মক্) ; সন্ধ্যার সময় ঘুমের অত্যন্ত ইচ্ছা ; অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রাঘারা রোগী আপনাকে আপান হুহ মনে করে না ; ঘুমেরঘোরে ভয় বাইয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠা এবং তদ্রূপ সমুদয় শরীরের কাঁপনি ; এলোমেলো, ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; যৌবন কালের এবং গত ঘটনার বিষয়ে চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; ঘুমেরঘোরে স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের স্বপ্ন দেখিয়া অনিচ্ছাপূর্বক ধাতু নিঃসরণ (ফস্-আস্) ।

জ্বর । অন্তঃপত শীত বোধ, শারীরিক পবিত্র্যম এবং উষ্ণ ঘরে থাকিলেও বাহ্য অল্পভূত হ্রস্ব (পাল্ফ্) ; জ্বর এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে মাথার অত্যন্ত উষ্ণভাব (বেল্) ; বাবঘার দম্কা উষ্ণভাব, মুখমণ্ডল এবং মাথা-রই বাহ্য অধিক অল্পভূত হ্রস্ব ; রাত্রিতে জ্বরের বৃদ্ধি ; রাত্রিতে প্রচুব ঘর্ম (গায়না, সাল্ফ্-আস্, ষ্ট্যানাম্) ; ঘর্ম দুর্গন্ধযুক্ত (কালো-আনিমেল্, আগিকা, আস্) ; সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই ঘর্ম হ্রস্ব (সিপিরা, আস্থা, ক্যাঙ্ক-কার্ক, হিপ্পো-সাল্ফ্, লাইকোপ্, ফস্) ; পূর্বাঙ্গি রসক্ষয় হেতু জ্বর বা হেক্-টিক্ ফিবার (Hectic-Fever), বিশেষতঃ অনেক কাল ধরিয়া পূর্ব বারি রক্ত বিযাক্ত হওয়ার দরুন অসুখ (ক্যাঙ্ক-কার্ক, হিপ্পো-সাল্ফ্, ফস্, সাল্ফ্) ; ক্রমির উত্তেজনাভ্যনিত জ্বর ।

বাবহার । পূর্ব সঞ্চিত অসুখ বাহ্য আন্তে আন্তে বৃদ্ধি পায় ; গ্রন্থির অসুখ, ফোড়া, ক্ষত, আঙ্গুল হাড় (Whitlow) ; ব্রণ ; দুইব্রণ (Carbuncle) ; কৰ্কট-বোগ (Cancer) ; অস্থি পোকাখ ধরা (Caries) ; গণ্ডমালা (Scrofula) , এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশজনিত অসুখ ; (Rachitis) ; অস্থির অসুখ ; গ্রন্থির অসুখ ; শোথ ; পেণীক্ষর বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus ; অস্থিক্ষর (Necrosis) ; ইংরেজী টিকা দেওয়ার (Vaccination) দরুন অসুখ ;

কসেরকা স্ফকীয় অস্থি ; অস্থির আবরক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis) ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্ ; বিকচ ; দাঁদ বা দাঁদের জ্বর চক্ষু রোগ ; হাঁপানি কাশি ; অভ্যন্তরক বস্ত্রের ক্ষেটিক বোগ (Tuberculosis) ; রক্ত-বোধ বা গৌণে প্রথম রক্তস্রাব ; জ্বাশু হইতে রক্তস্রাব (Metrorrhagia) ; শ্বেতপ্রদর ; মূত্রিকা পাণ্ডুবোগ (Chlorosis) ; স্তনের প্রদাহ বা উদাহতে ফোড়াহি হওয়া ; অণ্ডকোষাদ্যেরেব শোণ বা পোতায় জল হওয়া (Hydrocele) ; রাত্রে স্বপ্নে অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রত্যাগ বা বিছানায় প্রস্রাব করা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ রোগ ; নানিকা স্ফকীয় সন্ধি ; কান দিয়া পুঁথ পড়া ; চক্ষুর কণিরার অস্থি, উদাহতে ক্ষত, এবং উহার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea), লিম্ফেটিক গ্রন্থ স্বক্ষতি ; গণ্ডমালা, পারার অপব্যবহার বা স্কার্ভি জনিত (Scurbutic) ক্ষত ; মাথা ঘোরা ; মাথায় ঘা ; তরুণ অস্থির দরুণ মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ; চক্ষু ছানি পড়া ; দৃষ্টিহীনতা ; কানে কম শুনা ; পুরাতন সন্ধি এবং সামান্য কারণেই সন্ধি লাগার ধাতু ; ঘস্কা কাণ জনিত অস্থি বধা, —রক্তোৎকাশ, ছুরণ কারক ঘস্কা, পুঁথ নাঃসরণ ইত্যাদি ; হাঁটুর সন্ধি ক্ষতি ; হাড়ের পক্ষাঘাত ইত্যাদি অস্থি সাহায্যসহ্য ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** সর্বদা দুঃস্বপ্নতা এবং তদরুণ সর্বদা শয়ন করিয়া থাকিব হুহু ; শরীরক পরিশ্রমের সময়ও খেন গাং স্বাভাবিক সন্তাপ থাকে না ; সামান্য কারণেই সন্ধি লাগা ; সমুদয় শরীরেই খেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ির জ্বর বেদনা বা যাতনা (আনিকা, ব্যাপ্ট) ; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায়, সে পার্শ্বের সমুদয় অঙ্গেই ক্ষত হওয়ার জ্বর বেদনা এবং গায়ের কাপড় ফোলা দিলেই অত্যন্ত শীত বোধ, পিপাসা এবং মাথায় উকাহুতব ; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট বালক বাণিকার অস্থি ; পেট বড়, মাথা বড়, পায়ের পাঠার সন্ধি দুর্বল এবং মাথায় প্রচুর ঘস্কা ও অনেক কাল মাথার ঠিক উপরি ভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকা (Open-Fontanelles) ; শরীরের অসম্পূর্ণ পরিপোষণ হেতু দুর্বলতা ; পুঁথ উৎপাদন করার উপর হহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, বাহার দরুণ ইহা সেবনে ফোড়া পাকে এবং আক্রান্ত স্থানে অতিরিক্ত পরিমাণে পুঁথ উৎপন্ন হইলে পুঁথের স্কার কম হয় (হিপ্-সাল্ফ, মিউর-আস্,

ফাইটোল) ; ইংরেজী টিকা দেওয়া জনিত অসুখ ; পূর্ণিমা, অমাবস্তাতে (কষ্ট), নড়াচড়াতে, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে, মাথা আঁদুল করিলে বা রাখিলে অসুখের বৃদ্ধি এবং মাথা ঢাকিয়া রাখিলে, উষ্ণতাতে, ঘরের মধ্যে থাকিলে বা গরম কাপড়াদি পরিয়া থাকিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাইলিসিয়ার কতক গুণি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** সাইলিসিয়ার কার্যের সঙ্গে ফ্লুরিক্ অসিড্, ফক্সিক্-অসিড্, পিক্রিক্ অসিড্, ক্যাল্কেবিয়া কার্ব, হিপার সাল্ফিউরস্, মাকিউবিনাস্ এবং ফক্সবাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইচ্ছা কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, কার্বো-বেঞ্জিটেবিলিস্, গ্রাফাইটিন্, ল্যাক্সেসিস্, লাইকোপডিয়াম্, পাল-মেটিল, রাস্-টেক্স, লিপয়া, সাল্ফার এবং খজার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ক্যাম্ফা, হিপার-সাল্ফিউরস্ এবং ফ্লুরিক্ অসিড্ সাইলিসিয়ার প্রাতঃঔষধ ঔষধ মধ্যে পরগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৬:২ এবং ৩০ ক্রমই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কখন কখন ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, কর্কট রোগের বেদনাদি নিবারণের জন্য ১ম এবং ২য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন । কোন কোন প্রকারের পুৰাতন রোগে এই ঔষধের ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় । ১ম দশমিক ক্রমের শুঁড়া, ১ গ্রেইন মাত্রায়, প্রাতঃদিন ৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিয়া কএকটা বক্ষা কাশাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রচুর শ্রম এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তে ছিটুকু পুঁথ নির্গমন নিবারণার্থ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে । নেত্র নালীর (Fistula Lachrymalis) চিকিৎসায় ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে ৩৪ টী রোগীর চিকিৎসায় আশাচরিত ফল পাওয়া গিয়াছে । আস্থর অসুখে ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ক্রমের শুঁড়া, এক গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় ।

## সাল্‌ফার, (গন্ধক)—সাল্‌ফ্‌।

(SULPHUR,—SULPH.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধানয় হইতে পরিকৃত গন্ধকের গুঁড়া (Flowers of Sulphur) ক্রয় করিয়া পরিশ্রুত জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার (Distilled water) দ্বারা থুইয়া বাতাসে শুকাইয়া যথা নিয়মে সূগার অব-মিষ্টের সঙ্গে মিশাইয়া ইহাও ৩য় শততমিক ক্রম, পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথানিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথানিয়মে আব-সোলিউট-আলকোহলে (Absolute alcohol) ইহার মূল আরোকও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রস্তুত কৰা আৰোককে টিংচুৰা সাল্‌ফিউরিন্‌ ফৰ্টিসিমা (Tinctura Sulphuris Fortissima) বলা হয়।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক সায়ুনগুলীর (Ganglionic System of nerves) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহাও দ্রুত প্রথমতঃ কৈশিক শিষাগুলি আক্রমণ করিয়া ইহা শরীরের সমুদয় গভীরতম অংশও আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা কি প্রকারে এবং শরীরের কোন অংশ দিয়া কার্য করে, সে সম্বন্ধে আমরা যদিচ নিশ্চিৎরূপে কিছুই জ্ঞাত নহি, তথাপি মনুষ্য দেহে ইহাও আশ্চর্য্য কার্য্য কৰতা সচরাচৰই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শরীরে এক প্রকার বাতুগত পুৰাতন আকারের রোগের আকর উৎপাদন করে, যাহার দ্রুত শরীরের নানা অংশ বা স্বস্ত্রের নানা প্রকারের বিকৃতিবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গায় এক বিশেষ প্রকৃতির চর্ম্ম বোগই উক্ত বিকৃতিবস্তার এক বিশেষ উদাহরণ মধ্যে পরিগণিত। চর্ম্মের উপর ইহার স্থানিক কার্য্যের দ্রুত গায় ত্রণ, পূঁৰ বা জলপূৰ্ণ ত্রণ, ফোঁস্‌কার ত্রায় ফুস্‌কুড়ী, দাঁদের ত্রায় ফুস্‌কুড়ী এবং উদাতে অত্যন্ত চুল্কানি, এবং পূঁৰ পূৰ্ণ পাঁচড়া বা খোস এবং এষ্ট প্রকার অন্যান্য রকমের ফুস্‌কুড়ী ইত্যাদি প্রকাশ পায়। লিম্ফেটিক্‌ গ্রন্থি (Lymphatic glands); লৈঙ্গিক কিল্লী, প্রধানতঃ চক্ষু, বাহুল্লগ, মূত্রনাগী এবং শুষ্কের লৈঙ্গিক কিল্লী, পিত্তনিঃসারক বস্তু, প্রধানতঃ

হিমারয়েডেল্‌ শিরার (Hæmorrhoidal Veins) উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** শুষ্ক বায়ু এবং সর্বদা দুঃখ এবং নিরাশার ভাব ও কান্দার ইচ্ছা (অরাম্‌, ইগ্নেন্স্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, পাল্‌স্‌, প্লাটিনা, রাস্‌টক্স্‌) ; সর্বদা চিড়্‌ চিড়্‌, থিট্‌ থিট্‌ করা এবং বক্‌ বক্‌ করা ; সর্বদা রাগিয়া থাকা এবং ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্‌, নাক্স্‌-বম্‌) ; শরীর এবং মন উভয়ের জড়তা এবং তদ্রূপ কাজ কর্ষ কবা, কথা বলা অথবা আশ্রয় প্রমোদ কিছুতেই মন নিবিষ্ট হয় না (নাক্স্‌-বম্‌, ফস্‌-আস্‌) ; সন্ধ্যার সময় মনের অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ভয় (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, মার্ক্‌, রাস্‌টক্স্‌) ; বর্ষ এবং বিদ্যা বিষয়ে সর্বদা মন নিবিষ্ট করার ভাব (বিরেট্‌-আব্‌) ; মনের অস্থিরতা বা অস্বস্থতা এবং সকল বিষয়েই অনিচ্ছাপূর্বক তাড়াতাড়ি করা (সাল্‌ফ্‌-আস্‌) ; স্মরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আনাকাড্‌, জিন্নাক্‌, ল্যাক্‌, নাক্স্‌-মফ্‌), মনুষ্যের নামই অধিক স্মরণ থাকে না ; অশ্রুমনক ভাব ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বা কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে রাখিতে অশক্তি (ক্যাক্‌-কার্ক্‌, জেল্‌স্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, ফস্‌-আস্‌, সিগিয়া) ; কোন বিষয়ে চিন্তা করাতে অশক্তি (হেলিবোরাস্‌, লরোস্‌, স্পাইজেল্‌) ; কথা বলিবার সময় মনের ভাব প্রকাশ করার অশ্রু উপযুক্ত শব্দ মনে হয় না (গ্রাক্‌) ; অত্যন্ত ভ্রম (ক্রোকাশ্‌, ল্যাক্‌, থুজা) ।

**মস্তক ।** মাথার গোলমেলে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং এক গাছি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেক্লপ হয়, কপালে সেক্লপ কন্‌কনানি (ককিউলাস্‌, জেল্‌স্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, স্পাইজেল্‌) ; মাথা ঘোরা ; বহির্বাহুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা (আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, গ্লোনয়েন্‌, সিগিয়া) ; মাথা হেট্‌ করিয়া উপড় হইলে মাথাঘোরা (একন্‌, বেল্‌, পাল্‌স্‌) ; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই) ; নদী পার হওয়ার সময় মাথা ঘোরা (ফেরাম্‌) ; প্রাতঃকালে নাক দিয়া রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা (বেল্‌, ব্রাই) ; কপালে ভারি, পূর্ণ এবং চাপা-

বোধ ; মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে দন্দপানি, উষ্ণ এবং চাপাবোধ (একন্, ব্রেল্) ; মাথার চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা, কপালের দুই পার্শ্বে এবং প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই যাহা অধিক অম্লভূত হয় ; মাথার হাড় আঘাত লাগিলে যে রূপ হয়, মস্তিষ্কে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা, নিজ্রাবেশ হইয়া ঝিমিলে, অথবা মাথা নাড়িলে যাহা অধিক অম্লভূত হয় (আর্স্, নাক্স-মক্, হায়োস্, স্ক্লোনয়েন্) ; চলিবার সময় প্রত্যেক ধাপে (পা ফেলিতে) মাথায় বেদনা বা যাতনা অম্লভূত হয় ; মাথা এবং চক্ষুর বাহ্যদেশে সূচী বিধানের জ্বার বেদনা বা যাতনা ; মাথায় ডিড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা, ঝাঁক লাগা এবং হাতুড়ী মারার জ্বার বেদনা বা যাতনা ; মাথার সমুখ ভাগে ভারিবোধ এবং চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা, প্রাতঃকালে যাহা অধিক অম্লভূত হয় (নাক্স-বম্) ; মাথা ধরা, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার সমুখে একখানি তক্তা চাপা রহিয়াছে (একন্, বেল্, জেল্, স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্) ; মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জ্বার বেদনা বা যাতনা, নাশার দরুণ মনে হয় যেন মস্তিষ্কের উপর কোন একটা ভারি পদার্থ চাপা রহিয়াছে (আলোজ্) ; বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা ; মাথার উপরিভাগে অনবরত উষ্ণাম্ভব (গ্রাক্, নাক্স-মক্) ; প্রতি লগ্নাহে বা একলগ্নাহ অন্তঃ একলগ্নাহে বমন সম্বলিত শিরঃপীড়া (ফাইটোল্) ; মাথা, বিশেষতঃ মাথার উপরিভাগ, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় (চায়না, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, নেট্রান্-মিউর) ; মাথার অনেক চুল পড়িয়া বাঙরা (গ্রাক্, হিপ্-সালফ্, লাইকোপ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, কন্, সিপিয়া) ; চুলের গোড়া স্পর্শনেও বেদনা বা যাতনা (চায়না, ফেরাম্) ; মাথার অত্যন্ত চুলকানি (কষ্ট্, কার্বোয়লিক্-আস্, গ্রাক্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথা এবং কপালে প্রদাহযুক্ত, বেদনায়ুক্ত এবং চুলকানি বিশিষ্ট ব্রণের জ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী (হিপ্-সালফ্, সিপিয়া, সাইলিসি) ; মাথার অস্থির জোড় অনেক গোণে বদ্ধ হয় ; মাথার কল্কানি বিশিষ্ট, দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ এবং হরিদ্রা বর্ণের চুমটি সম্বলিত ফুসুড়ী যাহা চুলকায় এবং চুলকাইলে যাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং জ্বালা করে (আর্স্, গ্রাক্, হিপ্-সালফ্, মার্ক্, সাইলিসি) ; মাথার শুষ্ক, চুলকানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী ।

**চক্ষু ।** চক্ষু বা চক্ষুর পাতার প্রদাহ, এবং তদ্রূপ চক্ষুর বোজক  
খিল্লী ক্ষীত এবং লালবর্ণ ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি, জালা এবং চিড়িক  
মারা বা কড়্‌ কড়্‌ করা (আন্টি-ফুড্‌, আর্জেন্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌,  
গ্রাফ্‌); ঝরের মধ্যে থাকিলে চক্ষুর শুষ্কতা এবং বহির্বায়ুতে গেলে চক্ষু দিয়া  
জল পড়া (পাল্‌স্‌); চক্ষুর অতিরিক্ত ব্যবহারের দরুন চক্ষুর রেটিনার প্রদাহ  
(Retinitis); অপটিক্‌ ন্যায়ুতে (Optic-nerve) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ;  
বালি, কঁাকর বা কয়লাদির গুঁড়া চক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার দরুন চক্ষের  
প্রবল প্রদাহ এবং তদরূপ উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা (একো-  
নাইট্‌ ব্যবহারের পর); বালির কণা প্রবিষ্ট হইলে বেক্রপ হয়, চক্ষুর পাতার  
নীচে সেক্রপ জালামুতব এবং তদরূপ চক্ষু রগড়ান (আস্‌, কষ্ট্‌, হিপ্‌-  
সাল্‌ফ্‌, থুজা); রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা (ক্যাক্‌-কার্ক্‌,  
লাইকোপ্‌, মার্ক্‌, পাল্‌স্‌, রাস্টন্‌, সাইলিসি); চক্ষে ঘোঁচা বিঁধার  
জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা এবং ছুঁবী দিয়া কাঁটার জ্বাৰ বা স্থতী বিঁধানের জ্বাৰ  
বেদনা বা যাতনা, ডাইন চক্ষেই যাহা অধিক অন্তত হয়; কর্ণিয়া (Cornea)  
এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে ফোষ্কার জ্বাৰ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং ক্ষত (হিপ্‌-  
সাল্‌ফ্‌, নাইট্রিক্‌-আস্‌, সাইলিসি) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ হয়,  
চক্ষে আলোক সহ্য হয় না বা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর পাতার  
ধারে ক্ষত (গ্রাফ্‌); সূর্য্যের আলোকের তেজ চক্ষে সহ্য হয় না বা চক্ষে  
অত্যন্ত লাগে (একন্‌, বেল্‌, গ্রাফ্‌, ইয়েস্‌, মার্ক্‌); চক্ষুর সম্মুখে একখানি  
সরু বা পাতলা কাপড় রাখিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ বাপ্পা দেখা  
(ক্লোকাশ্‌, নেট্রাম্‌-মিউর, পিট্রোল্‌, ফস্‌, সিপিয়া, থুজা); চক্ষুর সম্মুখে  
কাল্‌চে দাগ ভাসে (আগারিকাশ্‌, চেলিডন্‌, ক্যালী-কার্ক্‌, মার্ক্‌, ফস্‌,  
সোরিনাম্‌, সিপিয়া, সাইলিসি); চক্ষু সম্মুখে পাখীর ডানা ঝাড়ার জ্বাৰ  
ধড়্‌ ফড়্‌ করে; কর্ণিয়াতে ক্ষত এবং উহাতে দাগ পড়া (ল্যাক্‌, মার্ক্‌,  
সাইলিসি)।

**কর্ণ ।** গিলিবার সময় কানের মধ্যে বেদনা এবং চাপাবোধ;  
কানের মধ্যে ঘোঁচা বিঁধা বা কসিয়া ধরার জ্বাৰ প্রবল বেদনা, যাহা কখন  
কখন গলার মধ্য এবং মাথা পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; বাম কানের মধ্যে স্থতী

বিধানের জ্ঞান বেদনা বা বাতনা (আস্, ক্যালী-বাই; ক্যালী-কার্ক্, কোনা-  
য়াস্, গ্রাফ্); কানের মধ্যে চুলকানি (ব্যারাইটা-কার্ক্, হিপ্-সাল্-  
মার্ক্-বিন্); কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টনটন শব্দ হয় (চারনা, মার্ক্,  
সাইলিসি); কানে কম শুনা, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কানে কোনও শব্দ  
নহ্ন হয় না; কর্ণপ্রদাহ এবং কান দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূর্ব নির্গমন, বাম কানেই  
যাহা অধিক হয়; প্রতি অষ্টম দিবসে কান দিয়া শ্লেষ্মার জ্ঞান পদার্থ  
নির্গমন; শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের কান লাল হয়; জল  
থাকিলে বেক্রপ হয়, কানের মধ্যে সেক্রপ পোঁটা ছাড়ার জ্ঞান ডুট্‌ভাট্  
শব্দ হয়।

নাসিকা । নাসিকা ক্ষীত, লালবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত (বেল্, ফস্);  
তরল সর্দি এবং তদ্রূপ নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গমন  
এবং বারম্বার হাঁচি (একন্, সিপা, সাক্সুনেরিয়া); বর্হিব্যুত্রে নাক দিয়া  
জ্বালা উৎপাদক তরল শ্লেষ্মা নির্গমন এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া  
শ্লেষ্মা নির্গমন একবারেই বন্ধ হয়; নাক ঝাড়িবার সময় নাক দিয়া রক্ত  
মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের, পূর্ব  
মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন (ক্যাক্-কার্ক্, হাইড্রাইট্, পাল্‌স্); পুরাতন সর্দিতে  
যেক্রপ হয়, নাকে সেক্রপ দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চার (পাল্‌স্); নাকের মধ্য  
ভুক্তবোধ এবং ঘা থাকিলে যেক্রপ হয়, নাকের মধ্যে সেক্রপ চুলকানি  
এবং জ্বালা; নাক দিয়া রক্ত পড়া (বেল্, ফস্); শ্রাণশক্তির হ্রাস বা  
বিনাশ; নাকের মধ্যে শুকনা চুমটি (থোসা) বিশিষ্ট ঘা (সিপিয়া);  
নাকের উপর দিয়া আড়ে ঘোড়ার জিনের আকার বিশিষ্ট দাঁদের জ্ঞান  
ফুঙ্ক্‌ডী ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল কিকা বা শিটা এবং অসহ্য বাতনার চিহ্ন-  
যুক্ত; চক্ষু বসিয়া যায় এবং নীলের বেধার জ্ঞান বেধা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়  
(চারনা, ফস্, ক্যালী-আয়োড্); মুখমণ্ডলে উষ্ণ এবং জ্বালামুতর  
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল কালচে লালবর্ণ, অথবা গালের স্থানে  
স্থানে চক্রাকারের লাল দাগ পড়ে (ব্যাপুই); নাকের বেলায় অস্থিতে (Malar  
bone) চাপিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্ঞান বেদনা বা বাতনা; মুখমণ্ডল,



প্রধানতঃ কপাল, নাক, উপরের ওষ্ঠ এবং টুটিতে কাল দাগের জ্বর ফুসুড়ী বা তিল পড়া; ওষ্ঠ ক্ষীত, প্রধানতঃ উপরের ওষ্ঠ (বেল, ক্যাক্‌কার্ক); ওষ্ঠ শুষ্ক; টুটির চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনাযুক্ত বা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফুসুড়ী; ওষ্ঠের কোণে দাঁদের জ্বর ফুসুড়ী (আন্টি-ক্রুড্, আস্); নিম্ন মাড়ির নিকটবর্তী গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে কসিয়া ধরা বা হঠাৎ ধাক্কা লাগার জ্বর বেদনা ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । দাঁতের গোড়ায় কসিয়া ধরা, বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বর, অথবা দপ্পপিয়া বেদনা; বহির্বিয়ূতে বা সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (চারনা); ঠাণ্ডা জল লাগিলেই দাঁতের গোড়ায় বেদনা (আন্টি-ক্রুড্, ক্যাক্‌কার্ক, কোকাস্, টাকিস্); সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে দাঁতের গোড়ায় বেদনা; দাঁতের গোড়া ক্ষীত এবং উহাতে দপ্পপিয়া বেদনা; মুখে তিক্ত স্বাদ (ব্রাই, চারনা, কলোস্, নীক্স-বম্, পাল্‌স্); মুখে কহিরের জ্বর স্বাদ; মুখে হর্গন্ধ এবং মিষ্ট স্বাদ (আস্, ব্রাই, মার্ক্, প্লাসাম্); মুখে ধাতুর স্বাদ (ইক্সুলাস্, ককিউলাস্, মার্ক্, নেজা); প্রাতঃকালে মুখে বিষাদ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত এবং উহার পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লালবর্ণ (যেমন অনেকা-নেক তরুণ প্রবল রোগে হইয়া থাকে); মুখগহ্বর এবং জিহ্বায় কোকা পড়া (বোরাক্স্, নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-বম্); মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং তালুকা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহা ব সঙ্কে সঙ্কে অত্যন্ত প্রবল পিপাসা (আস্); প্রাতঃ-কালে মুখ শুষ্ক, স্বাদশূন্য এবং চট্‌চটিয়া; মুখে টকস্বাদ বা হর্গন্ধ, প্রাতঃকালে এবং আহাবের পরই যাহা অধিক অনুভূত হয়; মুখে প্রচুর লালের সঞ্চার (মার্ক্); মুখে রক্ত মিশ্রিত লালের সঞ্চার (নাইট্রিক্-আস্); মুখে লোন্তা লালের সঞ্চার (আন্টি-ক্রুড্, মার্ক্-কব, ফস্) । গলার মধ্যে খণ্ডখণ্ড এবং শুষ্কানুভব এবং ছাল উঠিয়া গেলে যেরূপ হয়, সেরূপ অনুভূত হয়, চাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেরূপ অস্বস্তি বোধ; বারবার থেকুর দিয়া গলার মধ্য পরিষ্কার করার ইচ্ছা (আমন্-কার্ক্, কার্কো-বেজ্, ফস্); গলার মধ্যে ক্ষত এবং তদ্রূপ উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্ক-অনুভব; যন্ত্রণাদি ডাইন পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়; গিলিবীর

সময় গলার মধ্যে সূচী বিধানের জ্বার বেদনা (আলাম্, আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্); একটা গোলার জ্বার পদার্থ নিম্নদিক হইতে গলার মধ্যে উঠিয়া গলনাগীর উপরিভাগ যেন রুদ্ধ করে, যাহার দরুণ নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় (আসাকিটিডা, লাইকোপ); গিলিবাব সময় গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক সঙ্কোচন (বেল্, প্লাস্লাম); কর্ণ মূল এবং নিম্ন মাড়ির নিম্ন ভাগস্থিত গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে সূচী বিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা; ডেলার জ্বার কোন একটা পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেকুণ চাপা বোধ (গ্রাক্, হিপ্-সাল্‌ক্, ইগ্নেস্, ল্যাক্, নাক্স্-বম্); গলার মধ্যে যেন এক গাছি চুল লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ভুট্‌ক্ষুধা, যাহার দরুণ রোগী বার-বার খাইতে বাধ্য হয়, অথবা আহারে ইচ্ছা একবারেই থাকে না (আলাম্, আর্স্, চায়না, প্লাস্লাম); অনবরত পিপাসা; রোগীর পেটে দুধ সহ্য হয় না এবং দুধ খাইলেই পেটে অস্থখ বা বাতনার উদ্ভেদ হয় (কার্বো-বেজ্), দুধ দিয়া জল উঠা (নেট্রাম্-কার্ব্); প্রাতঃকালে এবং আহারের পর মুখদিয়া জল উঠা (আর্স্, নাক্স্-বম্); টক বা কাঠ উদগার উঠা, বাহা প্রাতঃকালে এবং আহারের পরই অধিক হয় (আম্বা, ব্রাই, কার্বো-বেজ্, নাক্স্-বম্, ফস্); পাকস্থলীতে জ্বালানুভব (আর্স্, ক্যাস্, আইরিস্, লোবিলিয়া, মেজিরিয়াম্); প্রাতঃকালে বমনোদগ, পেট গুলিয়া উঠা (ক্যাক্-কার্ব্, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্); আহারের পূর্বে এবং মলত্যাগের সময় বমনোদগ এবং পেট মোচড়াইয়া বা গুলিয়া উঠা; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময় এবং আহারের পর উদরস্থ আহার দ্রব্য বা টক পদার্থ বমন; সামান্য পরিমাণে আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই পাকস্থলীতে পূর্ব বোধ হয় (চায়না, লেডাম্, লাইকোপ); পাকস্থলীতে একবারে খালি এবং অসাড় বোধ (সিমিসিফ্, হাইড্রাষ্ট্, ইগ্নেস্, পিটোল্, পাল্‌স্, সিমিয়া); পূর্কাক ১১ টার সময় পাকস্থলীতে উক্ত প্রকার অনুভূত হওয়া; পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে ভারি এবং চাপাবোধ (আর্স্, ব্রাই, নাক্স্-বম্, পাল্‌স্); পাকস্থলীর উপর এবং মধ্যদেশে সূচী বিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা; বন্ধুত প্রদেশে সূচী বিধা-

নের জ্বাশ বা খুশ্‌খুশে বেদনা বা যাতনা (একন্, আস্, ব্রাই, ক্যাক্স-কার্ক, চেলিডন্, চারনা, ক্যালী-কার্ক, মার্ক, নাক্স-বম্, সিপিয়া); যক্‌তের ক্ষীতি এবং কঠিনতা (চারনা, ফস্); প্রাতঃকালে হই পাৰ্শ্বেই টাটানি বাহ্য স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; প্লাহা প্রদেশে স্থী বিধানের জ্বাশ বেদনা বা যাতনা (নেট্রাম্-কার্ক, নেট্রাম্-মিউর); দীর্ঘ নিশ্বাস প্রাশ্বে উদরের বাম দিকে বেদনা; নাভিপ্রদেশে কানড়ানীর জ্বাশ বেদনা বা যাতনা, গুহ দ্বার দিবা দূষিত বায়ুনিঃসরণে যাহার উপশম হয় (কার্কো-বেজ্, চারনা, গ্রাক্); উদরের মধ্যে গড়্-গড়্, কল কল শব্দ হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, লাইকোপ্, জিঙ্ক্); অস্ত্রে দূষিত বায়ু রুদ্ধ হইয়া থাকিলে বেক্রপ হয়, উদরে সেক্রপ পূর্ণ এবং কসিয়া ধরার জ্বাশ অমুভূত হয় (কার্কো-বেজ্, চারনা, লাইকোপ্, ক্যালীকার্ক, ফস্); গুহ দ্বার দিবা প্রচুর পরিমাণে পচা ডিমের জ্বাশ গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ (অর্বিকা); পেটকামড়ানী, ইট্টু গুটাইয়া জড় সড় হইলে যাহার উপশম হয় (আলোজ্, কলোস্, আইরিস্, নাক্স-বম্, ফস্); উদরে গুহ দ্বারের দিকে ঠেলিয়া নামার জ্বাশ চাপাবোধ; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় (একন্, বেল্, কুথ্রাম্, মার্ক); জীবিত কোল প্রাণী বা পদার্থ নড়িতেছে, উদরের মধ্যে একরূপ অমুভূত হয় (কোকাশ্, সাবাইনা, থুজা)।

মল এবং মলদ্বার । মলত্যাগের সময় গুহে জ্বালা এবং চাপাবোধ; মলত্যাগের পর গুহদ্বারে জ্বালাহুভব (নেট্রাম্-আস্); গুহের মধ্যে স্থী বিধান বা হড়্-হড়্ করার জ্বাশ যাতনা, এই যাতনা সক্ষার সময়ই অধিক অমুভূত হয়; গুহ এবং গুহ দ্বারে ভয়ানক চুল্কানি (কষ্ট, নাক্স-বম্, সাইলিসি); বারবার বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (আশ্চা, কোনাগাম্, নেট্রাম্-কার্ক, নাক্স-বম্, সাইলিসি); শ্লেষ্মিক; অন্ধ এবং রক্তশ্রাবক অর্শোগ (Mucous, Blind and Bleeding Piles); রাজি দুইপ্রহরের কএক ঘণ্টা পর উদরাময়, অথবা প্রাতঃকালে বাহ্যের এত বেগ হয় যে উহার দরুণ রোগী বিছানা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি পার-খানায় বাইতে বাধ্য হয় (আগারিকাশ্, আলোজ্, ডুসিয়া, নেট্রাম্, আস্, কমেস্, পডোফ্); আমাশয়ের মলের জ্বাশ মল ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পেটকাঃমড়ানী বা শূল বেদনা; বারম্বার কষ্টদায়ক কৌথপাড়া (মার্ক্, নাক্স-সম্, রাত্রিতে বাহ্য অধিক হয়; মল জলবৎ তরল, ফেণাযুক্ত, সবুজ অথবা রক্ত মিশ্রিত স্লেমা; মল ঘোলাটিয়া, সবুজের আভাযুক্ত, হরিদ্রাবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত; মল চট্টিয়া আঠা এবং ক্ষতকারক (আস্, মার্ক্); অসাড়ে ভেদ (আস্); কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল অত্যন্ত কঠিন (ব্রাই), পরিমাণে অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়; মল কঠিন গুটলে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না (আলাম, গ্রাক্, আরোড্, সিপিফা); মল জলবৎ তরল, সবুজবর্ণের স্লেমা, উদরস্থ অজীর্ণ আগর জ্বার কণা বিশিষ্ট এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল—অর্থাৎ একবার যে প্রকার দাস্ত হয়, অপসরণে সেক্ষণ হয় না; দাস্তের পূর্বে উদবে কষ্টনবৎ বেদনা বা বাতনা; দাস্তের পর্ব অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌথপাড়া বা শুলানি; মলের সঙ্গে লম্বা গোল কুনি এবং সূত্রবৎ ক্ষুদ্র কুনি পড়ে (সিনা, ইগ্নেসস্, মার্ক্, স্পাইজেল্); মলত্যাগের সময় গুহ বাহির হইয়া পড়ে।

মূত্রে যন্ত্র । মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্); বারম্বার এবং ইষ্ঠাৎ মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, প্রধানতঃ রাত্রিতে, এবং প্রচুর পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; রাত্রিতে যন্ত্রে মূত্র ত্যাগ (আর্গিকা, কষ্ট্, কুপ্রাম্, গ্রাক্, পাল্‌স্); মূত্রনালীতে জ্বালা; মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে জ্বালা (আস্, ক্যাস্, ক্যানাবিস্-স্যাট্, কোনায়াম্); মূত্র নালীতে সূঁচী বা খেঁচা বিধানেনে ব্যায় বেদনা বা বাতনা; মূত্র নালীতে চুলকানি; মূত্র থামিয়া থামিয়া নির্গত হয় (Intermittent), অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা সৰুধারে মূত্র নির্গমন; মূত্র ঘোলাটিয়া (আন্টি-টাট্, বেল্); মূত্র লালচে, দুর্গন্ধযুক্ত (ক্যাক্স-কার্ক্, ক্রিমাজ্) এবং ক্ষত কারক (মার্ক্); মূত্র কখন পবিষ্কার, কখন বা গাঢ় তলানি বিশিষ্ট।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক শাভু নিঃসরণ (চারনা, ফস্-আস্); পুরুষাঙ্গ ঠাণ্ডা; স্ত্রীসংবাসের শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা হ্রাসলতা (আগ্নাস্, বাবে'রিন্, ক্যাপ্প্); স্ত্রীসংবাসের ইচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি (ফস্); পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চর্ম্ম (Prepuce) প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ, লালবর্ণ এবং জ্বালাযুক্ত ও উজা খোলা যায় না (Phimosis) এবং গভীর ক্ষতযুক্ত; পুরুষাঙ্গে সূঁচী বিধানের ব্যায় বাতনা অগ্রভূত হয়; পুরুষাঙ্গের মাথার চুলকানি 'মেজিরিয়াম্'; অণ্ডকোষ শিথিল হয় (ক্যাম্ফার) এবং

কুলিয়া পড়ে (ক্রিমিটিস); জননেত্রিয়ে হৃগ্নকৃষ্ণ বর্ণ; অণ্ডকোষাধারে ক্ষত এবং উহা কল্‌জানি দ্বারা সর্বদা ভিজা থাকে (পিটোন্); স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী, রক্তঃস্রাব; নিয়মিত সময়ের অনেক পর রক্তঃস্রাব; বজ্রঃবোধ (সিমিসিক্, পাল্‌স); গাঢ়, কাল্‌চে এবং ক্ষতকারক রক্তঃস্রাব (আমন-কার্ক); রক্তঃস্রাবের সময় মাথা ধরা এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই, হানামেলিস); পাকস্থলীর মধ্যে চাপাচ্যুদ; রক্তঃস্রাবের পূর্বে মাথা ধরা; নিয়মিত সময়ের অনেক পর অত্যন্ত কষ্টকর রক্তঃস্রাব ও বাবকের বেদনা (Painful Menstruation) (পাল্‌স); প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাব আভাবুক্ত, ক্ষতকারক খেত প্রদর নিঃসরণ (আস্, সিগিরা); বোনি দ্রাবে জালাহুভব, বাহার দরুণ রোগী কোন মতেই জ্বরিত থাকিতে পাবে না; জননেত্রিয়ে কষ্টদায়ক চুলকানি এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বা কুঙ্কড়ী (মার্ক); স্তনের বিসপের জ্বা (Brytielatus) প্রদাহ (বাস্টক্স); শুন লালবর্ণ, উষ্ণ, কঠিন এবং উহার বোটা হইতে গোড়া পর্যন্ত লাল রেখা পড়ে ও উহাতে স্থতী বিধানের জ্বা বেদনা বা যাতনা বর্জনান থাকে ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং স্বর কর্কশ, প্রধানতঃ প্রাতঃকালে; স্বর-শূন্যতা (কার্কো-বেজ্, কষ্ট, ফস্); গলার মধ্যে থন্ থন্ এবং চাঁচিয়া ফেলার জ্বা অল্পভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে শ্লেষ্মার সঞ্চার, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় (ক্যাম্, নাক্স-বম্); কথা বলিলে (ড্রিসিরা) অথবা চলিয়া বেড়াইলে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; শ্বাসকষ্ট; অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা যাতনা (একন্, আস্, পাল্‌স); বারম্বার শ্বাসরোধ হইবা ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া, যাহা রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে অধিক হয়; রোগী ঘরের দরজা, জানলা খুলিয়া রাখিতে চাহে (আস্, কার্কো-বেজ্, ব্যাপ্ট); সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলে বা রাত্রিতে শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বরভঙ্গ, গলার মধ্যে শুকাহুভব এবং নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মা নির্গমন; ক্ষণস্থায়ী, প্রবল শুক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষস্থিতে বেদনা বা বৃকে স্থতী বিধানের জ্বা বেদনা বা যাতনা; কঠিনাণীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বা অল্পভূত হওয়ার দরুণ

কাশি (ফস্, কয়েক্স্) ; বৃকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; কণা বলিয়ার সময় বৃকে অত্যন্ত দুর্বলবোধ (কার্কো-বেজ্, ষ্ট্রানাম্) ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া থাকিলে বৃকে দুর্বলবোধ ; মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে বা থেঁতলিয়া গেলে বেক্রপ হয়, বৃকে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা ; বৃকে আঁটাবোধ ; বৃকে ষাটিয়া বা কসিয়া ধরার জ্বায় যাতনা ; বৃকে স্ফুটী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা, যাহা পৃষ্ঠদেশ এবং বাম দক্ষাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ক্যালো-কার্ক, মার্ক্), শ্বাস প্রশ্বাস এবং নড়া চড়াতে (ব্রাই), অথবা চীতু হইয়া শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় ; বৃকে জালাহুভব বাহা মুগ্ধগুণ পর্য্যন্তও অনুভূত হয় ; ফুফুস প্রদাহের পর ফুফুসে দূষিত পদার্থের সঞ্চাব ; কাশি এবং গলা দিয়া সবুজের আভাবুক্ত পুঁথ মিশ্রিত, মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন (ষ্ট্রানাম্) ; ফুফুসেব মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়্‌ঘড়ী ; প্রাতঃকালে কাশির বৃদ্ধি (আণ্টি-টাট্) ও বৃকে ভারিবোধ (ক্রিয়াজ্, ল্যাক্, লাইকোপ্, নাস্ক-যকু) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন এবং উহঁর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা ; (একন্, আস্, স্পাইজেন্, বিয়েট্-আব্) ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে এবং কোন উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় হৃৎস্পন্দন ; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুতগামী (একন্, বেল্) ; হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ দেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠ দেশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ; মেরুদণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ অংশের গাড়ে কেড়্ কেড়্ শব্দ হয়, পশ্চাৎ দিকে হাড় বাঁকা করিলেই যাহা অধিক শ্রুতিতে পাওয়া যায় ; ঘাড়ে কসিয়া ধরা বা স্ফুটী বিধানের জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; নড়া চড়া বা শয়ন করিয়া থাকা কালীন দুই স্বক্কেব মধ্যবর্তী স্থানে ষাটিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচ্‌ড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা (পাল্‌স্, রাস্টেক্স্) ; কোমরের পশ্চাৎভাগে মোচ্‌ড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ায় জ্বায় প্রবল বেদনা বা যাতনা (কুপ্‌রাম্) ; শুষ্কহারের উপরিভাগে উক্ত প্রকারেব বেদনা বা যাতনা, মাথা ঠেট করিয়া উপুড় হইলে বা বসি অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে যাহার উদ্রেক হয় (রাস্টেক্স্) ; দক্ষাস্থি,

পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে স্ফীতি বিধানের দ্বারা বেদনা বা বাতনা; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal-curvature) এবং উহার কোমলতা (সাইলিসি); একখানি হাড়ের উপর অন্য একখানি হাড় গড়াইয়া গেলে যে রূপ হয়, মেরুদণ্ডে সে রূপ অনুল্লভ হয়।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, প্রধানতঃ হাত পায়ের পাতার, দুর্বলতা এবং কাঁপনি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কিঁ কিঁ ধরা (সিপিয়া, সাইলিসি), শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহা অধিক হয়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থেঁতলিয়া যাওয়া, মোচড়াইয়া পড়া, কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার দ্বারা বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, কলোস্, লেডান্, লাইকোপ্, মার্ক্)। বায় স্বক, বাহু এবং হাতের আঙ্গুলে বাত রোগের কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার দ্বারা বেদনা বা বাতনা; বাহুর উপরি ভাগে দুর্বল এবং ক্রান্তিবোধ; বোঁগলে অত্যন্ত দুৰ্গন্ধ বিশিষ্ট বমনোৎপাদক ঘন্থ; হাতের পাতার তালুতে অত্যন্ত জ্বালাবৃত্ত (ল্যাক্); হাতেব চর্ম কঠিন, শুষ্ক এবং কাটাশুক (নেট্রিম্-মিউর); হাতের নখ সম্মুখ পানে বাঁকিয়া পড়ে (নেট্রিম্-মিউর, থুজা); আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার দ্বারা ঘা এবং লালবর্ণ হয়; আঙ্গুলে অবশবোধ। চলিয়া বেড়ানোর সময় নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা এবং উহাতে অবশবোধ; কঁচকির সন্ধিতে বোঁচা বিবাব দ্বারা প্রবল বেদনা বা বাতনা, নড়া চড়া বা স্পর্শনে বাহাব বৃদ্ধি হয় এবং যাহার দক্ষণ বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি থাকে না; উক্ত দেশেব পেশীতে খিল ধরা বা কসিয়া ধরার দ্বারা বেদনা বা বাতনা; হাঁটু এবং পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; সঙ্কুচিত হইলে যে রূপ হয়, পা বাড়াইবার সময় হাঁটুর, পশ্চাৎভাগের গর্ভের দ্বারা অংশে অংশে সে রূপ কসিয়া ধরার দ্বারা অনুল্লভ হয়; হাঁটু, পায়ের ডিম এবং পায়ের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থিতে ঘাটিয়া ধরা; পায়ের ডিম এবং পাতার নীচে খিল ধরা (কার্কো-বেজ্), রাত্রিতেই যাহা অধিক অনুল্লভ হয় (ক্যাক্-কার্ক, ক্যাম্কার, ক্যাম্, ফেরাম্, নাক্স-বম্, নাইট্রিক্-অ্যাম্, সাইলিসি); পায়ের পাতার তলায় জ্বালা (ক্যাক্-কার্ক, সাইলিসি, ল্যাক্), যাহার দক্ষণ পায় কাপড় রাখিতে অত্যন্ত কষ্ট হয় (ক্যাম্); পায়ের আঙ্গুলে কড়া (Corn)

এবং উহাতে কল্কানি ও বাটিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা; পায়ের পাতা, প্রধানতঃ উহার তলা, ঠাণ্ডা ।

**চর্ম্ম ।** শরীরের নানা স্থানে অত্যন্ত স্ফুটন্তী এবং তদ্রূপ ব্যঞ্চার সহিত চুলকানি এবং চুলকাইলে উহাতে অত্যন্ত জ্বালা এবং টাটানির উদ্বেক হওয়া (কার্বোলিক্-আস্); ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বায় জলপূর্ণ ফোঁকা এবং দাঁদেব জ্বায় ফুস্ফুসী ও উহাতে অত্যন্ত চুলকানি এবং জ্বালা (ক্রোইট্, মার্ক্, বাস্টার্স্); পায় চুলকানী, বিছানার উষ্ণাভে বাহ্যাব উপশম হয় (আলাম্, মার্ক্, মেজিবিসাম্, পাল্‌স্); চর্ম্ম শুষ্ক, খশ্ খশ্ এবং মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট; নামাজ কাটিলে বা ঘা হইলেই আক্রান্ত স্থানে পুঁথ হা (বোরাক্, ক্যাম্, ক্যাক্-ফার্স্, হিপ্-সালক্, গ্রাফ্, সাইলিসি); চর্ম্মের ভাজে ভাজে হাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বায় হইয়া ক্ষত হয় (গ্রাফ্, হাইড্রাঠি, ইগ্‌নেস্, লাইকোপ্, মার্ক্); উঁচু এবং ক্ষীত ধাব বিশিষ্ট ক্ষত এবং উহা হইতে সহজেই রক্ত পড়ে, (খাসফিটিজ, মার্ক্, মেজেরিয়াম্) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের জ্বায় কুস্কুড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত, বাহ্য হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁথ পড়ে; পুরাতন ঘা এবং উহাতে বাস রুদ্ধ হয় (গ্রাফ্, সাঙ্কুনেরিয়া, সাইলিসি) ।

**নিদ্ৰা ।** দিনের বেলা ঘুমালিবার অনিবার্য ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, এপিস্, নাক্স-মর্ক্) এবং প্রায় সমুদয় রাতিতে জাগিয়া থাকা (লাইকোপ্, মার্ক্); অস্থির নিদ্ৰা এবং বারম্বার জাগিয়া উঠা; ঘুম হওয়া হওয়া সময়ে চমকিয়া উঠা (আস্, বেল্, হাবোস্); ঘুমেরদ্বারা ভয় এবং চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা (আর্গিকা, অরান্, পাল্‌স্); ঘুমেরদ্বারা অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা (বেল্, নেট্রাম্ নিউট, সিপিবা); ঘুমের ঘোরে শরীরের নানা স্থানের কাকনি এবং স্পন্দন ।

**জ্বর ।** সন্ধ্যার সময় শরীরে করিয়া থাকিলে শীত বোধ, তৎপর শরীর উষ্ণ হইয়া তৎপর স্বপ্ন হওয়া; বারম্বার আভ্যন্তরিক শীতবোধ, কিন্তু পিপাসা থাকে না (পাল্‌স্); শীত যেন হামাদিয়া বা স্ফুটন্তী করিয়া পৃষ্ঠ দেশের নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে উঠে; শীত এবং জ্বর; প্রতিক্রিয়া না হইয়া রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় শরীর উষ্ণ



এবং শুষ্ক এবং উষ্ণর সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত পিপাসা ; বারবার দম্‌কা উচ্ছাস্তব, কখন কখন শরীরে সামান্য ঘর্ষ বা মুচ্চার ভাব হইয়া বাহার শেষ হয় ; প্রাতঃকালে ঘর্ষ, ঘুম ভাঙ্গিলেই যাহাব আরম্ভ হয় (সিপিয়া) ; রাত্রিতে প্রচুর ঘর্ষ (চোরনা, কস্‌, সাইলিসি, কস্‌-আস্‌) ; সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ষ হয় (আস্‌ত্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, হিপ্‌-সাল্‌ক্‌, কস্‌, সাইলিসি) ; শীতলাবস্থার পূর্বেও পিপাসা (সাইমেক্‌, ইউপোট্‌-পাক্‌) ; সন্ধ্যার সময় শীত, তৎপন্ন শরীর উষ্ণ এবং অবশেষে প্রচুর ঘর্ষ (আস্‌, নেল্‌, রাস্‌টক্‌) ; পূর্বাহ্ন ১০ টার সময় শীত আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ন ৩টা পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ।

ব্যবহার । গণ্ডমালা (Scrofula) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অস্থখ (Rachitis) ; কোঁইনাইন বা পারার অপব্যবহার জনিত রোগ ; খোস পাঁচড়া ; চর্ম্মে ফোকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ এবং দাঁদের ছায় ফুস্‌ড়ী ; ক্ষত ; ফোড়া ; বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌ (Erysipelas) ; গ্রন্থির প্রদাহ, শ্লেতি এবং উহাতে পূর্ব হওয়া ; শোথ ; পেশী এবং বৃহৎ সন্ধি বাত ; ক্ষুদ্র সন্ধিবাত বা গাউট্‌ (Gout) ; মৃগীবোগ ; চক্ষুপ্রদাহ ; শ্লেয়া জনিত রোগ ; পাকস্থলী এবং বকৃতের অস্থখ ; উদরানয় ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শ ; হাঁপানি কাশি ; ছপিং কফ বা কাশি (Hooping Cough) ; ফুফুস প্রদাহ ; ফক্ষাশ ; রজঃরোধ ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation) ; শ্বেত প্রদব ; মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) ; পুরুষা-শ্লেব মাথা প্রবাহিত হইয়া উষ্ণর আবরক চর্ম্ম (Prepuce) খোলা যায় না (Phimosis) ; প্রমেহ বোগ ; অর-বিকার এবং পূর্বাদি রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্‌ ফিবার (Hectic-fever) ; পুরাতন আকারের স্থানিক প্রদাহ ; হস্তনৈখন বা অতিরিক্ত স্ৰোমোস জনিত চর্ম্মগতা হেতু অস্থখ ; গাণ পুরাতন আকারের ফুস্‌ড়ী ; নালী ঘা ; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া থাকার ছায় আপন কাজ কর্ম্ম করা বা চলিয়া বেড়ান (Somnambulism) ; শিরঃশীড়া ; তরল, শুষ্ক তরুণ এবং পুাতন সন্ধি ; মুখের মধ্যে ঘা ; আহারে অনিবার্য্য অকচি ; পাকস্থলীতে বেদনা ; সর্ব্বদা মদ্যপানের ইচ্ছা ; বকৃতের পুরাতন আকারের অস্থখ ; দূষিত বায়ুজনিত আক্ষেপিক শূল বেদনা ; উদরী (Ascites) ; গণ্ডমালা বা পারার অপব্যবহার

জনিত বাগী (Buboes); বহুমূত্র; রক্ত মূত্র ভাগ; হাতের কাঁপনি; কল্মশ বিশিষ্ট পক্ষাঘাত (Paralysis Agitans) ইত্যাদি অসুখে সাল্ফার ব্যবহার্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** শরীর শীর্ণ এবং লম্বা এক মাথা হেঁট করিয়া উপুড় হইয়া চলা; অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হওয়া; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং শরীরের কাঁপনি (আলাম, চায়না), ক্লান্তি বোধ এবং বলহীন; ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না এবং সামান্য কারণেই সর্দি লাগে; হাত কাঁপে; মাথার ঠিক উপরিভাগে সর্বদা উষ্ণভাব; শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থির ক্ষতি এক কঠিনতা এবং উহাতে পুঁথ হওয়া; প্রত্যহ শরীর মর্দন করিয়া স্নান করিলেও গায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; কথা বলিলেই বেদনা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি; সমুদয় শরীরের বারম্বার আক্ষেপিক স্পন্দন বা কাঁকনি; আক্ষেপের পর, রোগী আপনাকে আপনি অত্যন্ত স্নেহ মনে করে; পূর্বাঙ্ক ১১টার সময় অত্যন্ত দুর্বলতা বা অবসন্নতা, যাহার দরুণ রোগী কিছু না খাইয়া থাকিতে পারে না; সন্ধ্যার সময়, রাত্রি হই প্রহরের পর, বিশ্রাম কালীন, দাঁড়াইলে, স্পর্শনে, গা মুছাইলে বা স্নান করিলে এবং বহির্বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি; নড়া চড়া বা বেড়াইলে অসুখের উপশম ইত্যাদি সাল্ফারের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** সাল্ফারের কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক এবং সিপিয়ার কার্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলেডোনা, কল্‌চিকাম, চায়না, আরোডিন, লাইকোপডিয়াস, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক্‌ আসিড, নাক্স বমিকা, সোরিনাম, পালসেটিল, রাস্টল, সাইলিসিয়াব কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** একোনাইট্, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা, চায়না, মার্কিউরিয়াস, পালসেটিল, রাস্টল, সিপিয়ার ইত্যাদি সাল্ফারের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন । ডাক্তার হিউজেস (Dr. Hughes) মতে বাত রোগ

এবং ইঁপানি কাশিতে নিম্ন ক্রমের গুঁড়া ( ১ম, ২য় বা ৩য় ) ব্যবহার্য্য ।  
লেখক স্বয়ং ৩০ ক্রমই সচরাচর, অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।  
পারার অপব্যবহার জনিত চর্ম্মরোগে ১ম, ২য়, ৩য় ক্রমের গুঁড়া, ১  
গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহারে অনেক সময় বিশেষ ফল পাওয়া যায় । অনেক  
কালের পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ, খেঁত প্রদর, পারার অপব্যবহার  
জনিত চর্ম্ম রোগ, চক্ষু শুদাহ, পুরাতন আকারের মস্তিস্করোগে ২০০  
ডাইলুশন দ্বারা অনেক সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায় ।

## বিরেট্রাম্-আল্‌বাম্,-বিরেট্-আল্‌ব্ ।

(VERATRUM ALBUM,—VERAT. ALB.)

ইউরোপের আল্প্‌স্ ইত্যাদি পর্ব্বতে এই গাছ জন্মে । ফুল ফুটিবার  
পূর্বে এই গাছের মূল লইয়া যথা নিয়মে উহা প্রক্‌স্পিরিটে (Proof spirit)  
মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত করিতে হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিস্ক এবং কসেরিকা মৰ্জ্জা সম্বন্ধীয় স্নায়ুসমুহের  
মধ্য দিয়া ইহা শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর কার্য্য করিয়া থাকে,  
বাহার দরুণ রক্ত দূষিত হইয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং  
তদ্বর্ণন সমুদয় যন্ত্রের জড়তা উৎপন্ন হইয়া ওলাউঠাতে যেক্রপ অবস্থা  
ঘটিয়া থাকে, শরীরের সেরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় । অতএব সমুদয় শরীর  
শীতল, বলক্ষয়, পতনাবস্থা (Collapse) এবং প্রচুর পরিমাণে চাউল  
ধোয়া জলের স্থায় ভেদ ও বমন, হাত পায়ে থিলধরা, পেটে আক্কেপিক  
শূল বেদনা এবং শীতল চট্‌চটিয়া ঘর্ম্ম হইয়া থাকে । জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু  
মণ্ডলের (Sensory Nerves) উপরও ইহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়,  
বাহার দরুণ মস্তিস্ক সম্বন্ধীয় স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ এবং উদ্ভ্রান্ততা  
উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্নায়ুর শক্তির হ্রাস বা বিনাশও হইয়া থাকে ।  
ওলাউঠার উক্ত লক্ষণাদি উৎপাদন করা বিরেট্রামের এক বিশেষ প্রকৃতি  
বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । উন্নততা ; ক্রমাগত রাগ প্রকাশ করা এবং কাপড়াদি কাটিবার বা ছিড়িবার ইচ্ছা (বেল্, ট্রান্ন) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অনি-  
বার্থা ক্রন্দন এবং চীংকার করা (সিকুটা) এবং কোন প্রকারের কাল্পনিক  
দৃবদৃষ্ট বিষয়ে সর্বদা চীংকাব করিয়া ক্রন্দন ; ক্রমাগত কথা বলিবার  
অনিচ্ছা (বেল্, ইগ্নেন্স, নাইটিক্-অন্, বস্-অন্) ; প্রলাপ এবং প্রলাপে  
ধ্বংসধ্বক্ষীয় কথা বলা (আস্, অবান্) ; উপাননা করা, অভিদ্রাব দেওয়া  
এবং সমুদয় রাত্রি অনবরত চীংকার করা ; নানা বিষয়ে প্রলাপ বলা ;  
সর্বদাই অস্ত্রের দোন্ বলা অথবা একবারে চুপ করিয়া থাকা, কিন্তু এক  
বার কোন কারণে উত্তেজিত হইলে নান ধারিয়া লোককে অনবরত ভং-  
লনা করা বা গালি দেওয়া ; সমাজের মধ্যে আপনাকে আপনি হেয়জ্ঞান করা  
এবং আপনাকে আপনি হতভাগ্য মনে করিয়া মানসিক অবসন্নতা, ত্যাগ  
এবং নিরাশার ভাব ; কোন ছন্দ করিলে বেক্রপ হব, সর্বদা সেকপ  
চিন্তা এবং ভয় (কবিউলাস্, ইগ্নেন্স) ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল ঘর্ষ  
(ওপিগাম্, টেবেকাম) ; মাথা হেটকবিয়া উপড় হইলে মাথার রক্তাধিক্য বা  
রক্তাবরোধ ; থাকিয়া থাকিয়া মাথা ধরা এবং নোচেড়াইয়া পড়িলে বা  
ছিঁড়িয়া গেলে বেক্রপ হব, মস্তিস্ক সেক্রপ বাতনা, এবং চাপা বোধ (কফিয়া,  
মিউর-অন্) ; মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ ; শিরপৌড়া এবং উহার  
সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং বমনোদ্বেগ (অস্, ইপিফাক্, ক্যালো বাই, নাক্স-বম্) ;  
মস্তিস্কে জ্বালাভাব (ক্যাঙ্ক, হেলিপোবাস্) ; বক লাগাইয়া রাখিলে সেক্রপ  
হব, মাথার ঠিক উপরিভাগে সেক্রপ ঠাণ্ডা বোধ (আগাবিকাশ, ক্যাল্-  
কার্ক, লরোস্, সিপিয়া) ; মাথায় ভারি বোধ ।

চক্ষু । চক্ষু বিকৃত এবং যেন বহির্দিকে চেলিয়া বাহির হওয়ার ভায়  
অনুভূত হয় (বেল্, ট্রান্ন), স্থিরতাব বিশিষ্ট, জলপূর্ণ এবং বদিয়া বায় (আস্),  
জ্যোতি ভীন এবং যেন কাল বা নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (চামনা, ক্যালী-  
আরোড্, ফস্, সিকেল্, সাল্ফ্) ; চক্ষু পাতা অত্যন্ত শুষ্ক ; চক্ষুর তারি  
সঙ্কচিত (মার্ক্-কর, ওপিগাম্, কন্, কাইটোল্, কাইসট্) ; চক্ষুর পাতার

পক্ষাঘাত; এক বস্তু দ্বিগুণ বা ডবল দেখায়; স্নায়ুতে চক্কে না দেখা (বেল্) ।

নাসিকা । নাসিকা বেন স্বাভাবিক অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং লম্বা; মুখ মণ্ডল ঠাণ্ডা এবং বসিয়া যায়; নাক ঠাণ্ডা (আস্, ক্যান্কার); নাক দিয়া রক্ত পড়া (একন্, বেল্, ব্রাই, হামামেলিস্, ইপিকাক্) ।

মুখ মণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা এবং শীর্ণ, শীতল, বসিয়া যায় এবং মৃত দেহের জায় ৯ নাসিকা তীক্ষ্ণ (আস্, ক্যান্কার); মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত; বিছানার শয়ন করিয়া থাকিলে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, কিন্তু বিছানা হইতে উঠিলেই শিটা বা ফিকা হয় (একন্); গাল উচ্চ এবং উহাতে জালাহুতব; মুখমণ্ডলে, প্রধানতঃ কপালে শীতল বর্ষ (সিনা); মাড়ি সঞ্চালনের সহায়কারী পেশী শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না; দাঁত লাগা (Lock-jaw) (ইগ্নেস্, সিকুটা, হায়োস্, লরোস্, নাক্স-বম্, বেল্); ধমুইকার বাঁহিট্রিয়া ইত্যাদি আক্ষেপিক রোগের পূর্বে বেক্রপ হয়, সেক্রপ হঠাৎ আক্ষেপিক হাসি (Risus Sardonius) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা শীতল (ক্যান্কার, নেভা), শুষ্ক এবং কালচে (ওপিয়াম্, ফস্), ফাটায়ুক্ত, লালবর্ণ এবং ক্ষীত (বেল্, রাস্ টক্স); মুখগহ্বর এবং তালুকা শুষ্ক (এপিস, আস্, নাক্স-মক্); মুখ দিয়া প্রচুর লাল পড়া; গোল মরিচ ইত্যাদি চিবাইলে বেক্রপ হয়, মুখের মধ্যে সেক্রপ ঝাল বোধ; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; জিহ্বা শীতল এবং শুষ্ক (কার্কো-বেজ্, সিটাস্-ক্যান্, মিউর-আস্); ছাল উঠিয়া যা হইলে বেক্রপ হয়, জিহ্বায় সেক্রপ অম্লভূত হয় (কলোস্, বিরেট্-বিরাইড্) । গলার মধ্য শুষ্ক এবং জালাযুক্ত; গলার মধ্যে খল্‌খলে বোধ; গলার মধ্যে টাচিয়া ফেলার জায় অম্লভূত হয় (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, কমেস্); গলার মধ্যের আক্ষেপিক সঙ্কোচন (হায়োস্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা; কল, রসাল এবং টক ত্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট্, চায়না, ফস্-আস্, পিট্রোল্); অথবা ঠাণ্ডা এবং লোন্‌তা ত্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; অত্যন্ত অনিবার্য প্রবল পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জলপানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই, রাট্রোক্,

কম্); উষ্ণ জ্বা খাওয়াতে অনিচ্ছা; প্রবল কাঠ উপসার (ইপিকাক্, কম্, মাক্); হিকা (মিকুটা, হায়োস্, ইগ্নেস্, সাল্ফ-আস্); প্রবল বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত বমনোদ্বিগ এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয়ন কবিতা থাকার ইচ্ছা; বমনোদ্বিগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা ও প্রবল পিপাসা (মাক্); অত্যন্ত প্রবল বেগে বমন; উদরস্থ আহার জ্বালাদি বমন (ইপিকাক্, ক্রিজ্); সর্জবর্ণের স্লেয়া বমন; টেটটিয়া আঠা বা টক তরল পদার্থ বমন; নড়িলে চড়িলে সা জ্বলাদি পান করিলেই বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতল ঘর্ষ হওয়া; কাল পিত্ত এবং রক্ত বমন (আস্, হাইড্রোন্, আস্, সিকেল্); বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামব এবং অত্যন্ত বলক্ষয় (আস্, স্ট্রোফা, আন্টি-টার্ট্); পাকস্থলীর অত্যন্ত ক্ষতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা; পাকস্থলীর মধ্যে প্রবল চাপাবোধ যাহা বক্ষস্থি (Sternum), নিম্ন উদরের দুই পার্শ্ব এবং ভলপেট পর্যন্তও বিস্তৃত হয়; পাকস্থলী এবং উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে প্রথম বেদনা (ইক্সাগ্, আস্, ক্যান্, আইরিস্, কম্)। স্পর্শনে উদর অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় (একন্, বেল্, কলোস্); উদরের ক্ষতি এবং বিস্তৃতি (আলোজ্, চায়ন্না, ক্যান্, কলচ্); শূল বেদনা; উদরে কর্তনবৎ বা কামড়ান এবং মোচড়ানোর ভাষ বেদনা যাহা নাভি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয়; মলত্যাগের পর পেটের বেদনার উপশম (আলোজ্, কলোস্); অস্ত্র মোচড়াইয়া গিয়া (Knot) দিলে ঘেরূপ হয়, উদরে সেরূপ বেদনা; অস্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুর গন্ধার হেতু শূল বেদনা; উদরে শীতল ঘর্ষ; ঠাণ্ডা লাগিয়া শূল বেদনা; কোইনাইনের (Quinine) অপব্যবহারের পর শূল বেদনা; শাক তরকারি বা ফলাদি খাইয়া শূলবেদনা; অস্ত্র বেটে বিল্লী প্রদাহ (Peritonitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন এবং উদরামব, চর্ম শীতল, মুখাকৃতি ঘেন বসিয়া যায়, নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দুর্বল; অস্থিরতা এবং মনের উদ্বিগ্ন; অস্ত্রের মধ্যে অস্ত্রের অংশ প্রবিষ্ট হওয়া (Intussusception) এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা যাতনা; কবলার আঙুলে ঘেরূপ হয়, উপরে সেরূপ আলাপ্তব (আস্, কম্, সিকেল্)।

মল এবং মলহার। পেটে বেদনা সম্বলিত প্রবল এবং প্রচুর পরি-

মাণে উদরাময় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বর্ষ ; মল জলবৎতরল, সবুজের আভাযুক্ত এবং পক্ষীর স্তায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ বিশিষ্ট; চাউল ধোয়া জলের স্তায় ভেদ ; হঠাৎ ভেদ এবং অসাড় হইয়া বা অনিচ্ছা পূর্ব মলত্যাগ ; কাল্পে জলবৎ তরল মল ভেদ ; প্রায়কালে রাত্রিতে হঠাৎ তরল ভেদ বা ভেদ ও বমন ; সাংঘাতিক আকারের ওলাউঠা, যাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহার সঙ্গে সঙ্গে কপালে শীতল বর্ষ হয় ; ফলাদি খাইয়া ওলাউঠা ; গুল্মের জড়তা হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ কোষ্ঠবদ্ধ, — মল কঠিন এবং মোটা, লম্বা নেড় (আলায়, ক্যালী-কার্ক, নাক্স-বম), প্রবল উদরাময় ; দান্তের পূর্বে পেটে চিন্‌চিনে বেদনা বা যাতনা ; দান্তের সময় শরীর মলিন হয় এবং কপালে শীতল বর্ষ এবং বমন হয় ; দান্তের পর পেটে অত্যন্ত খালিবোধ (আস্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্, ট্রামন্) ; অসাড় হইয়া বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ (আস্, বেল্, হায়োস্, সিকুটা) ; সবুজের আভাযুক্ত মূত্র ত্যাগ (আস্, ম্যাগ্-কার্ক, কুটা) ; বারবার অতি অল্প পরিমাণে কাল্পে লাল মূত্র ত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । জ্বীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব (ক্যাক্-কার্ক, নাক্স-বম) ; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি বিষয়ে হতাশ ; কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাৎকের বেদনা (Painful Menstruation) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভেদ ও বমন, অথবা অত্যন্ত দুর্বলকারক উদরাময় এবং শীতল বর্ষ ; সন্তান প্রসবের পর জরায়ু হইতে রক্ত নিঃসরণ (Lochia) বদ্ধ হওয়া এবং স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া যাওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বলা ; আকুড়ে জ্বীলোকের পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (চায়না, প্লাটিনা) ।

শ্বাস যন্ত্র । কঠিনাঙ্গীর বারবার সঙ্কোচন এবং উহাতে আঁটাবোধ ; বারবার কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বেন বহি-  
দিক পানে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অস্বভূত হওয়া ; শ্বাসকষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ক আঁট এবং বাঁধ বাঁধ অস্বভূত হওয়া (ফস) ; বৃক্কের বক্ষস্থিপ্রদেশে চাপা বোধ, সামান্য নড়া চড়াতেই শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ বন্ধ হয়

বা ইপানি (একন, আস্) ; গভীর শব্দ বিশিষ্ট কাশি যাহা রোগীকে বেশ  
হঠাৎ ধাক্কা দেওয়ার জ্বাৰ আক্রমণ করে ; আক্কেপিক কাশি এবং গলা  
দিয়া অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা নির্গমন, মুখ মণ্ডল লাল বর্ণ এবং উহার সঙ্গে  
সঙ্গে অসাড় বা অনিচ্ছাপূৰ্ণক মূৰ্ছ ত্যাগ (আলাম, কষ্ট, কলচ্) ; ঠাণ্ডা  
বাতাস হইতে উষ্ণ ঘরে প্রবেশ করিলে কাশির উদ্রেক (ব্রাই) ; গভীর  
কাশি, উদর হইতে যাহান আরম্ভ বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
কেবল দিনের বেলা গলা দিয়া কঠিন, হরিত্রা বর্ণের তিক্ত বা লোনুতা স্বাদ  
বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন ; বৃক্ক স্থতী বিধানের জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা। কাশি-  
বার সময়ই বাহা অধিক অনুভূত হয় (বেল্, ব্রাই, পাল্‌স্) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত  
যাতনা বা উদ্বেগ (একন, আস্, স্পাইজেল্, সাল্‌ফ্) ও শ্বাস প্রবাস ঘন ঘন  
এবং শব্দযুক্ত । নাড়ী দ্রুতগামী, যুগ্মগতি বিশিষ্ট, দুর্বল এবং অনিয়মিত  
রূপে স্পন্দন বিশিষ্ট ও অসম (কানায়াম্, ডিজিট্, নেট্রা-মিউর) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । শিশু বাদ্ এত দুর্বল হয় যে উহার দক্ষণ  
সে মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারে না (কোনাবাম্) এবং বাহা হৃপিং কাশি-  
তেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; পৃষ্ঠ দেশ এবং কোবরে অত্যন্ত বেদনা  
(আর্গিকা, আস্, ব্রাই) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের  
জ্বাৰ অত্যন্ত কষ্টদায়ক দুর্বলতা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয় বা উহাতে কি  
কি ধরে (সিপিয়া, সাইলিস, সাল্‌ফ্) ; শীতের দক্ষণ হাত পায়ের নখ  
নীল বর্ণ হয় ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা ধৌতলিয়া গেলে বেরুণ হয়, অঙ্গ  
প্রত্যঙ্গে সেরূপ বেদনা বা বাতনা, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস এবং বিছানার  
উষ্ণতাতে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং উপর নীচে চলাচল করিলে বাহার উপশম  
হয় ; হাত পায়ের পাতা বরফের জ্বাৰ ঠাণ্ডা (সাইলিস) । চলিতে পার  
কষ্টানুভব ; প্রথমতঃ ডাইন এবং তৎপর বাম কঁচুকের সন্ধিতে পক্ষাঘাতের  
জ্বাৰ অবশবোধ ; পায়ের ডিমে গিল ধরা (কাক্-কার্ক্, ক্যান্‌ফার, ক্যাম্,  
নাইট্রিক্-আস্, নাক্স-এম্, সাইলিস, সাল্‌ফ্) ।

চৰ্ম্ম । জলে ভিজাইলে যরূপ হয়, চৰ্ম্ম সেরূপ কঁকড়া হয়, চাপিয়া



ধরিতা চাপ ছাড়িয়া দিলেও বাহা কৌচ্‌কাইরা থাকে ; চৰ্ম্ম নীলবৰ্ণ, বেগুনি এবং ঠাণ্ডা ; খোসের ভাৱ কুসুড়ী ।

নিদ্রা । অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের নিদ্রাবেশ (আক্টি-টার্ট্‌, এপিস্‌, নাক্স-মক্‌) ।

জ্বর । সমুদয় শরীরেই শীত এবং কম্প (ত্রাই) ; বাহ্যিক শীতবোধ এবং আন্তরিক উষ্ণতাবোধ ; সমুদয় শরীরে শীতল বৰ্ণ (ইউকৰ্‌ব্‌), কপালেই বাহা অধিক হয় (ক্যাম্‌ফে) ; ওলাউঠার মহামারির সময় জ্বর বিকার-কাহাতে রোগীর জীবনীশক্তির হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস হয় ; নাড়ী অনিয়মিত গতিবিশিষ্ট এবং সচরাচর ক্ষুদ্র ও সূত্রবৎ এবং অনেক সময় প্রায় অহুত হয় না (আস্‌, ক্যানাবিস্‌, কার্কো-বেজ্‌) ; সবিরাম বা পালা জ্বর ; প্রত্যহে বা পূর্বাঙ্কে শীত কম্প (নেট্রাম্‌-মিউর) ; শীত কম্প এবং কেবল বাহ্যিক ঠাণ্ডা বোধ ; প্রথমতঃ অত্যন্ত শীতবোধ, তৎপন্ন শরীর উষ্ণ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা এবং অবশেষে ঘৰ্ম্ম হয় ; শিরাগুলি দিয়া যেন ঠাণ্ডা রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে এক্রপ অহুত হয় ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয়, শীতল বৰ্ণ, অচেতনতা, বমন এবং জলবৎ-তরল উদরাময়, মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, ঞ্জে ভিজাইরা রাখিলে বেক্রপ হয় মুখমণ্ডলের চৰ্ম্ম সেক্রপ কৌকড়া হয় ।

ব্যবহার । কোইনাইনের অপব্যবহার জনিত পুরাতন অস্থখ ; ভর, আতঙ্ক এবং বিরক্তি জনিত অস্থখ ; তামাক, কল এবং শাক তরকারি খাইল শূলবেদনা ; উন্নততা ; শ্বাসশূল ; বাতরোগ ; ধমুটকার ; দাঁত লাগা (Lock-jaw) ; আক্কেপ (Convulsions) ; পক্ষাঘাত ; দৈনিক (Endemic) ওলাউঠা ; এবং বহুব্যাপক (Epidemic) আশ্বারের ওলাউঠা ; সাংঘাতিক আকারের উদরাময় ; গ্রীষ্ম কালীর উদরাময় বা সরল ওলাউঠা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; হপিং কফ্‌ ; রক্তাক্ততা ; হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত অস্থখ ; সবিরাম-জ্বর ; আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার ; রক্তবমন ; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful Menstruation) ; জ্বীলোকের আত্মড়ে পুৰুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; স্মৃতিকাজ্বর ; কাশি ; হপিং কফ বা কাশি ; জ্বীলোকের গর্ভাবস্থায় বমন এবং পাকস্থলীর অত্যন্ত রকমের অস্থখ ইত্যাদি রোগে বিরেট্রাম্‌-আন্‌বান্‌ ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** হঠাৎ বলক্ষয় (একন্, আস্, ক্যান্কার); সামান্য শারীরিক পরিশ্রমেই মুচ্ছা; বিদ্যাতীত যন্ত্র গায় লাগাইলে ঘেঁরুপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সেরূপ বারম্বার ধাক্কা লাগার ভয় অহুত হয়; বিলম্বী, বাহার দরুণ হাত পায়ের পাতা সম্মুখ পানে আকৃষ্ট হয় বা কসিয়া ধরে, অন্ত্যস্ত দুর্বলতা এবং বলক্ষয় (আস্, ফেরাম্, ফন্স); বিলম্বী এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক স্পন্দন; ভয় পাওয়ার পর অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক তরল ভেদ (জেল্‌স্, ওপিয়াম্); জলাদি পানের পর, দান্তের সময় এবং উহার পূর্বে, দাঁড়াইলে এবং ঘূমের পর অস্ত্রের বৃদ্ধি (এপিস্, ল্যাক্, ওপিয়াম্) এবং বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিলে ও ঘর্ষের পর অস্ত্রের উপশম ইত্যাদি বিরোট্রাম্ আল্‌বামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** বিরোট্রাম্ আল্‌বামের কার্যের সঙ্গে একোনাইট্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, কল্‌চিকাম্ এবং ডিজিটা-লিশের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিত্তি কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্পিকা, আসিনিক্, চায়না, কফিয়া, কুপ্রাম্, ডুমিরা, ফেরাম্, ইপিকাক্, ওপিয়াম্ এবং ফফরিক্ আসিডের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** একোনাইট্, ক্যান্কার, চায়না, কফিয়া ইত্যাদি বিরোট্রাম্ আল্‌বামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ওলাউঠাতে ১২ ডাইলুশনই লেখক অধিক ব্যবহার পাকেন । শিশুগণের ওলাউঠাতে এবং যুবা যুবতীর ওলাউঠাতে অধিক পরিমাণে বগক্ষয় হইলে ৩০ ডাইলুশনই অধিক উপকারী, লেখক উহার চিকিৎসার ফল দেখিয়া এক্রূপ বিশ্বাস করেন । ওলাউঠায় অনেক চিকিৎসক ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমক ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া থাকেন । লেখকের মতে ওলাউঠা রোগে ১২ ডাইলুশনই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী । অতএব তিনি উক্ত রোগে উক্ত ক্রমই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । অতীত অস্থি ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

চিনিলাম্ সাল্‌কিউরিকাম্,-সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ কোইনাইন্‌,-

চিনিন্‌-সাল্‌ফ্‌ ।

(CHININUM SULPHURICUM,—SULPHATE OF QUININE,—

CHININ.-SULPH.)

কোন এক বিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ কোইনাইন্‌ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে ভুগার অব্‌ গিলের সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । আল্‌কোহলে মিশাইয়া ইহার আরোকণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে । কিন্তু ইহার গুঁড়াই অধিক উপকারী বলিয়া অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আরোকের ব্যবহার অতি কম ।

সাধারণ ক্রিয়া । কোইনাইনের বৈধানিক কার্য (Physiological action) সম্বন্ধে এপর্যন্ত নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই । সম্ভবতঃ, মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগ এবং গ্যাংলিয়োনিক্‌ স্নায়ু মণ্ডলের (Ganglionic System of nerves) কেন্দ্রের উপরই ইহার কার্য অতি প্রবল । আবার মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মজ্জা স্নায়ুগুলির উপরও ইহার প্রাথমিক (Primary) কার্য থাকা অসম্ভব নহে । উক্ত কেন্দ্র হইতেই শরীরের প্রায় সমুদয় অংশ বা যন্ত্রের উপর ইহা কার্য করিয়া থাকে । ইহা বক্তের ফাইব্রিন্‌ (Fibrin) নামক পদার্থের অংশ বৃদ্ধি করে এবং উহার লাল কণার (Red-corpuscles) সংখ্যা হ্রাস করিয়া লিউকো-সাইথেমিয়া (Leucocythæmia) এবং রক্তাশ্রতা (Anæmia) উৎপাদন করে, বাহার দ্রবণ সার্বসাদিক্‌ দুর্বলতা এবং বলহীন হইয়া থাকে । হোমিও-প্যাথিক মতে উক্ত প্রকারের অবস্থা বা অস্থি কোইনাইন এক উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য এবং স্পন্দনের বেগ প্রথমতঃ বৃদ্ধি করে এবং তৎপর উহার হ্রাস এবং দুর্বলতা উৎপাদন করে, বাহার দ্রবণ শরীরের সন্তাপের হ্রাস হইয়া থাকে । রক্ত বহা নাগীগুলির সহায়কারী স্নায়ু (Vaso-motor nerves) প্রথমতঃ উত্তেজিত এবং তৎপর পক্ষাঘাতাক্রান্ত হওয়ার দ্রুপই উক্ত প্রকারের অবস্থা ঘটিয়া থাকে । কো

কোন যন্ত্র বা অংশের স্থানিক রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রদাহের কাছাকাছি লক্ষণাদিও প্রকাশ পাইতে পারে। মস্তিষ্কেই এই প্রকারের ক্রিয়া অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রদাহ এবং জ্বর ও তজ্জনিত দুর্বলতার পক্ষে কোইনাইন্ হোমিওপ্যাথিক মতে এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। কোইনাইনের প্রাকৃতিকলক্ষণগুলির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা মেলেরিয়া জনিত জ্বরের লক্ষণের জ্ঞান লব্ধি হয়। এজন্তই মেলেরিয়া জনিত সবিরাম বা পালান্সর এবং সাংখ্যাতিক আকারের জ্বরে (Pernicious Fever) কোইনাইন্ এত উপকারী। ইহার ক্রিয়াতে গ্রীহা বর্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার রক্ত উৎপাদন করার শক্তির হ্রাস বা বিনাশ হয়। অতএব রক্তান্নতা (Anæmia) হইয়া থাকে। এই সকল কার্যের সঙ্গে সঙ্গে নিউমোগ্যাস্ট্রিক ন্যায় (Pneumogastric Nerve) বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ যত্নে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং উহার জড়তার দরুণ কামল রোগ হয়, বাহার দক্ষণ পরিপাক কার্য; লব্ধকীয় অনেকানেক অস্থখ এইতে দেখা যায়। চকুর কোটরের উপরি ভাগে ট্রিজিমিয়াস (Trigimius) ন্যায় যে শাখা আছে তাহা ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহার দরুণ উক্ত স্থানের অতিরিক্ত চেতনা এবং তদ্রূপ ন্যায়শূলের জ্ঞান প্রবল বেদনার (Severe neuralgic pains) উদ্ভেদ হয়। সবিরাম অস্থখ এবং মেলেরিয়া জনিত অস্থখের লক্ষণের জ্ঞান লক্ষণ বিশিষ্ট অস্থখ উৎপাদন করা কোইনাইনের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । এক জরময়ী এবং মনের উত্তেজনার ভাব ও তৎপর মানসিক অবসরতা বা নিরাশার ভাব; কোন বিশদ শীঘ্রই ঘটবে সে বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তার ভাব (আলাস্, আনাকার্ড, আস্, ক্যাক্-কার্ক); মনের উদ্বেগ; স্রণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস; কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে উহার সম্বন্ধে ভালরূপ ভাবের উদয় হয় না।

মস্তক । কোন কণ বা যন্ত্রের ঢাকা ঘোরার জ্ঞান বাধা ঘোরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, বাসকষ্ট, এবং গা বমী বমী করা; মাথায় ভারি এবং গোলমেলে বোধ; প্রবল শিরঃ-পীড়া; কপাল এবং উহার দুই পার্শ্বে দপ্‌দপিয়া, চাপিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা; কপালে বেদনা; মাথা ঝাকিলে বেরূপ হয়, মাথায় সেরূপ যাতনা, প্রত্যেক ধাপেই বাহা অমুচুত হয় এবং মধ্যাহ্নে শীত হইয়া যাহা আরম্ভ হয়; মাথার ঠিক উপরি ভাগে দপ্‌দপানি; কোন নির্দিষ্ট সময়ে সবিরাম শ্বাস-শূল; সবিরাম শিরঃপীড়া; মাথায় প্রবল দপ্‌দপানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা এবং মুখমণ্ডলে উষ্ণাভাব; অত্যন্ত বলবৎ হওয়ার দরূপ চক্ষুর পাতা অনিচ্ছাপূর্বক পড়িয়া যাওয়া বা চক্ষু বুজিয়া যাওয়া; শিরঃপীড়া, যাহাতে বেদনা প্রবল হয় না বটে, কিন্তু উহার দরূপ মস্তিষ্ক দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাল পর্যন্ত অনবরত কন্‌কন্‌ করে; মাথা এবং গ্রীবার শিরার ক্ষতি এবং বিস্তৃতি।

চক্ষু । চক্ষু ডিস্ক (Disk) এবং রেটিনা (Retina) রক্তাৱতা; ডিস্ক যেন শুষ্ক বলিয়া অনুভূত হয়, একপানি পাতনা বাপত বা কুরাশার মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ ৰূপা দেখা (কষ্ট, ফস, মার্ক, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); চক্ষুর তাবা বিস্তৃত (বেল্, হারোস্, ট্রায়ন্); চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (একন্, বেল্, চায়না); উজ্জল আলোকে চক্ষু দিয়া জল পড়ে; চক্ষুর সম্মুখে যেন উজ্জল আলোক এবং আগুনের কণা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় (সাইক্লেমেন্, মার্ক্); চক্ষুর কোটরের উদ্ধ এবং নিম্ন স্থানে শ্বাসশূলের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা, সৰ্বদা বর্তমান না থাকিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে যাহার উদ্রেক হয়; সবিরাম টেরাচক্ষু (Intermittent Strabismus); শিশুগণেব হইলে এক দিন চক্ষু টেরা হয় এবং তৎপর দিবস টেরা চক্ষু একেবারেই থাকে না; চক্ষুর যোজক বিল্লীতে রক্তাবরোধ বা উহা লাল বর্ণ হওয়া; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং ক্ষীত; চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত; চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে আলোক একবারেই সহ্য হয় না; চক্ষুর কোটরে ছিড়িয়া ফেলার ভ্রায় যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, পিপাসা এবং জর; সমুদয় অস্থাই একদিন অন্তর একদিন প্রকাশ পায়; ডাইন চক্ষের

মধ্যে বেন একটি আল্পিনের মাথার জায় ক্ষুদ্র দাগ চক্ষুর প্রত্যেক বার সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া বেড়ায়; অন্ধতা; চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক বা সম্প্রদান স্পন্দন (আগারিকাশ্); চক্ষুব কোটরের উপরিভাগের প্রবল দ্বায়ুশূল (বেল, চায়না, স্পাইজেল), প্রতিদিনই বাহার উদ্রেক হয় ।

কর্ণ । কানে টন্ টন্, সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (একন্, আস্, বেল্, চায়না, সাল্ফ্) : বধিরতার সঙ্গে সঙ্গেও কানে উক্ত প্রকারের শব্দ হওয়া; কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া ।

নাসিকা । যুবক যুবতীর নাক দিয়া রক্ত পড়া (Epistaxis) ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডল শিটা বা দিকা, বাতনার চিহ্নযুক্ত, রুগ্ধ, শোণের জায় স্বীত এবং টল্ টলে, মেটেরজ্ বিশিষ্ট : বাম গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) কন্কনানি; মুখমণ্ডল এবং চক্ষুর স্বেতাংশ বা যোজক ঝিল্লী কামল রোগের জায় হরিদ্রা বর্ণ; বাম নিম্ন মাড়ির দ্বায়ুশূল (চায়না, স্পাইজেল), মুখমণ্ডলস্থ দ্বায়ুশূল, প্রাতঃকালেই প্রায় বাহার উদ্রেক হয় এবং বাহ্য চক্ষুর নিম্ন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষুর মধ্য এবং চতুষ্পার্শ্ব-বর্তী স্থানে বিস্তৃত হয় ।

মুখগহ্বর । মুখগহ্বর শুষ্ক; পিপাসা, ঘর্ষের সময়ই বাহার অধিক উদ্রেক হয়; জিহ্বা সাদা (ব্রাই, আণ্টি-ক্রুড্, মার্ক্); জিহ্বা গাঢ়, হরিদ্রা-বর্ণের ফারযুক্ত (Furred); জিহ্বার গোড়া হরিদ্রাবর্ণ (মার্ক্-আয়েড্); জিহ্বা কোমল (মার্ক্), সমুদয় প্রকার আহার জ্ববাই অরুচি; মুখে কাইয়ের জ্বাব বা তিক্ত স্বাদ বা স্বাদ একবারেই থাকে না; কণা বলিবার শক্তির ব্যাঘাত জন্মে (কষ্ট্, জেল্‌স্, হায়োস্)।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা শূন্যতা বা আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি; উদগাব উঠা; মুখ দিয়া জল উঠা; হিকা; বমনোদ্বেষণ; বমন; পাকস্থলীর মধ্যে চাপাবোধ; আহারের পর পাকস্থলীতে চাপাবোধ হইয়া উদরে কষ্টনবৎ বেদনা; অজীর্ণ রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা, বমনোদ্বেষণ, আহারে অরুচি, উদগাব উঠা, মুখে তিক্ত স্বাদ এবং পিত্ত বমন । রাত্রিতে শয়ন করিতে যাওয়ার কিছুকাল পূর্বে যত্নত প্রদেহে বেদনা; সার্বপ্রায় বা পালাজ্বরের পর প্ৰীহার নিবৃদ্ধি এবং

উহাতে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন শোথ (আস্) ; শ্রীহা প্রদেশে শূণ্ শূণ্ বেদনা, চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয় ; শ্রীহাতে হুতী বিধানের ভ্রায় যাতনা ; উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত ও উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ এবং গুল্ল দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ (কার্কো-বেজ্, চায়না, লাইকোপ্, সাল্) ; সরল আন্ত্রে (Transverse Colon) প্রদেশে শূল বেদনার ভ্রায় প্রবল কর্তনবৎ বেদনা বা যাতনা ; এই প্রকার বেদনা বা যাতনা কখন কখন আহ্বারের পরও হইয়া থাকে ; বৃদ্ধ বয়সে পরিপাক শুল্লের লিখিততা ।

মল । মূত্রে ঘাসের ভ্রায় হবিদ্রাবর্ণ, দানায়ুক্ত, অথবা টেটের গুঁড়ার ভ্রায় তলানি পড়ে ; মূত্র ঘোলাটনা, লালবর্ণ এবং অত্যন্ত অসহ্য উগ্রগন্ধযুক্ত (বেন্জ্-আস্) ; রক্ত মূত্র ভ্রাগ ; মূত্র কোষের ব্রাইট্‌স্ ডিজিঙ্ক্ বা আল্-বুমিনুরিয়া (Albuminuria) ।

জননেদ্রিয় । আবার লগিয়া বা অল্প কোন কারণে জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু উত্তেজনার হ্রাস ।

শ্বাস যন্ত্র । বায়ু উপনল এবং বায়ুনলের উপরিভাগে হুড়্ হুড়ীৰ দরুণ কাশি ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, মূহ্ এবং অনিয়মিত (ডিজিট্) ; বৃক্ কষ্ট বা আঁটাবোধ ; হ্রস্বলতার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর হয় ; বৃকের পার্শ্বে হুচীবিধান বা ঘাটিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই, কালো-কার্ক) ; পাজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের বাবুশ্ল (Intercostal neuralgia) ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত যাতনা ; হৃৎস্পন্দন ; হৃৎপিণ্ডের হ্রস্বলতা, সর্কাস্কক বলক্ষয় (একন্, আস্, ডিজিট্) ; নাড়ী পূর্ণ এবং মোটা ; নাড়ী হ্রস্বল, কম্পমান, অনুভূত হয় কি না হয় (আস্, একন্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মেক দণ্ডের গ্রীবাদেশস্থ শেষ অস্থি এবং পৃষ্ঠদেশস্থ প্রথম অস্থি প্রচাপনে বেদনায়ুক্ত হব বা টাটায় ; কোমর প্রদেশস্থ হাড়ের উক্ত প্রকারের বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় ; স্পর্শনে কোমর প্রদেশস্থ তৃতীয় অস্থিতে বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ কষ্ট-হুত্ব ; কসেত্রকার উত্তেজনা (Spinal irritation) ; কোন এক নির্দিষ্ট

সময়ে কখন কখন পৃষ্ঠদেশে বেদনা, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বাহার উদ্বেক হয় এবং বাহা মাথা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা, উহার কম্পন এবং উহার স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চালনের শক্তির হ্রাস বা বিনাশ; হাত ঠাণ্ডা এবং উহাতে ঠাণ্ডা ঘর্ষ; প্রদাহবিশিষ্ট বাত রোগ; তরুণ প্রবল সন্ধিবাত; স্বল্পবিরাম এবং সবিরাম-অঙ্গ; সন্ধিগুলি অত্যন্ত বেদনাক্লান্ত (চায়না); সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভারি বোধ এবং কন্কনানি, বাহা সন্ধিগুলিতেই অধিক অনুভূত হয়; ডাইন পার্শ্বের সায়োটিক স্নায়ুশূল (Sciatic neuralgia) ।

নিদ্রা । স্নায়ুশূলগত অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হওয়ার দরুন নিদ্রাশূন্যতা ।

জ্বর । শীতকম্প; এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের আক্রমণ (সিউন); অপরাহ্ন ৩টার সময় শীতকম্প; জ্বরে শীতলাবস্থা, উষ্ণাবস্থা, ঘর্ষাবস্থা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া জ্বর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া যায়; পূর্বাহ্ন ১০ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত (নেট্রা মিউর) এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে দ্ব্যধিক জ্বরের আক্রমণ (চায়না) অথবা ত্র্যধিক জ্বর; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন; প্রাণাতে বেদনা (আর্স); মেরুদণ্ড বেদনাক্লান্ত; মুখমণ্ডল শিউ বা ঘিকা; পিপাসা; ওঠ নালবর্ণ; কানে টন্টন্ শব্দ হওয়া (চায়না); সাংক্ৰান্তিক শীত বোধ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে; হাত পাদের অগ্রভাগ বা পাতা, নাক এবং টুঁটী ঠাণ্ডা; শরীরের সন্তাপের হ্রাস; শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ; মাথায় পূর্ণ বোধ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; অত্যন্ত পিপাসা; রাত্রিতে বা বিছানায় শয়ন করিবার পর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাদবাস গাভাঙ্গা এবং হাচি হওয়া; প্রলাপ; বাত এবং পাদের শিরায় বিস্তারিত বা বিস্তৃতি; চক্ষু শুষ্ক এবং উষ্ণ; প্রচাপনে কানের কা বেদনাদায়ক হয়; দন্কা উচ্চাভূত; অপরাহ্ন ৪ টার সময় পিপাসা; ঘর্ষ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; স্থির ও নিশ্চল ভাবে থাকিলেও প্রচুর ঘর্ষ; উচ্চাভূত পর ঘর্ষ আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়; সামান্য চড়া চড়াতেই প্রচুর ঘর্ষ (ব্যাল্-বাক্, মার্ক, কম); প্রায় প্রতিদিন



প্রাতঃকালেই বিছানার শয়নাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম (ক্যাক্-কার্ক, নাইট্রিক্-আস্‌, ফস্‌); প্রচুর পরিমাণে, হ্রস্বলকারক, রাজিবোধে, উদরাময়; ঘূমেরবোধে বা নিদ্রাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম (চায়না, ফস্‌); অত্যন্ত হ্রস্বলকারক ঘর্ম।

ব্যবহার। মেলেরিয়া জনিত সকল প্রকারের রোগ; মেলেরিয়া জনিত সবিরাম, স্বল্প বিরাম এবং সাংঘাতিক আকারের জ্বর; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু শীত কম্প; প্লীহার বিবৃদ্ধি; বহুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার বিবৃদ্ধি; কামল রোগ; রক্তাল্পতা (Anœmia); রক্তের খেত কণার বৃদ্ধির দরুণ অসুখ বা লিউকোসাইথিমিয়া (Leucocythœmia); হ্রস্বলতা; সবিরাম আকার বিশিষ্ট সকল প্রকারের অসুখ; প্রদাহ; সপুষ্ট প্রদাহ; শোথ; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; সংশ্রাস বোগ; কোন কোন প্রকারের স্নায়ু শূল; বাত রোগ; অঙ্গীর্ণ রোগ; বধিরতা; অন্ধতা; মাথাঘোরা, কোন নির্দিষ্ট সময়ে যাহার আক্রমণ হয়; শিরঃস্রীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ভারি এবং পূর্ণ বোধ, ঘাটিনা ধরা এবং মাথাঘোরা ও কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়া; হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি অসুখে কোইনাইন ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। অস্থিরতা, স্পর্শ এবং শব্দাদি অসহ্য হওয়া; শরীরের মধ্যে বেন কেমন কেমন করে, যাঁহার দরুণ মনে হয় যেন কোন এক কঠিন রোগ শীঘ্রই হইবে; হ্রস্বলতা; কম্পন; মুচ্ছার ভাব; জ্বা; বাহ্যিক বিষয়ের অতিরিক্ত জ্ঞান; অত্যন্ত ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং ভারি বোধ এবং কোন কার্য করিতে অনিচ্ছা; শরীরের স্থানে স্থানে সবিরাম আকার বিশিষ্ট স্নায়ুশূল; লক্ষণাদি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে (আস্‌), এক দিন অন্তর একদিন (চায়না) আক্রান্ত হয়, অথবা প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্বে ধামিয়া যায়; প্রদাহযুক্ত স্থানে পূর্বের সঞ্চার হইয়া লীত হয় (হিপ্-সাল্‌ফ্‌, মার্‌); প্রচুর ঘর্ম (আস্‌, চায়না, ফস্‌, সাল্‌ফ্‌-আস্‌); শোথ, যাহা বহুত এবং প্লীহার অসুখেই অধিক বর্তমান থাকে, (আস্‌); মেলেরিয়া জনিত অসুখের দরুণ শোথ (আস্‌, চায়না); হ্রস্বল এবং স্নায়বিক; সামান্য পরিমাণেই শ্রান্তিবোধ এবং হৃৎস্পন্দন, রক্তস্রাব, পুঁষাদি নিঃসরণ, ধাতু নিঃসরণ, উদরাময়, রক্তস্রাব (চায়না) ইত্যাদির দরুণ অত্যন্ত

চূৰ্ণনতা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপমান স্পন্দন এবং গর্ভচর্চা; বহুষ্ঠাকারের জ্বাৰ আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অচেতনতা ইত্যাদি কোইনাইনের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মেলেরিয়া জনিত অসুখে আর্সিনিক্, সিড্রন্, ইউপেটবিয়াম্ পাক্‌লিওটাম্, ফেরাম্ নেট্রান্, মিউরিয়াটিকাম্, ল্যাকেসিস্ ইত্যাদি ঔষধের কার্যের সঙ্গে কোইনাইনের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আর্সিনিক্, ইপিকাকিউএনা, নাস্‌-বমিকা, বিরেটাম্ আল্‌বাম্, সাল্‌কার ইত্যাদি কোইনাইনের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । আমরা কোইনাইনের ১ম দশমিক ক্রমেব শুঁড়া ১ বা ১ গ্রেইণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়া সকল রোগেই বখোচিত ফল পাইয়া থাকি । আদত কোইনাইন ৩ ১ বা ১ গ্রেইন্ মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোইনাইনের স্পিরিট মিশ্রিত আরোহ আমি কখনও ব্যবহার করিয়া দেখি নাই । অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পারি না ।

চিনিনাম্ আর্সিনিকোসাম্, - আর্সিনিয়েট্ অব্ কোই-  
নাইন্, - চিনিনাম্-আর্স্ ।

(CHININUM ARSENICOSUM, — ARSENATE OF QUININE, —

(CHININ.—ARS)

চিনিনাম্ আর্সিনিকোসাম্ যদিচ সচরাচর অধিক ব্যবহৃত না হউক, তথাপি ইহা দ্বারা কতকগুলি রোগের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । অতএব ইহার বিবরণও প্রথম শ্রেণীর ঔষধ মধ্যে লিপিত হইল । কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতার ঔষধালয় হইতে আদত আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইন্ ক্রয় করিয়া সুগার অব্ মিক্‌স সহিত

মিশাইয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আর্যক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** যদিচ এই ঔষধ স্নায়ুশরীরে অধিক পরীক্ষিত হয় নাই, তথাপি রোগ চিকিৎসায় ইহার উপকারীতা অনেক দেখা গিয়াছে । রক্তের সাব পদার্থ, শৈল্পিক ঝিল্লী এবং স্নায়ু মণ্ডলের উপর ইহার বিশেষ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহার লক্ষণ ক্রম সন্ধিবাত (Arthritis), বিকারের লক্ষণাক্রান্ত, অত্যন্ত বলহীন এবং জীবনী-শক্তির হ্রাস সম্বলিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই প্রদাহের অবস্থা শৈল্পিক ঝিল্লীতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে ডিপথিরিয়া (Diphtheria) এবং সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর রোগের চিকিৎসায় ইহা দ্বারা বিশেষ কল পাওয়া যায় । ইহা সবিরাম জ্বরের ন্যায় জ্বর এবং সবিরাম আকার বিশিষ্ট স্নায়ুশূল উৎপাদন করে । এই স্নায়ুশূল রোগীকে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহা মেলেরিয়া (Malaria) জনিত অনেকানেক অন্থে বিশেষ উপকারী । ইহার কার্য কোইনাইন্‌ এবং আর্দিনিকের মিশ্রিত কার্যের তায় ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** মানসিক অবসন্নতা ; মানসিক জড়তা ; একাকী নিস্তর্র ভাবে থাকার ইচ্ছা (জেলস্‌) ; মনের উবেগ এবং রাজিতে প্রলাপ ; শিরঃ পীড়া, যাহা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রোগী চিড়্‌চিড়ে হয় ।

**মস্তক ।** একপেশে মাথা ধরা (আধ্‌কপালীয়া মাথা ব্যাথা), শাণীরিক বা মানসিক পরিভ্রমে ধাহার বৃদ্ধি হয় ; ভয় থাইয়া এক পেশে মাথা ব্যাথা ; মাথার গোলমেল বোধ ; মাথার মধ্যে ছুঁবী বিধানের তায় বেদনা যেন সর্সাদা চলিয়া বেড়াইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, বাহার লক্ষণ ঘূমের ব্যাঘাত জন্মে ; কপালে এবং মাথার পশ্চাত্তাগে বেদনা ; কপালের ডাইন পার্শ্বে এবং চক্ষুর উপরি ভাগে স্নায়ু শূলের তায় বেদনা ; মাথার বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলা বা ছিদ্ৰ করার তায় বেদনা বা ঘাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু আক্রান্ত হইয়া চক্ষুর সম্মুখে ধড়্‌ ফড়্‌ কর',

চক্ষে বেদনা এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া ; উক্ত বেদনার আক্রমণের সময় কানে টন্ টন্ শব্দ, বমনোদ্বেষ, বমন, নিয়মিত রূপে রাত্রি ছই প্রহরের সময় বাহার উদ্রেক হয় (চিনিদাম্-সাল্‌ফ্‌) ; মাথার পশ্চাৎ ভাগের বাম উন্নত স্থানে (Left occipital protuberance) জ্বালাযুক্ত বেদনা বাহা বাড়, কঁকাত্তী, বুকের বাম অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বাহার দরুণ সোজা হইয়া না বসিলে বোগীব নিশ্বাস বন্ধ হয় (Orthopnea) ; হাটতোলা, গা ভাঙ্গা, শীত কম্প ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া উক্ত বেদনা আবৃত্ত হয়, বেদনা সচরাচর প্রাতঃকালেই আরম্ভ হয় এবং প্রায় রাত্রি ছই প্রহর পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ।

চক্ষু । চক্ষে আলোক একবাবেই সচা হয় না ; চক্ষুর অর্ধিকিউ-লেরিস্ পেশিব (Orbicularis muscles) আক্ষেপ, চক্ষু দিয়া বারবার বেগে জল নির্গমন এবং চক্ষে বড় রকমের ক্ষত ; রাত্রি ছই প্রহর হইতে রাত্রি এটা পর্য্যন্ত বাতনাদির বৃদ্ধি ; চক্ষব কর্ণির প্রদাহ (Keratitis) ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ বাহার দরুণ বাতনাদি রাত্রি ছই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয় ; পাখীর ডানা কাড়িলে যেরূপ হয়, বাম চক্ষের সম্মুখে স্নেহপ ধড়্‌ফড়ানীর স্ফা অল্পত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে অত্যন্ত বেদনা বা বাতনা, চক্ষু দিয়া জল পড়া ; এই সকল লক্ষণ আধ্বপালীয়া মাথা ব্যাধাতেই অধিক হয় ।

কর্ণ । কানে টন্‌টন্‌ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে এক পেশে মাথা ধরা (চিনিদাম্-সাল্‌ফ্‌) ।

নাসিকা । তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর স্লেয়া নির্গমন ; স্লেয়া দ্বারা যেন নাসাবন্ধ কৃত হইয়া থাকে, ঘরের বাহির হইলে বাহার উপশম হয় ; পৃথ এবং রক্ত মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা নাসাবন্ধ কৃত হইয়া থাকে ; ডিপ্-থিরিয়াতে : নাসাবন্ধের কোণে ছাল উঠিয়া যাওয়া ; ডিপ্‌থিরিয়া (অরাম) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা বা সাদাটিয়া এবং ক্ষীত ও টলটলে বাহা সবিরাম জ্বরেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (আস্‌, নেট্রাম্‌মিউর) ; কণ্‌ মূল এবং হর্যাস্তির নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থির ক্ষীতি ; ওষ্ঠ নীল বর্ণ (ফুস্‌সের ফোটিক রোগে,—In Tuberculosis of the Lungs) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা গাঢ় এবং কটাবর্ণের লেপযুক্ত (ডিপ্‌থিরিয়া রোগে), মুখে দুর্গন্ধ (ডিপ্‌থিরিয়া এবং আরক্ত জরে) । আরক্ত জরে গলার মধ্যে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্ম ফিকা বা সাদাটিবা, শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ-ভাগের প্রৈম্নিক ঝিল্লীর শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ ; ডিপ্‌থিরিয়া ; মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ; হ্রস্বাহির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষতি এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ; নাসিকা রক্ত মিশ্রিত পুঁথ দ্বারা ক্লান্ত হওয়া ; নাসারন্ধ্রের কোণে ভাল উঠিয়া যাওয়া ; জিহ্বা গাঢ় কটাবর্ণের লেপযুক্ত ; টনসিলে ধূসর বর্ণের পদার্থের সঞ্চার ঘাঘা দ্বীভূত হইলে আক্রান্ত স্থানে রক্তের চিহ্নের আয় ক্ষত বর্তমান থাকে, এই ক্ষতের ধার আবড় থাকে ; আল্‌জিহ্বার নিম্ন অর্দ্ধাংশ পচিয়া যায় এবং উহার উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ দূষিত পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় ; জলাদি তরল পদার্থ গিলিতে অশক্তি ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; নিদ্রাশূন্যতা ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী ।

পাকস্থলী এবং উদর । অনিবার্য্য পিপাসা ; এইরূপ পিপাসা স্বাস রোধ হওয়ার সময় বা যক্ষা কাশাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় ; ভিন্ন এবং মন্ত খাইলেই যাতনাময় উদরাময় আরম্ভ হয় ; বোগী (জীলোক) ঠাণ্ডা জল খাইতে চাহে না ; বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ও তৎপর নিদ্রা (আণ্টি-টার্) । বাম হাইপোকণ্ড্রিয়াম্ প্রদেশের বিবৃদ্ধি ; উদর ক্ষীত এবং বিতৃত (সিবিরাম-জরে) ।

মল । মেনেসিয়া জনিত উদরাময় (চিনিমাম্-সাল্‌ক্) ; মল কল-বৎ তরল, দুর্গন্ধযুক্ত (আস্) এবং ভেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্তের মধ্যে অত্যন্ত বেদনা ।

মূত্রযন্ত্র । আক্ষেপিক রকমে মূত্রাবরোধ ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ (ডিপ্‌থিরিয়া রোগে) ; ইহা ব্যবহারে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের দূষিত পদার্থগুলি বায়ুনের উপরিভাগে বিস্তৃত হইতে পারে না ; শ্বাস কষ্ট বা ফাঁপড় হওয়া প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ, হাত এবং নখ নীল বর্ণ হয় ; শ্বাসরোধ হওয়ার সময় রোগী সম্মুখ পানে বাঁকিয়া, এবং স্তব্ধ হইলে একটা জানলার নিকট বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আস্, কার্ফো-

(বজ্র),—এই যাতনা অল্প কোন ভাবে বসিলে বৃদ্ধি হয়; শ্বাস কষ্ট এবং তদ্রূপ মনের অত্যন্ত উদ্বেগ বাহ্য যক্ষাকৃণাদিতেই অধিক হইয়া থাকে; বৃদ্ধ বয়সে কতক পরিমাণে পুরাতন আকাবের (Sub-acute) সন্ধি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর, বাহ্য রাস্মিতেই অধিক হয়; বুকের বাম পার্শ্বের নিশ্বাস প্রস্থাসের সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎস্নায়ুশূল (Angina Pectoris) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথের লক্ষণ, শিরা গুলিতে, রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং শরীর নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া (Cyanosis); হৃৎকম্প; হৃৎস্পন্দন, পৃষ্ঠ দেশের উপর ভর করিয়া হেলিয়া বসিলেই বাগা অমুভূত হয়, মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একবারেই অমুভূত হয় না; হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে কার্য্য করে। নাড়ী ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত দ্রুতগামী, (এমন কি প্রতি মিনিটে ২০০ বারও স্পন্দন করিতে পারে) এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; বাম স্তন-প্রদেশে স্নায়ুশূলের জ্বর ভয়ানক বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ মনে হয় আক্রান্ত অংশ যেন কেহ গরম চিন্টা দিয়া ছিড়িয়া কেলিতেছে; পালকর হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাত এবং নখ নীল বর্ণ; হাত পা বরফের জায় ঠাণ্ডা।

নিদ্রা । শ্বাসরোধের আক্রমণের পৰ গভীর নিদ্রা; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া এবং নিদ্রাশূন্যতা।

জ্বর । সবিসম জ্বর; পূর্ণাংকুর শীত হয়, এই নীচ কোন নির্দিষ্ট সময়ে হয় না; কখন কখন প্রতিদিন একবার করিয়া শীত হয়, আবার কখন কখন একদিন অন্তর একদিন হয়; কখন কখন জ্বরের আক্রমণ বর্ষ্য হইয়া শেষ হয় এবং কখন কখন জ্বর শেষ হওয়ার সময় বর্ষ্য একবারেই হয় না; জ্বরের আক্রমণের পূর্বে শিরঃপীড়া, হাতীতালি এবং গা ভাঙ্গা; শীত যেন ঢেউয়ের জায় নাচিয়া নাচিয়া আইসে এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বর্ধমান থাকে; গায়ের লোম খাড়া হয়, নিডানায় থাকিয়া হাত পায়েব পাতা কোন ঠাণ্ডা বস্তুরে লাগাইলে বা নাড়িলে, অথবা চলিলে বা উহার বিপর চিন্তা করিলে বাহ্য বৃদ্ধি হয়; শীতের পর রাত্রি ছই প্রহরের সময়

জ্বর, নাড়ী পূর্ণ এবং প্রবল ও উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কাঁপড় ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা ; জ্বরের পর ঘর্ম হয় না, রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে, প্রাতঃকালে মানসিক অবসন্নতা এবং প্রাতঃকালে খাওয়ার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ; প্রবল জ্বর এবং উষ্ণার সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষয় (ডিপ্ থিরিয়া এবং সাংঘাতিক আকারেব আরক্ত জ্বরে) ; সপূঁষ অস্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে হৃতীকাজ্বর (Fever in Puerperal Septic Peritonitis) ; সমুদয় শরীরে ঠাণ্ডা চট্ চট্টিয়া ঘর্ম ।

চর্ম । চর্ম শুষ্ক এবং সাদাটিয়া বা কিকা এবং উষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নিস্তেজতা এবং বলক্ষয় ; কোন কোন নির্দিষ্ট সময়ে ত্রণ এবং ফোড়া, যাহার দরুণ মাথার ঘাতনাদির অনেক হ্রাস হয় ।

বাবহার । সিবিরাম বা পাণাজ্বর ; নেলেরিয়া জনিত সর্ব প্রকারের অস্থ ; এক পেশু মাথা ধরা (আপ্ কপানীয়া মাথা ব্যাথা, -Hemicrania) ; শিরঃপীড়া ; ডিপ্ থিরিয়া ; সাংঘাতিক আকারের আরক্ত-জ্বর ; গ্রীবা দেশের স্নায়ুশূল ; পাজরার হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের স্নায়ুশূল (Intercostal neuralgia) ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ (Serofulous Ophthalmia) ; চক্ষুর কর্ণির প্রদাহ (Keratitis) ; গলাব মধ্যের সাংঘাতিক আকারের ক্ষত ; যক্ষাকশাদি ক্ষেটিক বোগ (Tuberculo-is) ; মৃগীরোগের জ্বর আক্ষেপ ; বৃদ্ধবয়সে কতক পারমাণে পুষ্কাতন আকারেব সর্দি ; সপূঁষ অস্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ সম্বন্ধিত হৃতীকা জ্বর (Puerperal Fever with Septic Peritonitis) ইত্যাদি অস্থখে আর্সিনিকোয়েট্ অব্ কোইনাইন্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অত্যন্ত বলক্ষয় ; মৃগীর জ্বর আক্ষেপ, যাহার আক্রমণের পূর্বে মনে হয় যেন বিদ্যুতের জ্বাব কোন পদার্থ মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া গ্রীবার ডাইন অংশদিয়া বাহ্যে বিস্তৃত হয়, এবং তদরুপ মনে হয় যেন আক্রান্ত অংশ বারদাব মোচড়াইয়া পড়িতেছে এবং যাহার দরুণ স্পষ্ট কেড়্ কেড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ; মুখমণ্ডলের পেশীগুলি যেন আক্ষেপিক রূপে কমিয়া থাকে, দৃষ্টিরোধ এবং বাকরোধ হয়, চেতনা থাকে না এবং রোগী মৃত্তিকায় পড়িয়া যায় ; আক্রমণের পর শরীরে ঠাণ্ডা ঘর্ম হয়, বারদাব জোরে উল্কার বা ঢেবুর উঠে এবং রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া

পড়ে; রাত্রিতে, রাত্রি দুই প্রহরের পর, প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একদিন, তিন্ম বা শেত্ শেতিয়া বায়ু বা জল বৃষ্টিতে অস্থাদির বৃদ্ধি : শোণ হওয়ার ধাতু ইত্যাদি আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইনের কতক গুণি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আর্সিনিয়েট্ অব্ কোইনাইনের কার্যের সঙ্গে এণিস্, আর্সিনিক্, আরানিয়া, চিনিমাম্-সাল্ফ্, চারনার কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম দশমিক ক্রমের গুড়াই বিশেষ উপকারী, বিশেষতঃ জ্বর রোগে । সপ্তম অস্ত্রাবরক বিষয় প্রদাহ সম্বলিত স্ত্রীকাজরে (Puerperal Fever with Septic Peritonitis), ১ম দশমিক ক্রমের গুড়া, ১ গ্রেইণ্ মাত্রায় ব্যবহা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন । অন্তান্ত রোগে ৩য় দশমিক হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম পর্যন্ত গুড়া ব্যবহার্য্য ।





# দ্বিতীয় ভাগ ।

## দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔষধ সমূহ

অর্থাৎ

যে সকল ঔষধ প্রথম শ্রেণীর ঔষধ অপেক্ষা কম

ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আসিডাম্ হাইড্রোসায়েনিকাম্,-হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্,-  
হাইড্রো-আস্

(ACIDUM HYDROCYANICUM.—AC. HYDROG.)

ত্রিটিস্ ফার্মাকোপিয়ায় মতানুসারে প্রস্তুত করা হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ই আদ্যত হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ বলিয়া পরিগণিত । যতপরিমাণ হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ উহাতে তত পরিমাণ রেকটিফাইড্ স্পিরিট মিশাইলে, ১ম শততমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হয় । এই ১ম শততমিক ডাইলুশন (ইহাকে ২য় দশমিক ডাইলুশনও বলা যায়) হইতে যথা নিয়মে ২য়, ৩য় এবং ততোধিক শততমিক বা দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে । হাইড্রোসায়েনিক্ আসিড্ অতি শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায় । অতএব যখন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তখন সদা সদ্য প্রস্তুত করিয়া লইলেই ভাল হয় ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা এবং নিরাশা ; মনের উদ্বেগ বা যাতনা ; শাশ্বতলীল মধ্যে কষ্টানুভব বা যাতনা ; কাল্পনিক অনিশ্চয়ের ভয় ; অত্যন্ত চিড়্, চিড়্ করা ; হুঃখ ; রাগ এবং কোন প্রকার কার্যে অনিচ্ছা ।

মস্তক । কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অশক্তি এবং অবসন্নতা ; শ্রবণ শক্তির হ্রাস ; মাথায় গোলমেলে এবং ভারি বোধ ; মাথাঘোরা

এবং তদ্রূপ ব্যাধির চলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; মাথা বেদনা যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয় ; মাথার সম্মুখ ভাগে কদিয়া ধরা এবং মাথার খোঁচা বিধার জ্বাৰ বেদনা বা ব্যতনা যাহা সকল সময় একস্থানে থাকে না ।

**চক্ষু ।** চক্ষু অন্ধখোলা (শিবচক্ষু) এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট, চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং স্থির ভাববিশিষ্ট বা অচল ও চক্ষুর গোলক পরিচালনে অশক্তি ; চক্ষুর পাতা পক্ষাঘাতের জ্বাৰ বিস্তৃতরূপে খোলা থাকা ; চক্ষুর উপবের পাতার পাখীর ডানা ঝাড়ার জ্বাৰ স্পন্দন বা ধড়ফুড়ানি ; চক্ষে ঝাপ্সা দেখা ।

**কর্ণ ।** ছই কর্ণের মধ্য দেশেই কনকনানি এবং কখন কখন উহাতে সোঁ সোঁ, টন্ টন্ শব্দ হওয়া ; কানে কম শুনা ।

**নাসিকা ।** নাসারন্ধ্রের উপবিভাগে জ্বালা বা চিড়িকমারা ; নাকের পাতার বিস্তৃতি এবং উহা নীলবর্ণ হওয়া ; নাসিকার মধ্য শুক ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল গোথের জ্বাৰ টল্ টলে এবং বুদ্ধ বয়সের জ্বাৰ কোচকান ও নীলের আভ্যন্তর ; ওঠের কোঠের বিকৃতি ; দাঁত লাগা (Lock-jaw) ; মুখমণ্ডলের পেশীর ভয়ানক বিকৃতি ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** মুখে অতিরিক্ত পরিমাণে লালের সঞ্চার ; জিহ্বা কখন সাদা, কখন বা কালচে লেগন্তুক ; জিহ্বার গোড়ার সঙ্কোচন ; জিহ্বা শীতল ; জিহ্বার পক্ষাঘাত ; তালুকায় বেদনা ; গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগ এবং আহাৰ বহা গলনালীর আক্ষেপ ; তালুকা, গলার মধ্য এবং আহাৰ বহা গলনালীতে জ্বালাহুভব ; গলার মধ্য এবং আহাৰ বহা গলনালীর প্রদাহ ।

**পাকস্থলী, উদর এবং মল ।** মুখে মিষ্টবাসি ; ক্ষুধা শূন্যতা এবং আহারের অনিচ্ছা ; সকল প্রকার আহার দ্রব্যই অকৃতি এবং বমন করার ইচ্ছা ; কাল্চে তরল পদার্থ বমন । পাকস্থলীতে বেদনা ; পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা বোধ ; পাকস্থলীতে মোচড়ানের জ্বাৰ বেদনা এবং তদ্রূপ অন্তান্ত ব্যতনা ; পাকস্থলীর আক্ষিপিক সঙ্কোচন এবং উহাতে জ্বালা এবং উষ্ণাহুভব ; অপবা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ ; স্বঃপ্রদেশে দপদপিয়া বা চিড়িক মারার জ্বাৰ বেদনা ; সমুদর উদর শীতল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন পর্যায়ক্রমে জ্বালাহুভব ; উদরে গড়্ গড়্, কপ

কল শব্দ হওয়া; উদর স্ফীত এবং বিস্তৃত, অথচ চাশিলে কোমল বলিয়া অনুভূত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রাবরোধ; বারম্বার মূত্রত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে জলের ভায়ে তবল, ফিকা বা ফিকা হরিদ্রা বর্ণের মূত্রত্যাগ এবং উহাতে ঘোলাটিয়া তলানি পড়ে; গাঢ় এবং লালচে তলানি বিশিষ্ট মূত্রত্যাগ; অসাড়ে বা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্রত্যাগ; মূত্রনালীতে আলামুভব।

শ্বাসযন্ত্র। কাশি; কণ্ঠনালীতে টাচিয়া ফেলার ভায়ে আলামুভব; কণ্ঠনালী প্রদাহ (Laryngitis); কণ্ঠনালীর স্ফীতি; গলার মধ্যের সঙ্কোচন; কণ্ঠনালীতে হুহু-হুহু; স্বর কর্কশ এবং স্বরভঙ্গ; রক্তোৎকাশ। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, ঘড়-ঘড় শব্দ বিশিষ্ট; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃদু এবং বিলম্বে বিলম্বে বহে; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ইচ্ছা; শ্বাস প্রশ্বাস গভীর, ঘন ঘন এবং ঘড়-ঘড়, সাঁই সাঁই শব্দযুক্ত; শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টকর; ফুস্ফুসের পক্ষাঘাত; বৃকে কষ্টানুভব; হাঁপানি; শ্বাস বন্ধ হইয়া কাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া এবং উহা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বৃকে ভরানক বেদনা; বৃকে আঁটবোধ এবং উহার সঙ্কোচন; বৃকে প্রথর বেদনা; বৃকের ডাইন পার্শ্ব কন্কনানি; হৃৎপ্রদেশে বেদনা এবং অভ্যন্ত চাপা বোধ; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের মৃৎস্পন্দন।

চর্ম। শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, টুট এবং ওঠের মধ্যবর্তী স্থানেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; কুঁচকিতে লাল বর্ণের ভায়ে ফুসুড়ী; হাত এবং শরীরের অন্যান্য উজ্জ্বল ও গ্রীবাদেশে কোম্বার ভায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসুড়ী; চর্ম শুষ্ক, চর্ম মৃত দেহের ভায়ে মলিন এবং নীলবর্ণ।

নিদ্রা। বাবম্বার হাইতোলা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কম্পন ও চর্মের সঙ্কোচন; অত্যন্ত অনিবার্য নিদ্রাবেশ; আহায়ে পর নিদ্রার অভ্যস্ত ইচ্ছা; প্রাতঃকালে ঘোর নিদ্রা; অনবরত নিদ্রার ইচ্ছা; নিদ্রাশূন্যতা; অথবা ঘুম হইলেও বাবম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; স্পষ্ট স্বপ্ন দেখা; স্বপ্নে মৃত্যু দেখা।

জ্বর। শীত কম্প, প্রধানতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর; শীতকম্প, হাইতোলা অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা; হাত পা ইত্যাদি ঠাণ্ডা;

আভাস্তরিক এবং বাহ্যিক শীত বোধ, প্রথমতঃ শীতকম্প, তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ; মাথা গরম এবং হাত পা ঠাণ্ডা; অপরাহ্নে সমুদয় শরীর উষ্ণ এবং স্বৰ্ণ; জ্বরের সময় হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন; শীতকম্পের সময় মাথা ঘোরা; কম্পের সময় চক্ষে ঝাপসা দেখা।

ব্যবহার। মূগী রোগ জনিত মাথা ঘোরা; অল্প কালের মূগীরোগ; ধূতঠিকার (প্রধানতঃ আঘাত জনিত ধূতঠিকার); হৃৎপিণ্ড বা কালি; আক্কেপিক, হাঁপানি কাশি; ওলাউঠাতে দুকেব মধ্যে আক্কেপিক আকারের বাতনা (অর্থাৎ ওলাউঠার পতনাবস্থায় যেদপ হইয়া থাকে); হৃৎপিণ্ডের দ্বারবিক এবং ঘাস্তিক অস্থি; দঃস্নায়ুশূল (Angina Pectoris); পাক-স্থলীতে বেদনা এবং বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্রে শূল বেদনার স্তায় বেদনা ইত্যাদি অস্থখে হাইড্রোসায়োনিক্ আসিড্ ব্যবহার্য্য।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। কসেরকা মজ্জার উপর হাইড্রোসায়োনিক্ আসিডের কার্য্য অনেকটা একোনাইট্ এবং নিকুটার স্তায়। মূগী রোগে ইহার কার্য্য ইনাসি ক্রোকেটার স্তায়।

ডাইলুশন বিচার। ওলাউঠাতে ওষু এবং ঔষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। তিনি এই ঔষধ অল্প কোন রোগে কখনও ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব সে সময়ে তিনি কিছুই বলিতে পাবেন না। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন, যে হৃৎপিণ্ডকে এবং পাকস্থলীর বেদনাতে, ১ ডাইলুশন ব্যবহার্য্য এবং উপকারী।

আসিডাম্ মিউরিয়াটিকাম, মিউরিয়াটিক্ আসিড্,-

মিউর-আস্।

(ACIDUM MURIATICUM, -MURIATIC ACID, -AC. MUR.)

ইহার সাধারণ নাম হাইড্রোক্লোরিক্ আসিড্ (Hydrochloric Acid)। কোন এক বিশুদ্ধ সোদোপাত্যক ঔষধালয় হইতে আদত মিউরিয়াটিক্ আসিড্ ক্রয় করিয়া উহার ১২ ভাগ, এবং ৪ ভাগ চুয়ান জল একটা

কাঁচের ষ্টপারদার (Stoppered) শিশিতে ঢালিয়া মিশ্রিত করিয়া দ্বা-  
নিয়মে ১ম দশমিক ডাইলুশন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১ম শততমিক বা  
২য় দশমিক ডাইলুশন চূয়ান অণে প্রস্তুত হয়। ৩য় শততমিক বা ৩ষ্ঠ দশমিক  
ডাইলুশন পর্য্যন্ত রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্ মিশ্রিত চূয়ান জল (২৫ ভাগ চূয়ান  
জল এবং ৫ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিট্) দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪র্থ  
শততমিক ক্রমের আরোক ডাইলুট্ স্পিরিট্ এবং ৫ম শততমিক ও  
ততোধিক ক্রমের আরোক রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্যাংলিয়োনিক্ স্নায়ু মণ্ডল (Ganglionic  
system of nerves) দিয়া রক্ত, চৰ্ম, এবং আহারবহানলী (Alimentary  
canal), প্রধানতঃ মুখগহ্বর এবং গুহ্য দ্বারের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল,  
বাহ্যর দক্ষণ রক্ত বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার জমাট হওয়ার প্রকৃতি বৃদ্ধি  
পায় এবং সহজেই পচিব্যার স্বভাব বা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলী  
এবং অন্ত্রের স্নায়িক শিথিলী প্রদাহ, ক্ষত এবং তন্দ্রকণ উহাতে এক  
প্রকারের ধূসরের আভাসুক্ত সাদা দূষিত পদার্থের সঞ্চার হইয়া থাকে।  
দুর্বলকারক বা অতিরিক্ত বলক্রয় এবং পচন বিশিষ্ট বিকারের লক্ষণ  
আক্রান্ত অরের স্থার অবস্থা উৎপাদন করা এই ঔষধে একটা বিশেষ  
প্রকৃতি বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অচেতনতা (আস্, বেল্, ওপিয়াম্); কৌধানী বা কৌকানী;  
সর্বদা খিট্ খিট্ করা, চিড়্ চিড়্ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সহজে  
রাগাধিত হওয়ার স্বভাব (ব্রাই, ক্যাম্, নাস্-বম্)।

মস্তক। বহির্বাযুতে মাথাঘোরা এবং চলিবার সময় বারম্বার  
হেলিয়া টলিয়া পড়া; ছিঁড়িয়া ফেলিলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে অথবা খেঁত-  
লিয়া গেলে ঘেক্রপ হয়, মাথায় সেরূপ বেদনা (কফিয়া); মাথায় পশ্চাৎভাগে  
ভারি বোধ; ডাইন কানের পশ্চাৎভাগের হাড়ে বেদনা।

কর্ণ। কানে কম শুনা; কানে সামান্য শব্দও লাগে বা সহ হয় না  
একন্, বেল্, লাইকোপ্)।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল, কপাল, কপালের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের ভায় ফুসুড়ী; সমুদয় মুখমণ্ডল প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে লালবর্ণ হয়; ওষ্ঠের ধারের ছাল উঠিয়া যায় এবং উহার চৰ্ম শুষ্ক এবং কাটায়ুক্ত হয়; ওষ্ঠে জালা (একন, আস্) ; নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** জিহ্বা পুরু, নীলের আভাযুক্ত এবং ধূসরের আভাযুক্ত সাদা পর্দার দ্বারা লেপযুক্ত, অথবা উহাতে গভীর ক্ষত, বাহার নিম্ন ভাগ বা ভূমি কালচে; জিহ্বার কোষ্ঠার ভায় কুসুড়ী (লাইকোপ্ নেট্রাম-মিউর) এবং উহাতে জালা; জিহ্বা যেন একখানি সীসার ভায় ভরি বোধ হয়, বাহার দরুণ কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মে; জিহ্বা যেন খাঁট বা ছোট হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; ওষ্ঠ এবং মুখের মধ্যের স্নৈয়িক বিল্লী প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ, ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় ক্ষতযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত হয় ও উহার স্থানে স্থানে সাদা দাগ পড়ে; মুখে হর্গন্ধ; মুখে যা (হাইড্রাট্) । গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগের স্নৈয়িক বিল্লী গাঢ় কালচে লালবর্ণ, ক্ষীত, জালাযুক্ত এবং উহাতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভায় চড়্‌চড়নি, উহাতে ধূসরের আভাযুক্ত ডিপ্‌থিরিয়ার ভায় সাদা দৃষিত পদার্থের সঞ্চার (বাক্-অয়োড্, নাইট্রিক্-আস্, কাইটোল্) ; গিলিবার সময় গলার মধ্যে ভয়ানক আক্ষেপ এবং তদরূপ ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয় ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** পেটে খালি খালি বোধ, আহার করিলেও বাহা দ্রুত হয় না । উদর পূর্ণ এবং বিস্তৃত (চারনা, হিপ্-লালক্) ; উদরে খিল ধরার ভায় বেদনা বা বাতনা; অন্ন বৃক্ক (Hernia) ।

**মল এবং মলদ্বার ।** প্রস্রাব করার সময় গুহ বাহির হইয়া পড়া; গুহদ্বারে আস্রের ভায় ঝোপায় ঝোপায় অর্শ রোগের বলী বাহির হয় (ক্যাক্-কার্ক্, ল্যাক্, পাল্‌স্, আলোজ্) বাহা ক্ষীত এবং নীল বা লালবর্ণ হয় এবং বাহাতে জালা এবং টাটানি বর্তমান থাকে; অস্ত্রের জড়তার দরুণ দোষিৎক (আলাম্) ; মূত্রত্যাগের সময় অশাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক জলবৎ-তরল মূত্রত্যাগ (হারোস্) এবং তৎপন্ন গুহ দ্বায়ে জালা এবং চিচ্চিকমারী; রক্ত ভেদ হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ (এগিস্, আপোসা-  
নাম্, অর্জেন্ট-মেট) । মূত্রাধার এবং উহার প্রাচীর শিথিলতার দরুন  
অসাধে মূত্রত্যাগ ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ববভঙ্গ (আগ্নাশ্, চায়না, ক্যান্সার) ।  
স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব (ক্যান্স-  
কার্) ; জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত এবং উহা হঠতে পচা দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত-নিঃসরণ  
ও উহাতে অত্যন্ত টাটানি এবং সার্বজনিক দুর্গন্ধতা ।

শ্বাসযন্ত্র । পুরাতনু আকারের স্ববভঙ্গ ; প্রবল শ্বাসরোধক কাশি  
এবং কাশির আক্রমণের পরই বুকের মধ্যে যেন ঘড়-ঘড় শব্দ হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে খোঁচা বিধার জ্বাৰ বেদনা  
বা যাতনা ; রক্তিতে হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা লাগার জ্বাৰ প্রবল বেদনা বা যাতনা  
যাহা মুখমণ্ডল পর্যন্তও অনুভূত হয় ।

পৃষ্ঠদেশ । অনেককণ বাকিয়া বা উপুড় হইয়া থাকিলে, যাকোন  
জারি বল উঠাইলে যেরূপ হয়, পৃষ্ঠদেশে সেকণ বেদনা বা যাতনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । বাহ্যে অরিবোধ ; বাহ্যে  
ছিড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা কন্কনানি ; হাতের পাতার পশ্চাৎভাগে  
এবং আঙ্গুলের উপরিভাগে পুঁথ এবং চুমটি বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ; নিখিবার সময়  
হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেশীযুক্ত অংশে খিগ ধরার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা ।  
হাঁটুর সন্ধির ক্ষীতি ; চলিবার সময় পায়ের ডিমে এবং গোড়ালীতে কসিয়া  
ধরার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা ; পায় পচাযুক্ত ক্ষত ; পায়ের পাতা শীতল ।

নিদ্রা । রক্তিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া বারবার জাগিয়া উঠা ; অত্যন্ত  
চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ।

চর্শ্ব । গায় চুমটা বা মরা চর্শ্বের জ্বাৰ খোশা বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী ; পচা-  
বা ( পায়ের নিম্নভাগে ) এবং উহার চতুর্দিকে আশঙ্কব ; গায়  
বেদনাযুক্ত বা কষ্টদায়ক গভীর পচাযুক্ত ঘা এবং উক্ত ঘা মরা চামড়ার  
জ্বাৰ খোশা দ্বারা আবৃত ।

জ্বর । শীত সর্বাপেক্ষা প্রবল ; শীতলাবস্থার কম্প, হাইতোলা,  
গভাক্সা এবং পিপাসা না থাকা, তৎপর শরীর উষ্ণ হওয়া ; উষ্ণাবস্থায়

শিপিাদি না থাকে এবং অত্যন্ত ছোট কট করা ও-পায়ের কাপড়াদি ফেনিয়া দেওয়া ; নাড়ী অসম (Intermittent) ; রাত্রিতে, সন্ধ্যার সময়, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে বন্ধ । মুখে বা সম্বলিত আন্ত্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার ।

ব্যবহার । মুখে বা বিশিষ্ট জ্বর-বিকার, মৌহক-জ্বর (Typhus Fever) ; আরক্ত-জ্বর ; গলার মধ্যে পচাযুক্ত ক্ষত বা ঘা ; মুখে বা ; মুখে ক্ষত বিশিষ্ট অস্থি ; গায় পূর্ববিশিষ্ট কুসুড়ী ; পচাযুক্ত ক্ষত ; অর্শরোগ ; মুখগহ্বরের প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত অস্থি ; বধিরতা ; ধ্বজতঙ্গ ইত্যাদি অস্থি মিউরিয়াটিক আসিড ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অল্প প্রত্যঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বাৰ বেদনা বা যাতন, বিশ্রাম কালীন যাহার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় এবং নড়াচড়াতে যাহার উপশম হয় ; উরুদেশের দুর্বলতা, যাহার দ্রুত চলিবার সময় পা কাঁপে ; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে ঘেরূপ হয়, সমুদয় সন্ধিতে সেরূপ বেদনা ; অত্যন্ত বলক্ষয় ; হাত পা শীতল ; 'আত্ম' বাতাসাদি সহ্য হয় না ; জিহ্বা এবং গুহ্বারের সঙ্কোচক বস্তুর (Sphincter ani) পক্ষা-ঘাত ; জ্বর রোগে মুখে বা ইত্যাদি মিউরিয়াটিক আসিডের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । মিউরিয়াটিক আসিডের কার্যের সঙ্গে নাইট্রিক আসিডের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ব্যাপ্টিসিয়া, পালমেটোলা, রাস-টল্ল, আমোনিয়াম কার্ব, ক্যাক্সেরিয়া কার্ব, লাইকোপডিয়াম, ফস্ফ-রাস, নিপিয়া এবং সাল্ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ব্রাইওনিয়া এবং ক্যান্সার মিউরিয়াটিক আসিডের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় মিউরিয়াটিক আসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে কার্বোনেট অব সোডা, কার্বোনেট অব লাইম, অথবা ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার্য্য ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । জ্বর বিকাবে, বিশেষতঃ মুখে বা থাকিলে লেখক ১ম



## সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ।

৩৫৭

ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। অত্যন্ত অল্পে তিনি ওয় ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করেন।

### সিমিসিফিউগা রেসিমোসা,—সিমিসিফ্ ।

(CIMICIFUGA RACEMOSA,—CIMIC-RACE.)

সিমিসিফিউগার অপর নাম আক্টিয়া রেসিমোসা (Actaea Racemosa)। আমেরিকাস্থ ক্যানডা, জর্জিয়া এবং পশ্চিমাঞ্চলের আবৃত এবং পার্কভীর স্থানে এই গাছ জন্মে। শুকনা মূল বা শিকড় দিয়া যথানিয়মে এক্স স্পিরিট দ্বারা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেফকা মৰ্জ্জা দিয়া ইহা সমুদয় দ্রাব্যিক মণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া উহার নিতেজতা বা অবসন্নতা উৎপাদন করে এবং প্রকারান্তরে পেশী এবং স্নায়ু জননক্রিয় আক্রমণ করিয়া আক্রান্ত অংশের বাত এবং স্নায়ুশূলের জ্বাৰ অনেকানেক অস্থব উৎপাদন করে। ইহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক মৃদু করে এবং ধমনীর বিস্তৃতির শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয়, যাহার দরুণ মাথাঘোরা, চক্ষুর তারার বিস্তৃতি এবং বেলাডোনার জ্বাৰ অত্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু বেলাডোনার জ্বাৰ ইহাতে লক্ষণাদি অধিক প্রবল হয় না। মনের উত্তেজ এবং দ্রাব্যিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রকৃতি, শুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিৰ্জনে বাস করার ইচ্ছা (চায়না, ম্যাগ্নিউর, নাল্-বম্) ; রোগী (স্নায়িক) বলে যেন তাহার জ্ঞান বুদ্ধি শীঘ্রই লোপ পাইবে (ক্যাক-কার্ক) ; দুঃখিত এবং বিরক্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ (ইগ্নেনস্) ; মানসিক অবসন্নতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করার ভাব বা ইচ্ছা ; স্নায়ুশূল জ্বাৰাম হওয়ার পর উত্তেজতা ; অনবরত নানা বিষয়ে কথা বলা (ল্যাক) ;

সুস্কৃতর (একন্, আন্, আয়াশ, নাইট্রিক-আন্); কোন বিষয়েই মন-  
যোগ দিতে ইচ্ছা হয় না (এথুজা, জেলন্, নাল্-বন্, কন্-আন্); অত্যন্ত  
চিড়্‌চিড়ে স্বভাব; সামান্য কারণেই রাগ হয় (ক্যাম)।

**মস্তক।** মাথাঘোরা, মাথা বড় এবং উহাতে ভারিবোধ হয় (জেলন্);  
মাথার সমুখ ভাগে ঘৃশ্‌ঘৃশে বেদনা, চাপিলে যাহার উপশম হয়; মাথা  
এবং চক্ষুর গোলকে প্রবল বেদনা, সামান্য নড়াচড়াতেই যাহার বৃদ্ধি হয়  
(ব্রাই); মাথার উপরিভাগ যেন ফাটিয়া পড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয়;  
মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বড় বলিয়া অনুভূত হয় এবং উহাতে দগ্ধপ্-  
করে (জেলন্, ম্লোনয়েন্); মাথাঘোরা এবং মাথার উপরিভাগে পূর্ণরোধ এবং  
কন্‌কনানি; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (বেল); মস্তিষ্ক স্বাভাবিক  
অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয় (অার্জেন্ট-নাইট্রিক, ম্লোনয়েন্); অপরাহ্ন  
এবং সন্ধ্যার সময় মাথার পশ্চাৎভাগে কন্‌কনানি বা ঘৃশ্‌ ঘৃশে বেদনা বা  
যাতনা, ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্বাযুতে গেলে যাহার  
উপশম হয়; সমুদয় মস্তিকেই বেদনা বা যাতনা, মাথার পশ্চাৎভাগেই যাহা  
অধিক অনুভূত হয় এবং উক্ত প্রদেশে স্পষ্ট টাটানি; মাথার ডাইন পার্শ্বে  
এবং চক্ষুর কোটির পশ্চাৎভাগে অত্যন্ত প্রখর বেদনা; বহির্বাযুতে মাথা  
বেদনার উপশম।

**চক্ষু।** চক্ষুর গোলকে প্রবল কন্‌কনানি, মাথা ও চক্ষু সঞ্চালনে  
যাহার বৃদ্ধি হয় (আলোজ্, স্পাইজেল্); চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষুর  
সমুখে যেন কাল দাগ ভাসে।

**কর্ণ।** সামান্য শব্দও যেন কানে লাগে (একন্, বেল, ব্রাই); প্রথমতঃ  
বাম কানে এবং তৎপর উভয় কানেই গানের শব্দের জায় বা সোঁ সোঁ শব্দ  
হয় (চারনা)।

**মুখমণ্ডল।** মুখাকৃতি পাগলের জায় ভয় উৎপাদক ভাব বিশিষ্ট;  
কপাল ঠাণ্ডা; মুখমণ্ডল শিটা বা কিকা, চক্ষু বড়, বসিয়া বার এবং কাল্‌চে  
রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; গালের মেলার অস্থির (Malar bone) উপস্থিত  
সামুদ্রিক বাহা রাক্ষসে দ্রুত হইয়া পর দিবস পুনরায় আরম্ভ হয়; বারবার  
মুখমণ্ডলে উচ্ছ্বাস্তব, যাহার দক্ষণ রেণী সর্বদা বহির্বাযুতে থাকিতে চাহে।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে হর্গক ; জিহ্বা কিকা কটা-  
 স্বর্ণ, প্রধানতঃ জিহ্বার মধ্যভাগ ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুক এবং উষ্ণ ;  
 আহারবহা গলনালীর উপরি ভাগে পূর্ণ বোধ (জেল্‌স) ; গলার দ্ব্যেয়  
 স্থানে স্থানে শুকাহুতব, বাহার দক্ষণ কাশির উল্লেখ হয় ; থক থক করিলেই  
 গলা দিয়া আটাল তামার স্বাদ বিশিষ্ট প্লেয়া নির্গত হয় (জার্জেট্-  
 নাইট্‌ল) ।

পাকস্থলী এবং উদর । বমনোদ্বগ, উল্কার উঠা, মাথা ধরা  
 এবং শরীরের কম্পন (জীলোকেরই এই সকল লক্ষণ অধিক হয়) ; সবুজ  
 পদার্থ বমন ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত প্রথর বেদনা ; উদরোচ্চ প্রদেশ পড়িয়া  
 বাওয়ার ভায় অল্পভূত হয় (ব্যাপ্ট্‌, হাইড্রাষ্ট্‌, ইগ্নেস্‌, পিটোন্‌, সিপিরা,  
 সালফ্‌, বাইবার্ম) । মধ্যমধ্যে উদরে শূল বেদনার ভায় বেদনা, হাঁটু  
 শুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে বা মলত্যাগের পর বাহার বৃদ্ধি হয়  
 (কলোস্‌) ; অস্ত্র, কোমরের পশ্চাৎভাগ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভয়ানক কষ্টকারক  
 বেদনা ; উদরের পেশীগুলি টাটায় ।

মল । পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আর্কি-জুড্‌,  
 আরোড্‌, নাক্স-বম্‌) ; বারম্বার তরল কালচে দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ (আস্‌) ।

মূত্রযন্ত্র । অনবরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন ; মূত্রকোষ এবং পৃষ্ঠদেশে  
 চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা বা যাতনা ।

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের জরায়ু প্রদেশে অত্যন্ত টাটানি (এপি,  
 বেল্‌, ল্যাক্‌) ; অনিয়মিতরূপে, নিয়মিত সময়ের অনেক পর, রক্তস্রাব বা  
 একবারে রক্তঃস্রাব (পাল্‌স্‌, সেনিসিস্ত, সিপিরা) ; নিয়মিত সময়ের অনেক  
 পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে কালচে চাপ চাপ, থানা থানা রক্তঃস্রাব ; রক্তঃস্রাবের  
 সময় মৃগী বা হিষ্টিরিয়া রোগের ভাষা আক্ষেপ ; জরায়ু প্রদেশে বেদনা, বাহা  
 এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে সবিয়া পড়ে ; উদরে আড়াআড়ি প্রবল  
 বেদনা, বাহার দক্ষণ রোগী হাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় ;  
 পেটে প্রসব বেদনার ভায় বেদনা (ক্যাম্‌, নাক্স-মক্‌) ; বাতাক্রান্ত কষ্টকর  
 রক্তঃস্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful Menstruation), বাহার  
 দক্ষণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে বাধ্য হয় ; কষ্টকর

রক্তাশ্রাব এবং রক্তের সঙ্গে পর্দার ভায় পদার্থ নির্গমন; ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা যাহা উপরের দিকে সরিয়া পড়ে; জরায়ু এবং কোমরের পশ্চাৎদেশে নিম্নদিকে ঠেলিয়া নামার ভায় বেদনা বা টন্ টন্ করার ভায় বাতনা; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভারি বোধ এবং উহার জড়তা (আলোজ্, পাল্‌স্, সিমিয়া); তল-পেটে প্রবল বেদনা; ষ্ঠেত প্রদর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে ভারি বোধ (সিমিয়া); গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেষ এবং মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম প্রসব বেদনা (জেল্‌স্, সিকেল্‌); নিভ্রাশূন্যতা (কফিয়া); প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ার সময় শরীর কম্পন (একন্‌); অতি প্রবল এবং আক্কেপিক আকারের ক্ষুদ্রাশূল; প্রসব বেদনার সময় জরায়ুর মুখ শক্ত থাকে বা শীঘ্র মুখ খোলে না (বেল্‌, জেল্‌স্‌); সন্তান প্রসবের পর পেটে বেদনা যাহা কুঁচকি প্রদেশেই অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অত্যন্ত টাটানি, বমনোদ্বেষ বা বমন; ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রসবের পর জরায়ু হইতে ক্লেন (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া; সন্তান প্রসবের পর উন্মত্ততা (Puerperal Mania) (হারোল্‌); স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, বাম স্তনের নিম্নভাগেই বাহা অধিক অনুভূত হয়; স্তনে জ্বালাভূতব।

শ্বাসযন্ত্র । রক্তিতে অনবরত শুষ্ক, কণ্ঠস্থায়ী কাশি (আলাম্‌, হারোল্‌, পাল্‌স্‌); গলার মধ্যে ফুড়্‌ফুড়ী এবং তদ্রূপ প্রবল কাশি; বুকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চীৎভাবে শয়ন করিয়া আক্রান্ত স্থান হাত দিয়া চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; এই বেদনা নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয় (বেল্‌, ড্রাই, মার্‌ক্‌, ফন্‌)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া বুকের নিম্নভাগ এবং বাম বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, হাতে শীতল ঘর্ম্ম এবং বুকের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিলে ঘেরূপ হয়, বাম হাতে সেরূপ অবশ্য বোধ হয়। নাড়ী দুর্বল এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীতে বাতের বেদনার ভায় বেদনা, যাহার দরুণ ঘাড় বা পৃষ্ঠদেশ নোয়ান যায় না (রাস্‌-টক্স) এবং হাত সকালন করিতে কষ্টানুভূত হয়; কসেককায় বেদনা বা টাটানি

যাহা ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশের অংশেই অধিক অম্লভূত হয় ; মাথা এবং ঘাড় যেন খাট হয় ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া ঘাড় নোয়ান যার না (ডাক্ ), বাহ্যিক দরুণ হাত সঞ্চালন করিতে কষ্ট অম্লভূত হয় ; কোমর এবং গুহ্বারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্কনানি (টিক্‌লান্), যাহা কুঁচকি হইতে উৎপন্ন হয় নিম্নদিকে বিস্তৃত হয় ।

**অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।** বায়বাহ্যিক অনিচ্ছাপূর্বক অনবরত এলোমেলো সঞ্চালন, যাহার দরুণ উক্ত বায়ু সঞ্চালনের শক্তি থাকে না ; সন্ধিকালে বাতরোগের দ্বারা বেদনা এবং আক্রান্ত সন্ধির ক্ষতি ও উহাতে উষ্ণভাব (ব্রাই) ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্কনানি ; পেশীতে অত্যন্ত টাটানি (আর্গিকা) ; পেশীর মোটা অংশই (Belly) বেদনা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় ; লিখিবায় সময় হাতের আঙ্গুল কাঁপে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন, বাহ্যিক দরুণ চলিয়া বেড়ান স্থকঠিন হইয়া পড়ে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থিবোধ, বাহ্যিক দরুণ রোগী হট্‌ফট্‌ করে এবং অস্থির হইয়া পড়ে ।

**নিদ্রা ।** অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা (কফিয়া, ওপিয়াম) ; স্বপ্নের দ্বারা বিরক্তি জনক বা চিন্তা উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ; অস্থির নিদ্রা বা ঘুম ভাল না হওয়া ।

**ব্যবহার ।** জননেব্রিয়ের উত্তেজনা হেতু হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত এবং স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের বাত রোগ ; স্নায়ুগ্ন ; কোরিয়া (Chorea) এবং অজ্ঞান স্নায়বিক অস্থি ; মদোন্মত্ততা (Delerium Tremens) ; মানসিক অস্থি ; মস্তিষ্ক এবং কসেরিকা মার্জ্জাবরক কিল্লী প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis) ; কসেরিকা উত্তেজনা (Spinal-irritation) ; স্নায়ু-শূল ; কুঁচকিবাত ; মৃগী রোগ ; হিষ্টিরিয়া ; বাত রোগ ; পেশীবাত ; ক্রিম্ম ফুফুলাবরক কিল্লী প্রদাহ বা প্লুরোডিনিয়া (Pleurodynia) ; স্তন্যের অর ; কষ্টকর রজঃপ্রাব এবং বাধকের বেদনা ; (Painful-menstruation) ; রজঃরোধ ; স্বেদপ্রদর ; ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অস্থি সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** পেশীর দুর্বলতা, কম্পন এবং আক্কেপিক সঞ্চালন ; সমুদয় শরীরের স্নায়বিক কম্পন ; আক্কেপ দ্বারা অঙ্গ

প্রত্যেক একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত হয়; জ্বীলোকের ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর অস্থিখের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা স্থানে ছুঁচী বিধানের দ্বারা প্রথমে বেদনা; বাম পার্শ্বই অধিক আক্রান্ত হয়; বেদনাদি হঠাৎ রোগীকে আক্রমণ করে; শরীরের নানা স্থানে বিছাতের ধাক্কা লাগার দ্বারা অস্থিত হয়; মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁচলিয়া গেলে ঘেঁকপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা বা যাতনা অস্থিত হয়; জ্বীলোকের শেষ রজঃস্রাবের সময় সমুদয় অস্থিখ বিশেষ উপযোগী (গ্যাক্, পাল্‌স্); চিন্তা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্নায়বিকতা; সমুদয় শরীরে, প্রধানতঃ বাহ্যে, অবশ্যবোধ; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, নড়াচড়াতে, রজঃস্রাবের সময় অস্থিখের বৃদ্ধি; বিশ্রামে, বহির্বাযুতে এবং আহ্বারের পর অস্থিখের উপশম; বাম স্তনের ঠিক নিম্নভাগে বেদনা ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেগিমোসার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ।** জরায়ুর উপর সিমিসিফিউগার কার্য। কলোফিলাম্ এবং সিকেল্ কণ্ট্রামের দ্বারা। বাত রোগে ইহার কার্য অনেকটা একোনাইটের দ্বারা। স্নায়বিক মাণ্ডলের উপর ইহার কার্য কতকটা একোনাইট্ এবং ইগ্‌নেসিয়ায় দ্বারা; কম আংশাল পেশীর এবং রক্তের উপর ইহার কার্য অনেকটা ডিজিটালিস্ এবং সিকেল্ কণ্ট্রামের দ্বারা। এতদ্বির ইহার কার্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আর্গিকা, ব্যাপ্‌টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলাডোনা, জেল্‌সমিনাম্, হায়োসায়েরমান্, লিলিয়াম্ টাই-গ্রিনাম্ এবং পাল্‌সেটিলার কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** একোনাইট্, ব্যাপ্‌টিসিয়া, কলোফিলাম্, জেল্‌সমিনাম্, পাল্‌সেটিল ইত্যাদি সিমিসিফিউগা রেগিমোসার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** ১ম, ২য়, ৩য় দশমিক ক্রমই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেক সময় দুই আরোক, ১ কোঁটা মাত্রায়, ব্যবহার করিয়া মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

## ইস্কুলাস্ হিপোকাস্টেনাম্,—ইস্কুল্-হিপ্

(ÆSCULUS HIPPOCASTANUM,—ÆSC. HIP.)

ভারতবর্ষেব উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তর আমেরিকায় এই গাছ জন্ম। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং ফ্রান্স দেশে বাগানাদিতে এই গাছ অনেকে রোপন করিয়া থাকে। পাকা ফলের বিচিত্র শাস বথানিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আবোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াই স্নেহ শবীরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অতএব ডাক্তার হিউজেস মতে ইহার গুঁড়া আরোক অপেক্ষা অধিক উপকারী। আমরা এতদেশে আরোক ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকি।

সাধারণ ক্রিয়া। যকৃত এবং পিত্তনিসারক শিরাদির উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রাদিতে রক্তাবরোধ হইয়া প্রতি ক্রিয়াতে অল্পের কোলন (Colon) নামক অংশ, শুষ্ক এবং শুষ্কহারের স্লেয়া জনিত প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া হিমারয়েডেল্ শিবাগুলিতে অত্যন্ত রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয় এবং তদরুণ প্রবল আকারের জ্বর রোগ উৎপন্ন হয়। কোমর এবং শুষ্কহারের ঠিক উপরিভাগে প্রবল কন্কনানি বা বেদনা উৎপাদন করা ইস্কুলাসের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মথো পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্বদা বিমর্ষতাব; মানসিক অবসন্নতা এবং চিড়্‌চিড়ে বা খিট্‌খিটে স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বন্, ক্যাম); কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করার অশক্তি।

মস্তক। কপালে ঘুশ ঘুশে চাপা বোধ; সামান্য বমনোন্মেষ এবং উহার তৎক্ষণাৎ পর তলপেটের ডাইন পার্শ্বে সূচী বিধানের ভ্রায় বেদনা বা যাতনা (ব্রাই); মাথায় গোলমালে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা; কপালের হুই পার্শ্বেব মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে বেদনা; মাথার পশ্চাৎভাগ, গ্রীবা এবং স্বন্ধে বারবার দম্কা উচ্চাত্তব।

**চক্ষু ।** চক্ষে ভারি বোধ এবং চক্ষু গোলক টাটানি ও উচ্চাশ্রু-  
ভব ; বাম চক্ষু উপরিভাগে অত্যন্ত কন্কনানি বা বেদনা ; পাখীর ডানা  
কাড়িলে যে রূপ হয়, চক্ষুর সম্মুখে সেকরূপ ধড়ফড় করার জ্বাৰ অতীবৃত্ত হওয়া  
(সাইক্লোমেণ) ।

**নাসিকা ।** নাকের গোড়ার পশ্চাৎভাগে এবং কোমল তালুকার  
হল কুটানের জ্বাৰ বেদনা এবং আলাহুভব ; নাকের গোড়ার পশ্চাৎ-  
ভাগেও শুকাহুভব ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল দিকা বা শিটা এবং অত্যন্ত রুগ্ন (আস্) ;  
মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্থানে স্থানে লালবর্ণ এবং উহাতে দম্কা উচ্চাশ্রুভব ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** জিহ্বা সাদা বা হরিদ্রা বর্ণের  
লেপযুক্ত (ব্রাই, নাক্স-বম, পাল্‌স্) ; মুখে হরিদ্রা বর্ণের লালের জ্বাৰ শ্বেয়ার  
সঞ্চার ; মুখে মিষ্ট স্বাদ (মার্ক্, সাল্‌ক্) ; মুখে তিক্ত স্বাদ (একন্, চায়না,  
কলোন্, ব্রাই, নাক্স-বম, পাল্‌স্, সাল্‌ক্) ; মুখে হ্রিব স্বাদ (মার্ক্,  
সাল্‌ক্) ; ছাল উঠিয়া ক্ষত হইলে যে রূপ হয়, জিহ্বায় সেকরূপ অমুক্ত  
হয়, (এপিস্, আইরিস্, পাল্‌স্, সিপিয়া) । ঠাণ্ডা বা সর্দি লাগিলে যে রূপ হয়,  
গলার মধ্যে সেকরূপ শুক এবং শ্বেত (অথবা ছাল উঠিয়া বাওয়ার জ্বাৰ)  
আলা অমুক্ত হয় (একন্, আলাম্) ; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন ;  
মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শ্বাসশুলের জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** প্রবণ বমন (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্) ;  
পাকস্থলীতে অত্যন্ত আলা এবং যাতনা (আস্, ক্যাছ্, আইরিস্, ফস্) ;  
একখানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যে রূপ হয়, পাকস্থলীতে সেকরূপ চাপা বোধ  
(একন্, আস্, ব্রাই, নাক্স-বম, পাল্‌স্) ; কাঠ উদগার বা উদগারে দূষিত  
বায়ু উঠা । তলপেটের ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই, চেলিডন্,  
মার্ক্, চায়না) ; যকৃত এবং উদগোষ্ঠ প্রদেশে অত্যন্ত যাতনা (চেলিডন্,  
নাক্স-বম) ; পাকস্থলী হইতে যকৃতের ডাইন অংশ পর্যন্ত অনবরত কন্-  
কনানি বা বেদনা ; স্পর্শনে উদর অত্যন্ত টাটায় বা বেদনায়ুক্ত হয় ; শুষ্ক-  
তার দ্বারা উৰ্দ্ধগুক্ত দূষিত বায়ু (Etiology) নিঃসরণ ; উদরে গড়গড়, কল  
কল শব্দ হয় ।



মল এবং মলদ্বার । ছোট ছোট কাটি বা চৌচ বিধিয়া বা লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, শুষ্কের মধ্যে সেক্রপ শুষ্ক এবং অসুবিধা বোধ ; শুষ্কদ্বারে চড়্ চড়ানি, জালা, চুলকানি এবং উহাতে পূর্ণ বোধ ; অর্শের বলী (Tumour) গুলি চিনের বাদামের জায় ও বেগুনি রঙ্গের এবং উহাতে কষ্টদায়ক জালাহুভব ; অন্ধ-অর্শ (Blind Piles) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কনকনানি ও উহা সঞ্চালনে অশক্তি, অথবা উহাতে খোঁচানিধার জায় বেদনা বা যাতনা ; মল শুষ্ক এবং অত্যন্ত কঠিন ও অতি কঠে নির্গত হয় (ব্রাই) ; অথবা মল তরল হটলেও উহা নির্গত হওয়ার সময় শুষ্কদ্বারে অত্যন্ত জালা টনটনানি বা চড়্ চড়ানির উদ্ভেক হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারবার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ (একনু, ক্যাঙ্ক, কলোস্, ডিভিট) ; মূত্র কাল্চে এবং কাদাটিয়া ও উহাতে গাঢ় কটাবর্ণের তলানি পড়ে ; মূত্র হরিদ্রা বর্ণ (আম্বা) এবং উহাতে গাঢ় স্নেহা তলানি পড়ে (বার্বেরিস) ;

জননেন্দ্রিয় । জীলোকের গাঢ়, কাল্চে, ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ ও শুষ্কদ্বারের ঠিক উপরিভাগের সন্ধিতে কনকনানি এবং উহা সঞ্চালনে অশক্তি ।

খাসযন্ত্র । কণহারা কাশি, গিলবার সময় অথবা দীর্ঘ নিশ্বাস প্রাশ্বাসে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় অহুভূত হয় (আম্বা, কন্, ক্রমেজ) ; বুকে আঁটা বোধ ।

হৃৎপিণ্ড । অর্শরোগ হেতু হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সম্বন্ধীয় (Functional) অসুখ ।

পৃষ্ঠদেশ । পৃষ্ঠদেশে অববরত কনকনানি বাহা কুঁচ্কির সন্ধি এবং শুষ্কদ্বারের উপরিভাগের সন্ধি পর্য্যন্তও আক্রমণ করে, চলিয়া বেড়াইলে বা মাথা হেট্ করিয়া উপড় হইয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (সিমিসিক্) ; চলিবার সময় পৃষ্ঠে যেন কোন শক্তি থাকে না ; চলিবার সময় কোমরের পশ্চাৎভাগে এবং কুঁচ্কির সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা ; ছই কঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানে কনকনানি ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন স্বক্কাহিতে (চেলিডন্),

এবং বৃকের ডাইন পার্শ্বে বেদনা, নিখাস টানিবার সমস্ত বাহ্যিক বৃদ্ধিহীন (ব্রাই);  
পা অত্যন্ত দুর্বল, বাহ্যিক মরুণ (ক্রীলোক) রোগীর চলিবার শক্তি থাকে না।

**ব্যবহার।** সর্দি; যকৃতের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; কোষ্ঠবদ্ধ;  
অজীর্ণ; পাকস্থলীতে বেদনা বা ষাতিনা; গুহ্বদ্বার বাহির হইয়া পড়া  
(Prolapsus Ani); অর্শরোগ; শ্বেত প্রদর ইত্যাদি অন্ত্রের ইন্ফুলাস্ হিপো-  
কাঠেনাম্ ব্যবহার্য্য। গুহ্ব এবং গুহ্ব দ্বারে অনবরত জ্বালা, টাটানি, চড়-  
চড়ানি, অজীর্ণ বা পেট গরম হইয়া তরল ভেদ হইলেই বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়,  
অন্তর্বলী ও বহির্বলী বিশিষ্ট বহুকালের অর্শ রোগে কলিকাতাস্থ হাইকোর্টের  
একটি উকীল মহাশয়ের চিকিৎসায় ইন্ফুলাসের ২য় দশমিক ক্রমের আরোক,  
১ কোঁটা মাত্রার প্রতি দিন ৩ মাত্রা করিয়া সেবনে এবং ইন্ফুলাসের মূল  
আরোকের ৫ কোঁটা, ২ কাঁচা ওলিভ অয়েল মিশাইয়া মল ত্যাগের পূর্বে  
এবং পরে গুহ্বদ্বারে লাগাইয়া, ২ সপ্তাহ কাল মধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া  
গিয়াছে। এমন কি এইক্ষেণে তাঁহার অর্শরোগ আছে কি না রোগী তাহা  
কিছুই টের পান না।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।** বাহ, পা এবং মেৰুদেশে পক্ষাঘাতের  
জ্বর অবশ্যবোধ; সর্বদা শরীরে অবসন্ন এবং শ্রান্তিবোধ (আলাম, চার্নন,  
সাল্ফ); অনবরত হাই তোলা এবং গা ভাঙ্গার ইচ্ছা বা স্বভাব; অতি-  
রিক্ত পরিমাণে রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে সমুদ্র যন্ত্রে একরূপ অস্থিত হয়;  
শৈল্পিক বিল্লীতে শুকানুভব এবং উহার ক্ষতি; অর্শরোগ এবং উহার দরুণ  
গুহ্বদ্বার এবং গুহ্ব অনবরত জ্বালা, টাটানি, চড়চড়ানি, তরল ভেদ হইলেই  
বাহ্যিক বৃদ্ধি হয়; পাকস্থলীর অন্ত্র, পিত্তাধিক্য এবং শৈল্পিক ধাতুর পক্ষে  
বিশেষ উপকারী; প্রাতঃকালে, নড়াচড়াতে, চলিলে, দীর্ঘনিখাস প্রস্থানে,  
আহারের পর, গিলিবার সমস্ত অন্ত্রের বৃদ্ধি ইত্যাদি ইন্ফুলাস্ হিপো-  
কাঠেনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ।** ইন্ফুলাস্ হিপোকাঠেনামের কার্য্যের  
সঙ্গে ইন্ফুলাস্ মাত্রা, আর্সিনিক্, আলোজ্, ব্রাইওনিয়া, কলিমনিয়া, টগ-  
নেসিয়া, মার্কিউরিয়াস্ নাইট্রিক্ অসিড্, নাইজ্-বমিকা, পডোফিলাম্ এবং  
সাল্ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন চিকিৎসক ইহার ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । অর্শরোগে ২য় দশমিক ক্রমই লেখক সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । ইকুলাসের মূল আরোক ৫ বা ১০ ফোঁটা, ১ আউন্স, ওলিভ্ অয়েল (Olive oil) মিশাইয়া একটা কর্ক অঁটা শিলিতে ভালরূপে ঝাকিয়া মিশাইয়া অঙ্গুলীতে লইয়া মলভ্যাগের পূর্বে এবং পরে গুহ্ব দ্বারে লাগাইলে অর্শরোগ এবং অর্শরোগ সম্বলিত গুহ্ব ফাটা (Fissure in the Anus) রোগের বেদনা, বাতনা, টাটানি এবং চড়্ চড়ানির বিশেষ আশু উপশম হইতে দেখা যায় । এবিষয় পূর্বেই এই ঔষধের “ব্যবহার” নামক শীর্ষে লিখিত হইয়াছে ।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্,—ক্রুড্ আণ্টিমোনি,—

আণ্টি-ক্রুড্

(ANTIMONIUM CRUDUM,—CRUD ANTIMONY,—ANT. CRUD. )

কোন এক বিকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ক্রুড্ আণ্টিমোনি ক্রয় করিয়া বধা নিয়মে উহাতে জ্বার অব্ মিক্ মিশাইয়া ইহার ৩য় শত-তমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে বধা নিয়মে ইহার ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক হইতে বধা নিয়মে ৫ম এবং ততো-ধিক শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । সমুদয় প্লেগ্মিক বিল্লী এবং চর্ম্মের উপরই ইহার কার্য অতি প্রবল ; তন্মধ্যে অগ্রেব প্লেগ্মিক বিল্লীর উপরই ইহার কার্য সর্বাধিক প্রবল, বাহ্যের দ্রুণ উক্ত প্লেগ্মিক বিল্লী বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহার শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে ; উহার প্রদাহ উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু উক্ত প্লেগ্মিক বিল্লীতে প্রচুর স্লেম্মার সঞ্চয় হয় এবং তদ্রূপ পরিণাম কার্যের ব্যাঘাত জন্মে । জিহ্বা দুইয়ের ত্রায় সাদা গাঢ় গেলপযুক্ত করা আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের একটা বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন ।। প্রলাপ বলা, নিদ্রাবেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে (শিশুর) বমনোদ্বেষ্ট, মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং লালবর্ণ, নাক্তি অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ; শরীর জ্বরের দ্বারা উষ্ণ ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করণের সময় কাঁদা, গরম জলে স্নান করাইলে কোন গোলমাল না করা ; শিশু সর্বদা থিট্ থিট্ করে এবং তাহার শরীর কেহ স্পর্শ করিলে বা তাহার পানে তাকাইলে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয় (দিনা) ; সর্বদা বিষম এবং শোকের ভাব ; বাঁচিবার অনিচ্ছা ; চক্ষুর আলোক দেখিয়া মনের মধ্যে প্রেম জনিত উল্লাসের ভাব ; সর্বদা চুপ মারিয়া থাকার ইচ্ছা এবং কথা বলিতে অনিচ্ছা ; সর্বদা পাগলের দ্বারা ব্যবহার ।

মস্তক ।। কপালে ভারিবোধ ; মাথাঘোরা ; বমনোদ্বেষ্ট (লোবিলিয়া) ; নাক দিয়া রক্ত পড়া (ব্রাই) ; সামান্য রক্তের ঘৃশ্ ঘৃশে শিরঃপীড়া এবং মাথা ঘোরা, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিলে যাহার বৃদ্ধি হয় (ক্যাঙ্ক-কার্ক) ; স্নান করার পর প্রবল শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা ও আহারে অরুচি ; মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট, এবং নাক দিয়া রক্ত পড়া ; মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং তৎপর নাক দিয়া রক্ত পড়া ; অবসন্নকারক শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষ্ট । সন্ধ্যার সময় অথবা আহার বা পানের পর যাহার বৃদ্ধি হয় ; পাকস্থলীর অন্ত্রের দক্ষণ শিরঃপীড়া ।

চক্ষু ।। চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষে চুলকানি ও রক্তিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা ; প্রাতঃকালে চক্ষে আলোক সহ হয় না (লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ (অর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, গ্রাফ্, মার্ক্, লাইকোপ্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর বহির্দেশের কোণে আগা এবং চড়্ চড়ানি ।

নাসিকা ।। নাসারন্ধ্র ক্ষত, ফাটা এবং খোসা বা চুমটী বিশিষ্ট (এই-লাস্, গ্রাফ্, ক্যালী-বাট, নাইট্রিক্-অ্যাস্, পাল্‌স্) ; ঠাণ্ডা বাতাস গেলে ষেক্রপ হয় (হাট্‌ড্রাইট্-সোরিনাম্), অথবা উগ্র ধূম টানিলে ষেক্রপ হয়, নিশ্বাস প্রবাহে নাকের মধ্যে ষেক্রপ যাতনা ; শিরঃপীড়ার পর নাক দিয়া রক্তপড়া ।

মুখমণ্ডল । ওষ্ঠের কোণে কাটা, বাহ্য ক্ষতের জ্বার বেদনামুক্ত হয় (গ্রাফ, লাইকোপ্, মার্ক, নাইটিক্-আস্); অনেক কাল ব্যাপিয়া গালে পূঁথ সংযুক্ত কুসুড়ী (গ্রাফ, মেজিরিয়াম্) ।

মুখগহ্বর । গর্ভ বিশিষ্ট দাঁতে বেদনা বা বাতনা, রাত্রিতে বাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); আহারের পর দাঁতের বেদনার বৃদ্ধি (ক্যাক্-কার্ক, ককিউ-লান্, ষ্টাকিস্, সালফ্); জিহ্বা দাঁতে লাগিলে দাঁতে বেদনার উল্লেখ হয়, বাহার দ্রবণ মনে হয় যেন দাঁতের শিরা ছিড়িয়া গিয়াছে; নিশ্বাস দ্বারা বাতাস টানিবার সময় দাঁতে হুটী বিধানের জ্বার বেদনা বা বাতনা; মুখগহ্বর শুষ্ক (এইলাহ্, আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বম্, হায়োন্, ক্যালী-বাই); মুখে প্রচুর পরিমাণে লোন্তা লাগ উঠে (সাইক্লেমেন্, মার্ক্-কর, সিলিরা, সালফ্); তালুকার ছাল উঠিয়া বাওয়ার জ্বার অমূল্য হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলা পরিষ্কার করিবার সময় প্রচুর স্লেমা নির্গত হয়; জিহ্বা লাদা লেপ যুক্ত (একন্, এইলাহ্, ব্রাই, মার্ক্, নাক্স-বম্, সালফ্); দাঁতের গোড়া দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গমন (আর্স্, মার্ক্, নাইটিক্-আস্, ফন্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । প্রবল পিপাসা এবং ওষ্ঠ শুষ্ক (একন্, আর্স্, ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উপদ্রব উঠা (কার্কো-আনিমেল্, ক্যাক্-কার্ক, চায়না, গ্রাফ, পাল্‌স্); স্লেমা এবং পিত্ত বমন; আহারে অকচি(অগ্নিকা, আর্স্, ককিউনাম্); টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট, চায়না); অতিরিক্ত খাইয়া পাকস্থলীতে বেদনা বা বাতনা এবং পাক-স্থলী ক্ষীণ ও বিস্তৃত হয় বটে, কিন্তু উহা কঠিন না হইয়া নরমই থাকে (চায়না); অজীর্ণের দ্রবণ পাকস্থলীতে খিল ধরার জ্বার বেদনা বা বাতনা (আর্স্, চায়না, নাক্স-বম্, পাল্‌স্), আহারে অকচি, বমনোদ্বেগ এবং বমনের ইচ্ছা (আর্স্, আন্টি-টার্ট, ইপিকাক্); পাকস্থলী দুর্বল, বাহার দ্রবণ সামান্য আহারাদির অনিয়মেই পেটের অমূল্য হয় (আর্স্, পাল্‌স্); পাকস্থলীর মধ্যে বৃক্ আলার জ্বার আলামুতন (আর্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা; পাক-স্থলীতে কষ্টদারক পূর্ণবোধ, বাহার দ্রবণ চাপিলে পাকস্থলী বেদনামুক্ত হয় (আর্স্, ব্রাই, লাইকোপ্, নাক্স-বম্); প্রবল বমন বাহ্য কোন উপায়েই ধামান যায় না (লোবিলিয়া ইন্ফুটা, আন্টি-টার্ট), পিত্ত এবং টেট্‌টয়া আঠা পদার্থ

বমন ; প্রবল ভেদ এবং বমন । উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং বিস্তৃত ও উহাতে অত্যন্ত গড়্‌গড়্‌, কল্‌ কল্‌ শব্দ হওয়া ; উদরেও কর্তনবৎ ভয়ানক বেদনা ; উদরে অত্যন্ত বাতনা যাহা পাকস্থলী হইতে যেন বিস্তৃত হয় একরূপ অম্লভূত হয় ; কাজ কর্ণে অনিচ্ছা ; পেট ঠোশ মারিয়া বা খামিয়া থাকা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদগার উঠা ।

মল এবং মলদ্বার । মলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন মল এবং উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাও থাকে (ক্যাক্স-কার্স, চারনা, পডোফ্‌) ; উদরানয়, টক দ্রব্য খাইলে, শরীৰ অত্যন্ত গরম হইলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে, স্নাত্তিতে এবং প্রাতঃকালে যাহার বৃদ্ধি হয় ; বুদ্ধবয়সে পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (সিমিসিফ্‌, কার্ডুয়ান্‌, নেট্রাম্-আস্‌, নাক্স-বম্‌, পডোফ্‌) ; মল কঠিন বাহ্য অতি কষ্টে নির্গত হয় ; মল অত্যন্ত মোটা, লম্বা নেড় (ব্রাই) ; শৈশ্বিক অর্শরোগ ; গুল্মার দিয়া অনবরত স্বেদা নিঃসরণ ; অর্শের বলি দিয়া রক্ত পড়া ; মনে হয় যেন অনেকগুলি মল নির্গত হইবে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত না হইয়া কেবল দূষিত বায়ু নির্গত হয় এবং অবশেষে কঠিন মল নির্গত হয় ; মলবৎ তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে কর্তনবৎ বেদনা ; মলত্যাগের সময় মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা অথবা ক্ষত কাটরা গেলে যে-রূপ হয়, গুল্ম দ্বারে সেরূপ জ্বালা বা চড়্‌চড়ানি ; গুল্ম দ্বারে চুলকানি (নাক্স-বম্‌, নালিসি, সিগিয়া, সাল্ক্‌) ।

শ্বাসযন্ত্র । শরীর অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া স্বরভঙ্গ বা স্বর শূন্যতা (কার্কো-বেজ্‌, কঠে, ফস্‌), বিশ্রামে বাহ্য উপশম হয় ; স্বরের দুর্বলতা ; কর্তনালী এবং আহার বহা গলনালীর মধ্যে প্রবল আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার জ্বালা জ্বালা বা টাটানি ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই কাশি, থাকিয়া থাকিয়া বাহ্য উজ্জেক হয়, কাশি যেন উদরের মধ্য হইতে উৎপন্ন বা আরম্ভ হয় ; কাশির প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল এবং ক্রমেই কাশির আক্রমণ কমিয়া আসিয়া শেষ আক্রমণ গলা খুন্‌ খুণ্‌ব দ্বার অম্লভূত হয় ; বৃকে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উকাহুভব ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে ক্ষুদ্র সন্ধিবাহের জ্বালা বেদনা ; আঙ্গুলের নখ পূর্বের জ্বালা বড় হয় না এবং

নখের নিচের চর্ম অত্যন্ত বেদনাসূক্ হয়; চাপা প্রাপ্ত নখ আবদ্ধ আবদ্ধ হয় এবং উহার স্থানে স্থানে আঁচিলের জ্বর খোঁচা দেখিতে পাওয়া যায় । পায়ে বাতের বেদনা; শরন কবিশা বা বসিয়া থাকিলে পায় অবশবোধ; পায়ের তলার স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ আঙ্গুলের নিকটবর্তী স্থানে, খোঁচার জ্বর কড়া (Corn) পড়ে; চলিবার সময় পায়ের পাতা ঠাটায় বা বেদনাসূক্ হয় (আলাম্) ।

নিদ্রা । দিনের বেলা ঘুমের ইচ্ছা বা ক্রিয়ান, পূর্বাঙ্কেই বাহার অধিক উদ্রেক হয় ।

চর্ম । গায় কোড়া এবং কোঙ্কাব জ্বর ফুস্ফুড়ী; শরীরের স্থানে স্থানে খোঁচাব জ্বর কঠিন ফুস্ফুড়ী; গায় কোমল আঁচিল (Soft warts); পোকায় কামড়াইলে ঘেরূপ হন, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ ত্রণ বা কোঙ্কাব জ্বর ফুস্ফুড়ী (এপিস্, আর্গিকা, লেডাম্); গায়ে হামের জ্বর ফুস্ফুড়ী (কফিয়া, পাল্‌স্) ।

জ্বর । বমন বা বমনোদ্বগ হইয়া জ্বর আরম্ভ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা, বিমর্ষতা এবং শোকের ভাব । অত্যন্ত শীত এবং শীতলাবস্থায় পিপাসা না থাকে; বেলা ছুই প্রহর বা অপরাহ্ণে জ্বর আইসে; পালজ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ইচ্ছা এবং পিপাসা না থাকে; রাত্রিতে শরীর উষ্ণ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই ঘর্ম্ হওয়া; নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে (আস্, ডিজিট্, লরোস্, মার্ক্); উষ্ণ বরেও অত্যন্ত শীত বোধ; জ্বরের সময় অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বগ (ইপিকাক্, পাল্‌স্, নাক্স-বম্); ক্ষুধা এবং রুচি থাকে না এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ, বমন এবং মুখে তিক্ত স্বাদ (ইপিকাক্), পাকস্থলীতে চাপা বোধ এবং উহাতে কনিয়া ধরা, উদবহ্ন আহার জ্বরের স্বাদ বিশিষ্ট উল্গার উঠা; অস্ত্রে বেদনা এবং উহাব সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় বা কোষ্ঠবদ্ধ ও আহারে অরুচি; টক দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা; আহার বা পানে একবারে বিরক্তি এবং ঘর্ম্; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত; জ্বরের কোন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে না ।

বাবহার । শ্রৈষ্টিক ঝিল্লীর অস্থখ; আমাশয়, যাহাতে জ্বর থাকে না; জ্বর সম্বলিত নাসিকা, বায়ুনল, পাকস্থলী এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় শ্রৈষ্টিক রোগ;

অজীর্ণ ; উদরাময় ; কোষ্ঠ বদ্ধ ; কোন কোন প্রকারের কোষ্ঠার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ বা কুস্কুড়ী ; বসন্ত রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কুটুর্কট করা বা চুলকানি ; মুখমণ্ডল, কণ, নাসিকা এবং গালে বিকচ (Eczema) ; কড়া (Corns) এবং আঁচিল (Warts); শিশুগণের পুরাতন আকারের চক্ষু প্রদাহ; হৃপিং কক ; পালা জ্বর ইত্যাদি অস্থখে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ব্যবহার্য্য ।

িশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । উষ্ণ ঘবে অস্থখের বৃদ্ধি ; দুৰ্ব্বলতা বা অবনয়তা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিতে ঘৰ্ম্ম, নিদ্রাবল্যা, বমনোদ্বেষণ এবং বমন ; স্থায়ী উত্তাপ একবারেই সহ্য হয় না ; ঘর্ষের পর শরীর পুনরায় উষ্ণ হয় ; শীত শীত মোটা হওয়া বাতু ; শিশু ও বৃদ্ধবয়সের অস্থখ ; ঠাণ্ডা লাগিয়া অস্থখ ; ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া অস্থখ ; লক্ষণাদি একবার দূরীভূত হইয়া পুনরায় প্রকাশ পাইলে পূর্বের আকার ধারণ করে না ; প্রাতঃ কালে, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে, আহারের পর, মদ্যপানে (গ্লোনরেন), স্নানের পর, নড়াচড়াতে, স্থায়ী উত্তাপে (বেল্) এবং স্পর্শনে অস্থখের বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও বহির্কীয়ুতে অস্থখের উপশম ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের কার্য্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ নিউরিয়টিকাম্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, পিট্রোলিয়াম্ এবং পাল্‌সেটিলার কার্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে উহার কার্য্যের সঙ্গে এপিস্, আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্, ক্যামোমিল, ককিরা, প্রোফাইটিস্, হিপার সাল্‌ফিউরিস্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স বমিকা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । হিপার সাল্‌ফিউরিস্, মার্কিউরিয়াস্, পাল্‌সেটিলি ইত্যাদি আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় ক্রমের শুঁড়া এবং ৬, ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ৬ষ্ঠ ক্রমের আরো কই লেখক সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।



## এপিস্ মেলিফিকা,—এপিস্ ।

(APIS MELLIFICA,—APIS)

জীবাণীকরণ মধু মাছি যখন রাগান্বিত হইয়া কামড়াইতে যায়, তখন উহার ছল হইতে যে বিষ নির্গত হয় উক্ত বিষ দ্বারা ডাইলুট্ স্পিরিটে (Dilute Spirit) যথা নিয়মে ইহার মূল আয়োক প্রস্তুত হইয়া থাকে । প্রথম দশমিক ক্রম ডাইলুট্ স্পিরিট্, ১ম শতভাগিক বা ২য় দশমিক ক্রম ডাইলুট্-স্পিরিট্ এবং ৩য় দশমিক ক্রম ২০° ডিগ্রী ওভারপ্রুফ্ স্পিরিটে (20° Over-proof Spirit) এবং ৪র্থ ও ততোধিক ক্রম যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । শরীরের কোষিক অংশের (Cellular tissues) উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ চর্ম্ম এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ শোথ (Acute oedema) হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা চর্ম্ম আমবাতের (Urticaria) ভায় ফুস্ফুড়ী এবং শ্লেষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হইয়া সামান্তরূপে প্রদাহযুক্ত হয় । স্নায়ু ঝিল্লীর (Serous Membranes) উপরও ইহার কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দরুণ মস্তিষ্কের শোথ, বক্ষ শোথ, উদরী (Ascites) ইত্যাদি স্নায়ু ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । জীলোকের অরাম এবং ডিম্বকোষের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত বস্তু উত্তেজিত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং সামান্য আকারের প্রদাহ ও উহার শোথ হইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অচেতনতা (বেন্, হায়েস্, ওপিয়াম্) ; অজ্ঞানবৎ ঘুম বাহা সময়ে সময়ে চীৎকার লক্ষ্যে ভাবিয়া যায় ; অজ্ঞমনকতা (অনাকার্ড্, নাক্স-মক্, নেজা, ফস্-আস্) ; অত্যন্ত বিশ্রী চাল বা বিশ্রী কাজ করার স্বভাব ; হাত হইতে জব্যাদি ফেলিয়া দেওয়া এবং ভাবিয়া ফেলার স্বভাব ; সর্ব্বদা কার্যে ব্যস্ত থাকা ; অস্থিরতা ; বারবার এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে নিবৃত্ত হওয়া ; সর্ব্বদা কাঁদার স্বভাব, কোন মতেই কাঁদা নিবারণ করা যায় না (ইথের্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মক্, পাল্‌স্) ; কোন বিষয়েই মন যায়

না (কস্, কস্-আস্); সর্বদা থিট্ থিট্ করা (ব্রাই, ক্যাম্. নাক্স. বস্); সে অমুক দিন মবিবে রোগী এরূপ বসে (একন্); আরক্ত জরের ফুসুড়ী গায় বদিয়া বাইয়া প্রলাপ; জ্বীলোকের অন্তের বিষয়ে হিংসা করা (হারোস্, লাক্); পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা পরিতুষ্ট না হওয়ার দক্ষণ উন্নততা ।

মস্তক । মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিরঃস্রাব ও বম-  
নোষণ; মাথায় গোলমলে বোধ এবং মাথা ঝিম ঝিম করা ও উহার  
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিভাগ এবং উহার চতুর্দিকবর্তী স্থানে অনবরত চাপিয়া  
ধরার স্তায় বেদনা বা বাতনা, হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে বাহার কতক উপশম  
হয়; সমুদয় মাথায় ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বাহার উপশম হয়;  
মস্তিষ্ক যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কপাল এবং কপালের  
ছুই পার্শ্বে চাপিয়া ধরার স্তায় বেদনা, বস। অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে এবং উক  
বিছানায় শয়ন করিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং চাপিলে বাহার উপশম হয়  
(পাল্‌স্); মাথার পশ্চাত্তাগে বেদনা বা বাতনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে, মধ্যে  
মধ্যে, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠা; (শিশু বা বালক নালিকা)  
নিশ্চেষ্ট এবং অচলভাবে থাকে; প্রলাপ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাদিয়া  
উঠা; চক্ষু টেরা করিয়া তাকান; দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; মাথা  
বালিশের মধ্যে খুসিয়া দেওয়া (হেলিবোরাস্); শরীরের এক পার্শ্বের স্পন্দন  
এবং অপর পার্শ্বের পক্ষাঘাত; ঘর্শ্বে মাথা ভিজিয়া যায়; মূত্র দুর্গন্ধবৃত্ত এবং  
পরিমাণে অল্প; মাথা স্কীত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়; মাথার চর্ম বেন  
স্কীত এবং শক্ত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ।

চক্ষু । চক্ষে আলায়ুক্ত, হল কুটান বা খোঁচা বিঁধার স্তায় বেদনা  
বা বাতনা; চক্ষুর পাতা স্কীত, লালবর্ণ এবং উহাতে শোথ (আস্, কস্);  
চক্ষুর উপরের পাতা বেন একটা থলিয়ার স্তায় চক্ষুর উপর স্থলিয়া পড়িয়াছে  
এরূপ অনুভূত হয় (কানী-কার্ক); চক্ষুর যোজক ঝিল্লী লালবর্ণ এবং  
কালচে শিরা দ্বারা পরিপূর্ণ; চক্ষু প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার যোজক ঝিল্লীর  
স্থানে স্থানে সিরাম্ (Serum) নামক কেনবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া কর্ণিয়ার  
(Cornea) স্বচ্ছতা নাশ করে (Chemosis), কর্ণিয়া পুঙ্ক হয় এবং উহার

হানে হানে কালচে ধূমের জায় দাগ পড়ে ; কর্ণিরায় ধূমের বা ধূমের জায় অবচ্ছতা ; চক্ষু প্রমাহ এবং ভদ্রকণ আলোক নহ্ন না হওয়া এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া (একন্, আন্, বেল, ইউক্রেস্, মার্ক) ; টেরাচক্ষু (হারোন্) ।

কর্ণ । উভয় কানই ক্ষীত এবং লালবর্ণ হয় (একন্, বেল, পাল্‌ন্) ।

নাসিকা । নাক ক্ষীত, লাল বর্ণ এবং শোথের জায় ক্ষীত (রাস্-টক্স) ; নাসারন্ধ্রে ত্রণ, ঠাণ্ডাতে বাহার উপশম হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখ মণ্ডলের শোথের জায় ক্ষীতি (আন্) এবং উহা মোমের জায় শিটা বা ফিকা ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ, উষ্ণ এবং ক্ষীত (বেল) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে জ্বালাযুক্ত ও ছুরীবিধানের জায় বেদনা বা ব্যতনা (আন্) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । ওষ্ঠের শোথ ; উপরের ওষ্ঠ ক্ষীত (হিপ্-পাল্‌ফ), উষ্ণ এবং লালবর্ণ (বেল) ; মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং গলার মধ্য শুষ্ক (নাক্স-মক্) ; গল গহ্বর আঙনের জায় লালবর্ণ এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা ও টাটানি (বেল) ; জিহ্বার ধার দিয়া আগা গোড়া চড়্‌চড়ানি এবং উহাতে জ্বালা ও হল ফুটানের জায় বেদনামুক্ত ফোঙ্কার জায় কুসুড়ী ; মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে জ্বালা এবং চড়্‌চড়ানি (মার্ক্-কর) ; জিহ্বা ক্ষীত, শুষ্ক এবং ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, অথবা ফোঙ্কার জায় কুসুড়ী দ্বারা আবৃত (আন্, রাস্-টক্স, ব্যাপ্ট) ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় মাড়ি টল্‌টলে হয় এবং উহাতে জল আছে একপ্র লেখার ; শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে কাঁদিয়া উঠে ; শরীরের হানে হানে লাল দাগ দৃষ্ট হয় । গলার মধ্য শুষ্ক, অগচ পিপাসা থাকে না (নাক্স-মক্, পাল্‌ন্) ; গলার মধ্যে জ্বালা এবং হল ফুটানের জায় ব্যতনা অস্বভূত হয় (একন্, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স) ; গলার মধ্য এবং উহার বহির্দেশে ক্ষীত ; শরভ্র এবং গলার মধ্যে সংকোচন বোধ ও গিলিতে বা নিশ্বাস গ্রহণে কষ্টান্বিত ; টনসিল্ (Tonsils) লালবর্ণ এবং প্রবল প্রদাহযুক্ত (একন্, বেল, ক্যাপ্স) ; টনসিল্ এবং তালুকার ক্ষত (এইলাহ্, মার্ক্-আয়োড) ; ডিপথিরিয়া এবং উহার দরুণ কৃত্রিম পর্দা একবারে মলিন ধূসরের আঁঠায়ুক্ত আকার ধারণ করে (ক্যালো-ব্রাই) ; গলার উপর কোন প্রকারের চাপ বা স্পর্শন একবারেই সহ্য হয় না (ল্যাক) ।

পাকস্থলী এবং উদর । শরীর উষ্ণ, অথচ শিথাগা থাকে না (পাল্‌স্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত আগাযুক্ত গরম বোধ (আর্স্); স্পর্শনে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ব্রাই); বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামর (হীলিকাঙ্ক্) এবং পাকস্থলীর প্রবাহ । স্পর্শ করিলে অস্ত্র এবং উদর প্রাচীরে অত্যন্ত টাটানি, হাঁচি দিলে বা উহার উপর চাপ দিলে বাহ্য অস্থিত হয় (বেল্, ব্রাই, নাক্স-বন্); উদর যেন পূর্ণ এবং স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়াছে এক্ষণ অস্থিত হয় (চায়না); পাক্‌বার হাড়ের নীচ হইতে উর্দ্ধদিকে যেন বেদনাদি বিস্তৃত হয়; তলপেটের পার্শ্ব হইতে, বেদনা বা বাতনা আরম্ভ হইয়া উপর দিকে বিস্তৃত হয় ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক দ্বারে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ভ্রায় চক্ষু-চড়ানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরামর; মলত্যাগের পূর্বে শুষ্ক দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণ; প্রচুর পরিমাণে কালচে কটাবর্ণ, সবুজ অথবা সাদাটিয়া তরলভেদ; হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরলভেদ; সবুজের আভাযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণের স্লেষ্মা ভেদ (পাল্‌স্, মাক্, সাল্‌ফ্); মল নরম এবং খোলাটিয়া এবং দিরাব মিশ্রিত; হরিদ্রাবর্ণের তরল ভেদ; অত্যন্ত বার নড়া চড়াতেই মল নির্গত হয়, বাহ্যর দক্ষণ মনে হয় যেন শুষ্কদ্বার অনবরতই খোলা রহিয়াছে; রক্তভেদ এবং অস্ত্রের মধ্যে আগাযুক্ত বেদনা বা বাতনা ও শুষ্ক দ্বারে ছাল উঠা এবং অনবরত কষ্ট দায়ক কোঁপ পাড়া বা বাহ্যের বেগ; অর্শরোগ এবং তক্ষণ শুষ্কদ্বারে চল ফুটানের ভ্রায় বাতনা (আর্স্, নাইটি-ক্-আর্স্, সাল্‌ফ্); শুষ্ক বাহির হইয়া পড়া (ক্যাঙ্ক্-কার্ক্, ফেরাম্, মিউর-আর্স্, পডোফ্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র ত্যাগের সময় মূত্র নালীতে কত হওয়ার ভ্রায় জ্বালা-হুতব (ক্যানাবিস্-সার্ট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে কএক কোঁটা বাস্তব মূত্র নির্গত হয় (একন্, ক্যাঙ্ক্); মূত্র লালবর্ণ এবং পরিমাণে অল্প (একন্); মূত্রাবরোধ (একন্, হায়োস্, ষ্ট্রামন্); বারম্বার প্রচুর মূত্র ত্যাগ (আপোসাইনাম্, আজেন্টি-মেট্); মূত্রনালীতে জ্বালা এবং চল ফুটানের ভ্রায় বাতনা অস্থিত হয়; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন, রাত্রিতে এবং হাঁচি বা কাশিবার সময়ই বাহ্য অধিক হয় (কষ্ট্, পাল্‌স্, বিরেট্-আব্) ।

জননেন্দ্রিয় । 'গুরুষের অণ্ডকোষ প্রদাহ (একন্, মাক্) এবং অণ্ডকোষাধারের শোথ বা পোতা ভারি হওয়া (Hydrocele) । ক্রীলোকের ডাইন ডিম্বকোষের প্রদাহ, কঠিনতা, ক্ষীতি এবং শোথ ও উহার কৰ্ত্তন-বৎ বা হল ফুটানের ভায় প্রথব বেদনা (বেল্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাম স্তন ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং কাশি ; জরায়ু এবং ডিম্বকোষ প্রদেশে আলায়ুক্ত বা হল ফুটানের ভায় বেদনা বা যাতনা ; রজঃস্রাবের সময় ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা এবং টনটনানি ; ক্ষীত ডিম্বকোষে কৰ্ত্তনবৎ, হল ফুটানের ন্যায় প্রথব বেদনা, রজঃ-স্রাবের সময় যাহার বৃদ্ধি হয় ; রজঃরোধ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ ; ডাইন ডিম্বকোষ এবং জরায়ুর শোথ ; গৰ্ভ সঞ্চারের অন্তকাল পরই গৰ্ভস্রাব ।

শ্বাসযন্ত্র । বক্ষাহির ঠিক উপরিভাগের উত্তেজনার দরুণ কাশির উল্লেখ হয় ; থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে বেক্রপ হয়, বৃক্ক সেক্রপ বেদনা (অর্গিকা, চায়না, সাইলিসি) ; স্বরভঙ্গ, প্রোতঃকালেই যাহা অধিক হয় (কষ্ট, আয়োড্, ফস) ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, কষ্টকর এবং আক্কে-লিক, শয়ন করিয়া থাকিলেই যাহার বৃদ্ধি হয় ; শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, যাহার দরুণ গলায় কাপড়াদি রাখিতে পারা যায় না (ল্যাক) ; বৃক্কের বাম পার্শ্বে, বক্ষাহির অতি নিকটবর্তী স্থানে, ঘুশ্-ঘুশে, কন্কনিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের মধ্যে পূর্ণবোধ ও হাঁপানি বা শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হওয়া ; বৃক্কের সম্মুখ ভাগের সমুদয় অংশেই আলায়ুক্ত বা হল ফুটানের ভায় বেদনা ; ঘুম ভাঙিলেই কাশির উল্লেখ হয় (ল্যাক) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । হাতের শোথ ; হাত নীলের আভাযুক্ত এবং শীতল হওয়ার রতাব বিশিষ্ট ; হাতের আঙ্গুল, প্রধানতঃ আঙ্গুলের মাধ্যম নখের গোড়ার প্রদাহ ; নখকোণী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে আলা, হলফুটানের ভায় বা দপ্-দপিয়া বেদনা, যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় । পা শীতল (আন্ত্রা, নাস্-বম্, সাইলিসি) ; পায়ের পাতা এবং আঙ্গুল যেন স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয় ; পায়ের পাতা, পায়ের পাতার সন্ধি এবং পা ক্ষীত ও শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায়

না ; পা এবং পায়ের পাতা মোমের জায় শীত (আর্স) ; পায়ের আঙ্গুলে জালাযুক্ত এবং উহা লালবর্ণ হয় (আগা-রিকাশ) ; পায়ের পাতা শীতল ।

**চর্ম ।** চর্ম সচরাচর সাদা, প্রায় স্বচ্ছ (ডিম্বকোষের শোথে) ; চর্ম হুলস্থুটান, কুট্ কুট্ কবা, চিড়িক বাবা, জালা এবং চুলকানির জায় অচ্যুত হয় ; আক্রান্ত স্থান সামান্য স্পর্শেই বেদনান্বিত হয় বা টাটায় ; গোঁমাছি অথবা অন্য কোন পোকাকব কানড়িলিখে যেকোন ভর, গায় সেক্রপ আমবাত (Urticaria) ; ঘাত বাঁটে অত্যন্ত চুলকায় (আর্টি-কুড্, আণিকা, লেডাম) ; সমুদয় শরীরে আমবাতের জায় ফুসুড়ী বাহির হয় (একন্. পাল্‌ম্) ; চর্ম শুক এবং বিদর্পের জায় শীত ও লালবর্ণ ; চাবুক বা বেত মারিলে যেকোন ভর, শরীরেই হান হানে উন্নত সাদা বেখান জায় সেক্রপ লাগ বা রেখা পড়ে ; হুঁইরণ বা পৃষ্ঠঘাত (Carbuncle) এবং উহাতে হুল-স্থুটানের জায় বা জালাযুক্ত বেদনা (আর্স) ; গায় অত্যন্ত গাঢ় লাল ফুসুড়ী প্রকাশ পায় (বেল) ।

**নিদ্রা ।** ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ (আর্টি-টার্ট্, নাল্-মক্) ; ঘুমেরঘোরে চীৎকার করিয়া হঠাৎ কানিয়া উঠা বা হঠাৎ চমকিয়া উঠা (বেল, ট্রান্স) ; শত্রি শেষ হওয়ার সময় ঘুম ।

**জ্বর ।** সবিস্ময় বা গালাজব ; অপবাক ও তার সময় শীতকম্প বাহা উদ্ভাপে, সামান্য নড়াচড়াতে গুঁচি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল ও হাতে উষ্ণায়ুত্ব ; শীত শরীরের উষ্ণাংশ হঠাতে পৃষ্ঠদেশ দিয়া নিম্নদিকে বিস্তৃত হয় ; সময় সময় শরীর আগ্রনের জায় গরম হয়, নতুবা শরীরের কোন কোন অংশ ক্রমে শীতল হয় এবং কোন কোন অংশ ক্রমে গরম হয় ; শরীর শুক এবং ঠিক, নতুবা শরীর পর্যায়ক্রমে শুষ্ক এবং আর্দ্র হয় ; উষ্ণাবস্থায় অধিক বা অল্প পরিমাণে শিরশ্চৈদ্য এবং সচরাচর উষ্ণাবস্থায় ক্রমেগত ঘোর নিদ্রা ; হয় চর্ম একবারেই হয় না, নতুবা সামান্য ঘর্ম হয় ; ক্রমেগত বিকারের লক্ষণসমূহ শূন্য শূন্য হয়, কিন্তু পিপাসা থাকে না ; অপবাক ও তার সময় জ্বরের কৃষ্ণ এবং তখন প্রায়ই বোজা নিদ্রাবস্থায় থাকে ; ঘর্মাবস্থায় পিপাসা থাকে না ; উষ্ণাবস্থায় পিপাসা থাকিলেও থাকিলে পারে, বা

পিপাদা না থাকিতেও পারে ; শীতলাবস্থা প্রায়ই পিপাদা থাকে ; জ্বরের সম্পূর্ণ বিবাকের সময় বানপাক্ষের খাট পাক্ষরাবহাভের নীচে বেদনা ; পায়ের পাতা ক্ষীণ ; মূত্র পরিমাণে অল্প ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং উহার সন্ধিতে টাটানি বা বেদনা ; শবীর কম্পন ও মূচ্ছার পৰ্য্যন্ত এবং তৎপর গায় আন-বাত ( Urticaria ) প্রকাশ পায় ।

ব্যবহার । কীটাদি বহুদুটান, অ্যাংগোডিন, কোইনাইন, টার্পিন্ তৈল, ক্যাস্টোরাইডিস্ ইত্যাদি ঔষধের অপব্যবহার জনিত অম্লথ ; চর্ম্ম এবং শৈল্পিক কিলার প্রবল উৎকণ্ণ শোথ ; ডষ্ট্র ব্রন বা গুষ্টাবাত (Charbrucle) ; দিসপ ; আঘাত ; হাম-জ্ব ; আবক্ত-জ্ব ; ডিপ্ণিরিয়া ; মস্তিষ্কের আবরক পর্দার প্রদাহ (Meningitis) ; মস্তিষ্কের শোথ ; শ্বক্শোথ ; উদরী ; মূত্রাশয় প্রদাহ ; মূত্রাশয়ে অশক্তি বা অনাড়োমুত্যাগ ; মূত্র ক্লষ্ণ ; ডিম্বকোষ এবং জরায়ুতে উত্তেজনা, বক্তাপিকা বা রক্তানবোধ এবং উহার শোথ ; জর বিকার ; সবিরাম বা পালাজ্বর ; নখক্ষোণী ; ক্ষত ইত্যাদি অম্লথে এপিস্ মেলিফিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । নোনাহিত কামড়াইলে বেক্রপ হয়, আক্রান্ত স্থানে সেক্রপ বেদনা বা না হনা ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় বা টাটার (একন, অগারিকাশ্বেল, লাই) ; আক্রান্ত স্থানে জালা যুক্ত, হলফুটানেব ত্রায় বেদনা বা যাতনা ; সর্কাসে অলসবোধ এবং কম্পন ; গণ্ডমাণা ধাতু ; বালক বালিকার অম্লথ, জ্বালোক, বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোকের অম্লথ ; প্রাতঃকালে (উদরানন), উত্তাপে, প্রধানতঃ উষ্ণঘরে, অম্লথের বৃদ্ধি এবং তদ্বৎ ঠাণ্ডা বাতাবে থাকিব ইচ্ছা ; ঠাণ্ডাজলে বেদনা জালা এবং ক্ষীতির হ্রাস ; প্রচাপনে মাথা দগার উপনয় হয় (আর্জেট্-নাইট্রিক্, পাল্‌স্) ইত্যাদি এপিস্ মেলিফিকা দাব্যতত প্রায় বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । মূত্র ক্লষ্ণের উপর এপিসের কার্য্য অনেকটা ক্যাস্টোরিস্ ও টিরিবিথনার ত্রাব এবং প্রাতঃকালীয় উদরানয় ও কঠনালীৰ অম্লথে ইহার কার্য্য ক্রমেণ্ডব ত্রাব, চর্জের উপর ইহার কার্য্য আনাকাডিয়াম্, বেলাডোনা, ক্রেটিন্, রাস্ টগ্ণ্ এবং আর্টিকার ত্রায় ;

মাস্ক কিল্লীর (Serous Membranes) উপর ইহার কার্য। আপোনাইনাম্, মার্কিউরিয়াম্ কেরোসাইবাম্ এবং ব্রাইওনিয়ার ত্রায়। সমুদয় বিষয়ে এপিসের কার্য প্রায় আর্সিনিকের ত্রায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে এপিসের কার্যের সঙ্গে আর্বিকা, ইউফ্রেসিয়া, ল্যাকেসিস, নেটাম্ মিউরিয়াটিকাম্, লেডাম্, পাল্‌সেটিকা, ফক্ষরাস্, মাল্‌ফাবের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ল্যাকেসিস এপিসের প্রতিষেধক ঔষধ। অধিক মাত্রায় এপিস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে লবণ, জলপাইসের বা মিটা টৈল, পের্মাইজ ব্যবস্থা।

ডাইলুশন বিচার। ৩৭ এবং ৬৬ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শোধে ৩৭ ডাঃ উপকারী। চর্মরোগে ৩, ৬ এবং ১২ ডাঃ ব্যবহার্য। মূত্রবায়ের অসুখে ৬৬ ক্রম অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহার করা উচিত নহে। চক্ষু বোগে ৩০ ক্রম বিশেষ উপকারী বলিয়া অনেক চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছেন। লেখক উক্ত রোগে ৬৬ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই ব্যর্থতা ফল পাইয়া থাকেন। শোধে ২য় এবং ৩য় ক্রম ব্যবহার করিয়াই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

## আর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্-নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বার্, — লুনার কণ্টিক্, — আর্জেন্ট-নাইট্ ।

(ARGENTUM NITRICUM.—NITRATE OF SILVER;—  
LUNAR CAUSTIC,—ARGENT-NIT.)

কোন এক বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে লুনার কণ্টিক্ ক্রয় করিয়া উহা ১ ভাগ, ৯ ভাগ চূরানজলে বিশাটয়া ইহার আদত আরোক প্রস্তুত করিতে হয়। যথানিয়মে চূরান জলে ১ম হইতে ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শতভাগিক ক্রম ডাউলুট্ স্পিরিটে এবং ৫ম এবং ততোধিক ক্রম যথা নিয়মে সেক্‌টিকাউড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই ঔষধ চর্মরোগে বহুবার বিশেষতঃ রোগ উচিত। স্তন্যাব অবস্থিক



সহিত মিশাইয়া ইহার খুঁড়াও প্রস্তুত হইতে পারে । কিন্তু ব্রিটিশ্ হোমিও-  
প্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে এই প্রকার প্রস্তুত করা আর্জেণ্টাম্ ব্যবহার  
নিষিদ্ধ, কারণ, এই প্রকারে প্রস্তুত করা আর্জেণ্টাম্ ঔষধের সম্পূর্ণ গুণ  
থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** রক্তের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহার  
দ্রবণ রক্ত তরল এবং মলিন বা কাল্‌ডে হয়, রক্তের লাল কণার রক্ত কারক  
পদার্থেব অনেক হ্রাস হয় এবং রক্ত বহা নালীতে যথোচিত রূপে রক্ত  
সঞ্চালিত না হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত থাকার দ্রবণ পরিপোষণ কার্যের ব্যাঘাত  
জন্মে । এই প্রকার পরিপোষণ কার্যের ব্যাঘাতের দ্রবণ অস্থি এবং  
উহার আববক কঠিন পদা (Periosteum) আক্রান্ত হয়, শৈল্পিক কিল্লী  
আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং অনগ্ণেবে ইহা এবং পেশীর অপকৃষ্টতা  
(Degeneration) উৎপন্ন হয় । নস্তিক এবং কসেরকা মজ্জাও ইহা দ্বারা  
আক্রান্ত হইয়া থাকে, বাহার দ্রবণ উক্ত ঔষধেব নানা প্রকার রোগের  
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** স্মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড, ক্রিয়াজ্, ল্যাক্,  
মার্ক্, নেট্রাম্-মিউর, নাক্স-মস্, ফস্ সাস্) ; যখন বাগ্ন ইচ্ছা হয় বিশেষ  
কিছু চিন্তা না করিয়া তখনই তাহা করা হয় ; তাড়াতাড়ি চলিয়া বেড়ান ;  
পাছে অকৃতকার্য হইতে হয় একপ মনে করিয়া রোগী কোন কার্যের  
উদ্যোগ করে না এবং সর্বদা নিস্তক ভাবে থাকে (অরাম্) ; চতুর্দিক  
অন্ধকার দেখা এবং উহার সঙ্গে সাক্ষ অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা ও বারম্বার  
দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, যাহা ঘরের মধ্যে দৃশ্য বন্ধ করিয়া থাকিলেই অধিক হয় ;  
উপাসনা গৃহে বা কোন প্রকাব সভাতে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন তথায়  
যাইয়া উদরাময় হইবে ; কথা বলিতে বলিতে যেন কথা আট্‌কইয়া আইসে,  
যেন যথায়োগ্য কথা স্মরণ হয় না ; কোন প্রকারের কার্য করিতে অনিচ্ছা  
এবং সর্বদা নিস্তক ভাব ও আশ্রয় হত্যার ইচ্ছা ; সময় যেন কাটে না ;  
মূচ্ছার ভাব ।

**মস্তক।** মাথাঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হ্রাসতা এবং কম্পন ও তন্দ্রকণ চলিবার সময় হেলিয়া টলিয়া পড়া; শিরঃপীড়া, মাথা কসিয়া বাধিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয় (সাইলিসি) এবং বহির্বায্যতে বাহ্যার বৃদ্ধি হয়; কপালের বাম পার্শ্বের উন্নত স্থানে ছিদ্র করার জায় বেদনা (কলোস্); মাথা যেন অনেক বড় হইয়াছে একপ অল্পভূত হয় (বোরাক্স, সিনিসিক্, গ্রোনয়েন্); মস্তিষ্কের এক পার্শ্ব খনন করার জায় বেদনা বা বাতনা; মাথার অন্তান্ত কষ্টদায়ক পূর্ণ এবং ভারিবেদ, মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবাদেশের ধমনির দপ্পনপানি (বেল্); কপাল, মাথার উপরিভাগ, কপালের দুই পার্শ্ব এবং মুঃনগ্নের হাড় প্রায় অনবরত ছিদ্র করার জায় বা কঠিনবৎ বেদনা; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবেদ ও শবীরের কম্পন; মাথায় হাড় যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে একপ অল্পভূত হয়; কোন প্রকারের কীট হামা দিয়া গেল যেকপ হয়, মাথায় সেকপ স্ফু স্ফু করা বা চুলকানি (কল্, কুগ্রাম্-মেট্); চুল টানিলে যেকপ হয়, চুলের গোড়ায় সেকপ অল্পভূত হয়।

**চক্ষু।** চক্ষুপ্রদাহ এবং তন্দ্রকণ চক্ষে অত্যন্ত বেদনা যাহা উক্ যার বৃদ্ধি হয়, এবং বহির্বায্যতে যাহার উপশম হয় (পাল্‌স্); চক্ষে আলোক নষ্ট হয় না বা লাগে (একন্, বেল, টিউফেস্, গ্রাক্); চক্ষুর সম্মুখে যেন ধূসর বর্ণের দাগ এবং সাপের জায় কোন প্রাণী চিনিয়া বেড়াইতেছে একপ অল্পভূত হয়; দৃষ্টিহীনতা; চক্ষুর পাতার উপাংশ পদাহ (Ciliary Blepharitis), অগ্নির নিকট থাকিলে বাহ্যার বৃদ্ধি হয় এবং ঠাণ্ডা প্রবেশে বা ঠাণ্ডা বাতাসে বাহ্যার উপশম হয়; চক্ষুর পাতা উলটিয়া পড়ে (Ectropion), মনো মধ্যে চক্ষে ঝাপসা দেখা এবং তন্দ্রকণ রোগে অবস্থায় চক্ষু হইতে কেতুব মুছিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়; চক্ষুর যোজক ঝিল্লীর তরুণ দান্যাক প্রদাহ; চক্ষুর যোজক ঝিল্লী অত্যন্ত লাল বা গোলাপি বর্ণ বিশিষ্ট; চক্ষু হইতে প্রচুর জল, কেতুব এবং পুঁয়ের জায় পদার্থ নিঃসরণ (মাক্); চক্ষুর কোণ রক্তের জায় লালবর্ণ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণের লাল পেশীর জায় পদার্থ ক্ষীত হইয়া লাল মাংসের ডেলার জায় হইয়া থাকে; চক্ষুর নাকের নিকট

বর্তী কোণ হইতে চক্ষুর কর্ণিয়া পর্যন্ত শিরাগুলি ঝোপায় ঝোপায় লাল বর্ণ হয় (ক্যালী-আরোড্) ; চক্ষুর ক্রোণ ভয়ানক চুলকাই এবং উহাতে জ্বালা এবং চিড়িক মারে ; চক্ষুব কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea) ; শিশুগণের কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea) ; চক্ষুর পাতা হইতে পুঁয়ের জ্বালা প্রচুর ক্রমে নিঃসরণ (মার্ক্-কর) ; চক্ষুর পাতা চুমটি বা খোসা বিশিষ্ট, ক্ষীত এবং পুত ।

**কর্ণ ।** কানে কন শুনা ; কানে টন্ টন্ শব্দ হওয়া (চারনা) ; কানে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হওয়া এবং কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হওয়া ।

**নাসিকা ।** নাক দিয়া থানা থানা বক্ত মিশ্রিত সাদাটিয়া পুঁথ নির্গমন ; সর্দি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন কারক মাথা ধরা বাহা চক্ষুর উপরিভাগেই অধিক অস্বভূত হয় ও বাহ্যিক দরুণ রোগী বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; হাঁচি, শীত বোধ, চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং মুখাকৃতি রুগ্ন ; নাকের মধ্যে অত্যন্ত চুলকাই ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল রুগ্ন (আস্) ; মুখমণ্ডল বসিয়া যায়, শিটা, নীলেন আভাযুক্ত (কার্বো-বেজ্) বা সীসার জ্বালা হয় ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ, মলিন (আরোড্) এবং বয়স অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় (ওপিয়াম্) ; গালের স্থানে স্থানে চক্রাকারে লাল দাগ পড়ে ।

**মুখ গহ্বর এবং গহ্বার মধ্য ।** মাড়ি অত্যন্ত তল্ তল্ করে এবং উহা হইতে সহজে বক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইট্ ক্-আন্, কন্), কিন্তু উহা ক্ষীত হয় না বা উহাতে বেদনাও থাকে না, কিন্তু বেদনা অত্রভাগে লালবর্ণ (আস্) এবং বেদনাবুক্ত ও দানবক্ত - জিহ্বার মধ্য দিয়া আগাগোড়া লাগি রেখা পড়ে ; মুখে হৃগ্নক (প্রাণিকালে) এবং মুখ দিয়া জল পড়া (মার্ক্, নাইট্ ক্-আন্) ; জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা । গলার মধ্যে গাঢ় চট্ চটিয়া আঁঠা স্লেয়া লাগিয়া থাকে, বাহ্যিক দরুণ রোগী বারম্বার গলার থেকুর দিতে বাধ্য হয় ; ছান উঠিলে বা চাঁচিয়া ফেলিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ জ্বালা, টাটানি এবং চড়্ চড়ানি (আর্জেণ্ট-মেট্) ; একখানি কাঠের চৌচ লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, গিলিবার সময়

গলার মধ্যে সেকুপ অম্লভূত হয় (এইলাস্, হিপ্-সাল্‌ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্); নিখাস প্রস্থাসে এবং গ্রীবা সঞ্চালনে গলার মধ্যে ঐরূপ বেদনা বা যাতনা অম্লভূত হয়; আল্‌জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগ কাল্‌চে লালবর্ণ (এইলাস্, ব্যাপ্ট, বেল্, মিউর অ্যাস্, ফাইটোল্); মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগ এবং আহার বহা গলমাণীত উপরিভাগে জ্বালা এবং শুকানুভব (অ্যাস্); আহার বহা গলমাণীতে থাকিয়া থাকিয়া খিলধরা।

পাকস্থলী এবং উদর । চিনি বা নিষ্টদ্রব্য খাওয়ার অনিবার্য ইচ্ছা; আহারে অকচি; হয় অত্যন্ত পিপাসা, নতুবা পিপাসা একবারেই থাকে না; প্রত্যেকবার আহারের পব বারম্বার প্রবল উদগার উঠা এবং উদগার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে নানাপ্রকারের যাতনা; বাবদার কষ্টদায়ক কাঠ উদগার উঠিয়া অবশেষে উদগারে গলা দিয়া প্রবলবেগে বায়ু নির্গত হয়; প্রত্যেকবার আহারের পর, প্রধানতঃ মধ্যাহ্নে আহারের পব, বমনোদ্বেগ (কফিউলান্, মার্ক্, প্লাস্‌ম্) এবং বমন দ্বারা কাল পদার্থ উঠে; রাত্রি হুই প্রহরের সময় ঘুম ভাঙিলে মনে হয় যেন পাকস্থলীর মধ্যে কোন একটা ভাবি পদার্থ চাপিয়া রহিয়াছে, যাহার দরুণ বমনের উদ্বেগ হয়; প্রাতঃকালে বমন দ্বারা চক্-চকে শ্লেষ নির্গত হয় যাহা চিনিতে রসির ভাষ দেখায়; অপরাহ্নে বমনের ইচ্ছা, সমুদয় শরীরের তরুলতা এবং কাপনি ও মনে হয় যেন মাথা একটা ধামায মধ্যে বহিয়াছে : আহার বা বরকেব কীল্‌পী ইত্যাদি খাওয়ার পর পাকস্থলীতে বেদনা, কান্দানি এবং জ্বালাভব, যাহা একস্থানে আরম্ভ হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় ও আহারের পর যাবৎ অব্যবস্থিত হয়; পাকস্থলীর বাম পার্শ্বে চতুর্দিকের ভাবি বা ক্ষত করাব জ্বর বেদনা বা যাতনা, স্পর্শনে বা দীর্ঘ নিখাসে সত্যর বন্ধি হয়; পাকস্থলীর মধ্যে কাপনি এবং দপ্পদপানি (পাল্‌স্, মিপিফ); পাকস্থলীর মধ্যের অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষীতি এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা। উদরে ভারি, পূর্ণ এবং ভারিবেগ ও উদার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (অ্যটি-ক্লুড্, আলোজ্, চায়না) এবং তদ্রূপ অত্যন্ত উদ্বেগ বা যাতনা; উদরের মধ্য দিয়া স্তম্ভী বিধানের জ্বর বেদনা বা যাতনা, যেন বিহাভেব ধাক্কা লাগার জ্বর অম্লভূত হয়, যাহা কতকগুলি হির ভাবে থাকিয়া নড়িবার সময়ই অধিক হয়; তলপেটের হুই

পার্শ্বে বেদনা ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার ; পেটে ভূট্ ভাট্ বা গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া ; উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হেতু অজীর্ণ রোগ ।

মল এবং মলদ্বার । মল সবুজের আভাযুক্ত (আমন-মিউর), অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্লেয়া (আস্) এবং মলত্যাগের সময় (রাক্রিতে) ফেড়্ ফেড়্ করিয়া গুল্ দ্বার দিয়া দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; মল সবুজ স্লেয়া (আস্, বেল্, ইপিকাক্, পাল্‌স্, মার্ক্, সাল্‌ক্) এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে কাঠবম্বী ও স্লেয়া বমন ; অন্ন পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং উহাৰ সঙ্গে সঙ্গে রাক্রিতে উদবে দূষিত বায়ু জনিত শূল বেদনাব্ ত্রায় যাতনা ; মলে ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দার ত্রায় পদার্থ থাকে ; গুচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ ; জল খাওয়ার পরই উদরাম্ব (আস্, ক্রোটিন্, আলোজ্, কলোস্, ফেবাম্) ; সবুজ, কটাবর্ণের, রক্তনিশ্চিত দুর্গন্ধযুক্ত স্লেয়া ভেদ, রাক্রি হই প্রহরের পর যাহার বৃদ্ধি হয় এবং তলপেটে টন্‌টনানি ; গুল্ দ্বার দিয়া প্রবল শব্দে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; বোগীর (ছোট বালক বা বালিকা) চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার অন্ত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য খাইলেই উদরাম্ব হয় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র ত্যাগের সময় ও উহাৰ পর মূত্র নালীতে আলাম্বতর (একন্, ক্যাঙ্) ; ক্ষীত হইলে যেরূপ হয়, মূত্রনালী সেরূপ টন্ টন্ করে (ক্যানাবিস-স্যাট্) ; মূত্র অজ্ঞাতসারে ক্রমাগত এক ভাবে নির্গত হয় (কষ্ট্) ; মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং মূত্র সহজে ও পরিষ্কাররূপে নির্গত হয় ; তাড়াতাড়ি মূত্রের বেগ এবং প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র ত্যাগ (আপোসাইনাম্, কন্-আস্) ; একস্থানি কার্ঠের টোঁচ বিধিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মূত্রনালীর ঠিক মধ্যভাগে সেরূপ ক্ষতের ত্রায় যাতনা বা বেদনা ; মূত্র এক ধারের না পড়িয়া ছিটিয়া অনেক দূরে নির্গত হব ; অন্ন পরিমাণে কাল্‌চে হরিদ্রাবর্ণের মূত্র নির্গমন ; মূত্র কাল্‌চে লাবণ এবং উহাতে ইউরিক্ অ্যাসিডের ক্রিষ্টাল্ (Uric Acid Crystals) তলানি পড়ে ; রাক্রিতে অম্যাড়ে বা অনিচ্ছাপ্রসঙ্গ মূত্র নির্গমন ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গ ছোট হয় এবং স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা একেবারেই থাকে না (অগারিকাম্) ; কানবা টানিয়া বিস্তৃত করিলে যেরূপ হয়, স্ত্রীসহবাসের সময় মূত্র নালীতে বা উহাৰ মুখে সেরূপ বেদনা হ্রস্ব বা যাতনা ; পুরুষাঙ্গের মাথার আবরক চন্দ্রে ক্ষত এবং উহাতে মাছের তৈলের

বাতির (Tallow) জারি নানা চুমটী বা পুঁব হয়; পুরুষের খেঁচলিয়া বা ওয়ার জারি বেদনা বা বাতনা এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে ডাইন অত্যেকের বিরুদ্ধি ও কঠিনতা। জ্বীলোকের পুরুষ সহবাস করার সময় অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং পুরুষ সহবাসের পরই যোনি দ্বাৰা দধা রক্ত পড়া; অরায়ু স্থান দ্রষ্ট হয় (Prolapsus-uteri) এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু মুখ ও উঠার চতুর্পার্শ্ব বর্জী অংশে কত হাইড্রোট, অরায়ু, জিহ্বাজ, নার্ক, (মিথিয়া); অনিয়মিত রূপে বজ্রাস্রাব, অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে, না হয় অনেক পর, প্রচুর বা অল্প বজ্রাস্রাব, বক্ত বর্ষদেউ পাত কান্চ পানী থানা থাকে; স্বপ্নে পুরুষ সহবাসে পল্লিতুষ্টি হওয়া; শেষ বজ্রাস্রাব বক্ত হওয়ার সময় (Change of life) জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তাস্রাব এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে দায়বিক উত্তেজনা; ষিধবা বা মে মফল দাতী জ্বীলোকের সন্তানাদি হয় নাই, ভাণ্ডাদিগের জরায়ু হইতে উক্ত প্রকারে রক্তাস্রাব পাওয়া বোঝাকে বাবদ্যার আক্রমণ কবে এবং বাহার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার প্রদেশে বেদনা বা বাতনা, বাহা শুষ্কতারের উপরিভাগে এবং উক্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচুর পরিমাণে হস্তিয়ারবর্ণে কতকাবক স্নেহ প্রবল নিঃসরণ; গভাবস্থায় বনে হয় যেন বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ফাটিয়া যাইবে; মাথা যেন বিস্তৃত হইয়াছে একপ অল্পভূত।

শ্বাসদল্ল। কঠিনতা এবং গলার মধ্যে টাটানি বাহা প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয়; কাশির সময় বায়ুনাগের উপরিভাগে ছান উত্তিগা বা ওয়ার জারি জালা এবং চড়্চড়ানি; গাধকদের কঠিনাবীর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Laryngitis) (অর্জেক্ট-নেট্, অরায়ু, ফন); উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে বা গান করিলে কাশির উদ্বেক হয়; এক ঘরে অনেক লোক থাকিলে খান ঘেন বদ্ধ হইয়া আইসে; ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাস এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ও তদনন্ত অত্যন্ত বাতনা; শুক আফেপিক হাপানি কাশির আক্রমণ, বাহাব দরুন রোগী বাবদ্যা। এদিক ওদিক চুলিয়া নেড়াইতে বাধা হয়; অত্যন্ত উত্তেজক কাশি দ্বারা দক্ষাণ সময় এবং রাত্রিতে অত্যন্ত কষ্ট দেখ; সন্ধ্যার সময় বাশি, বাহার দরুন ভানাক পাওয়া একবারেই বন্ধ হয় না (উপশ্রম); গলা দিয়া দিকা রক্ত নিশ্বিত পুঁব নিগমন।

**হৃৎপিণ্ড ।** হৃৎপিণ্ডের কার্য অনিয়মিত এবং অসম (Irregular and intermittent) (ভিজিট, নেট্রাম্-মিউর) এবং হৃৎপ্রদেশে কঠিনায়ক পূর্ণবোধ, বাহ্যার দিকে মনগেলেই অধিক অগ্রভূত হয় এবং বহির্বাযুতে, নড়াচড়াতে বাহ্যার উপশম হয়; প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, আর্স্, বৈল্, স্পাইজেল্, বিরেট্-আর্স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ; হৃৎপ্রদেশে প্রবল বেদনা বা বাঁতনা, বাহ্যার দরুণ নিশ্বাস প্রবাসেব ব্যাঘাত জন্মে।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** গ্রীবাব গ্রস্থি স্বীতি এবং কঠিনতা, বাহ্যার দরুণ মনে হয় যেন রোগীর গরমীর ব্যাবাম কইয়াছিল; কুঁচ্কির সন্ধির দুর্বলতা।

**অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।** বাহ্যেতে পা, প্রধানতঃ ইটিব সন্ধি, যেন চম্কিয়া উঠে, বাহ্যার দরুণ স্তম ভাঙ্গিয়া যায়, পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বনী করা ও কোন প্রকারের কার্য করিতে অনিচ্ছা (নাম্ব-বম); অনেককণ চলিয়া বেড়াইলে যেক্ষণ হয়, পায়ের ভিমে সেক্ষণ আশ্চর্যবোধ (চাবনা)।

**চর্ম ।** গায় নীলের আভাযুক্ত কাল ফুস্ফী, আরক্ত-জব; বিন-পের স্থায় শয্যাক্ত।

**নিদ্রা ।** অস্থি এবং অবলম্ব কার্য নিদ্রা এত ভয়ানক স্বপ্ন দেখা; নান্য প্রকারের চিন্তা বা করণী আসিয়া যুগেব ব্যাবাহ কন্মায়।

**ব্যবহার ।** নষ্টিক এবং স্বাভাবিক মস্তকীর নানা প্রকারের পুরাতন অস্থখ; মেলান্চলিয়া (Melancholia); কটকটক উপদ্রবনা (Spinal irritation); মূণীরোগ; পক্ষাঘাত (Paralysis) এবং নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত (Paraplegia); পাকস্থলীতে বেদনা; হৃৎপিণ্ডে বেদনা; স্বচ্ছাপূর্ণক স্বাভাবিকভাবে পেণী বা অঙ্গচোমনাব অশক্ত বা কোকোমোটার আটাক্সি (Locomotor Ataxy); শৈল্পিক বিল্লীর অস্থখ, চক্ষুপ্রদাহ; অজীর্ণ রোগ; উদরাময়; আমাশয়; অস্থি অস্তগ, প্রধানতঃ ক্ষুদ্র অস্থি পোকাব ধরা; কঠিনালীর পুরাতন প্রদাহ এবং হাপানি কাশি; হৃৎস্নায়ুশূল; মূত্রনালীর প্রদাহ; বহুমূত্র; প্রমেহ রোগ; গরমীর ব্যাবাম; মৃত্তিকা পাত্তুরোগ (Chlorosis) ইত্যাদি অস্থখে আর্জেন্টাম নাইটি কাম্ ব্যবহার্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আক্ষেপের পূর্বে অত্যন্ত অস্থিরতা ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে শরীর কম্পন ; হৃৎকলকারক কাবনে নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত ; মাথা এবং মূৰ্ধনগুলি বেন বিস্তৃত হইতেছে একপ অস্থিত হওয়া ; ভয় পাইয়া বা রক্তস্রাবের সমন্বয় আরম্ভের আক্রমণ ; স্বেচ্ছাপূর্ণক অঙ্গ সঞ্চালনে অশক্তি ; শবীরেব নানা স্থানে যেন চোঁচ বিধিয়া রহিয়াছে একপ অস্থিত হওয়া ; পা শুকাইয়া যাওয়া ; উদরানয় বা আমাশয় রোগে দান্তেব পূর্বে গুরুদ্বার দিয়া কেড় কেড় শব্দ করিয়া সজোরে দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; স্নাত্তিতে, প্রাতঃকালে, উৎপাদে, ঠাণ্ডা দ্রব্য পাইলে, চলিয়া বেড়াইলে বা ঘোড়া গাড়ীতে চাপিলে ও অহোরাত্র যাব অস্থিরের বাক্ত এবং বিস্তৃত বায়ুতে ও উদগার উঠিলে অস্থির উপশমন ইত্যাদি আরজেন্টাম্ নাইট্রিকামেব কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । আরজেন্টাম্ নাইট্রিকামেব কার্যের সঙ্গে আদিনিউ, মার্কিউরিয়াম্, ফসফাস্, হাইড্রোমায়েরিক্ অসিড্, পিক্রিক্ অসিড্, আলাম্, হিপরাসানিক্উরিক্, নেট্রাম্ বিউরিয়টিকাম্ এবং নাইট্রিক্ অসিডের কার্যের অনেক মিলিত আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । আদিনিউ, মার্কিউরিয়াম্, নেট্রাম্ বিউরিয়টিকাম্ এবং নাইট্রিক্ অসিড্, আরজেন্টাম্ নাইট্রিকামেব প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় আরজেন্টাম্ নাইট্রিকাম্ দ্বারা বিবাক্ত হইলে, তপ্ত এবং লবণের ফল দাবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কখন কখন ১০ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পুৰাতন আকারেব চক্ষুপদার্থে ২০০ ডাইলুশন প্রতি সূক্ষ্মরে ৩ মাত্রা, একপ ৫৬ সপ্তাহকাল ব্যাস্ত্য করিয়া ৪.৫ টী রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন ।



## ব্যাপ্টিসিয়া-টিংটোরিয়া,—বননীল,—ব্যাপ্ট্

(BAPTISIA TINCTORIA,—BAPT-TINCT.)

উত্তর আমেরিকাহু শুক পার্শ্বীয় স্থানে এই গাছ জন্মে। এতদ্ব্যতীত এই গাছ জন্মিয়া থাকে। বসন্তকালে অথবা শবতকালে যখন ইহার পাতা পড়িয়া যায়, তখন এই গাছের মূল বা শিকড়ের বাকল সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে উহা প্রফ্‌স্পিবিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ায় মতে ব্যাপ্টিসিয়ার মূল আরোক উত্তর আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করা কর্তব্য।

সাধারণ ক্রিয়া। বৃক্কের উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দরুণ জর বিকারে দেরূপ হয়, এই ঔষধের কার্য দ্বারা রক্ত স্ফূটন গলনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রক্তের মধ্যদিয়া ইহা মুণ্ডগহ্বর, গলার মধ্য এবং অঙ্গের শৈথিল্য বিস্তারিত করে। ইহা গতি এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদক স্নায়ুগুলি আক্রমণ করিয়া বলঙ্গর এবং পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। সঞ্চালন এবং স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদক উভয় প্রকারের শক্তিই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত অঙ্গের সঞ্চালন এবং উহার স্পর্শজ্ঞান উক্ত উভয় শক্তিরই বিনাশ হইতে পারে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অনিচ্ছা এবং অশক্তি; মন যেন ছুঁক্স এবং গোলমেলে হইয়া যায় (এথ্রা, জেল্‌স্, ফস্, রাস্টক্স্); নেসা করিলে ঘেরূপ হয়, মনে স্ফূটন গোলমেলে বোধ; কোন বিষয়ে মন স্থির ভাবে থাকে না, অতএব নানা প্রকারের চিন্তা আনিয়া মনকে অধিকার করিয়া ফেলে; শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া নানাদিকে বিস্তৃত হইয়াছে রোগী এরূপ মনে করিয়া উক্ত খণ্ড গুলি একত্রিত করার জন্ত বারবার বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে এবং তদ্রূপ তাহার ঘুম হয় না; মস্তিষ্কের উত্তেজনা, রাত্রিতেই যাহা অধিক অনুভূত হয়; অর্ধজ্ঞানহীনতা (Stupor) এবং প্রলাপ, প্রাধানতঃ রাত্রিতে, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তন্মানক স্বপ্ন দেখা; কোন বিষয়ে চিন্তাকরায় অশক্তি।

**ମନ୍ତ୍ରକ ।** ନାଥାସୋରୀ ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ସମୁଦ୍ର ଶରୀରର ହର୍ଷ-  
ଜତା, ପ୍ରଧାନତଃ ନିମ୍ବାନ୍ନ ଏବଂ ହାଟୁର ; ନାଥାର ଭାରିବୋଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାତେଚାପିୟା  
ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଘୃଣଘୃଣେ ବେଦନା (କୋନାମ୍, ଜେଲ୍, ହାଉଡ୍ରାଟ୍) ; କପାଳେ ବେଦନା  
ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ନାସିକାର ଗୋଡ଼ାର ଚାପାବୋଧ (ଏକନ୍, କାଲି-ବାହି) ;  
ନାଥା ବଡ଼ ଏବଂ ଭାବି ବାଲିଆ ଅନୁଭୂତ ହସ ଏବଂ ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ନାଥା ଓ  
ମୁଖମଣ୍ଡଳେ ଅବଶବୋଧ ; ମନ୍ତ୍ରକେ ଟାଟାନି, ନାଥା ଚେଟ କରିଆ ଉପୁଡ଼ ହାଲେ  
ସାହାର ବୃଦ୍ଧି ହସ ; ନାଥାର ଉପରିଭାଗ ସେନ ଉଡ଼ିଆ ବାହିବେ ଏକ୍ରମ ଅନୁଭୂତ  
ହସ (ନିମିନିକ୍) ; ନାଥାର ମଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ଖେଲିଆ ମାଓସା ବା ଗୋଡ଼ାହାଣି ପଞ୍ଜାର  
ଭାୟ ଘୃଣଘୃଣେ ବେଦନା ; ଅବସର କାରକ ଘୃଣଘୃଣ ନାଥାଧରୀ (କୋନାମ୍, ଡାଲ୍, ଜେଲ୍,  
ହାଉଡ୍ରାଟ୍) ; ନାଥା ସେନ ଭାସିଆ ଖଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜ ହାଉଡ୍ରା ଉଡ଼ିଆ ଶିଆଛେ ଏକ୍ରମ  
ଅନୁଭୂତ ହସ, ସାହା ରୋଗୀ (ବ୍ରୀଲୋକ) କୁଡ଼ାହାଣି ଏକତ୍ରିତ କରାର ପ୍ରସାନ୍ନ ମାଓ  
(ହାଲିନ୍) ।

**ଚକ୍ର ।** ଚକ୍ରବ ଗୋଲକ ଟାଟାନି ; ଚକ୍ରବ ଗୋଲକ ଟାଟାନି ଏବଂ ଉହାର  
ମଞ୍ଚାଙ୍ଗେ ଅବଶି ; (ବାହି, ନିମିନିକ୍) ।

**ମୁଖମଣ୍ଡଳ ।** ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଲକ ଏବଂ ଶୋଷଣ ତାମ ଟାଟାନି, ହାଉ-  
ସର ରକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ, କାଳିତେ ଗୋଲକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜିତ ।

**ମୁଖଗହ୍ଵର ଏବଂ ଗଳାର ମଧ୍ୟ ।** ମାତ ଏବଂ ଗୁଡ଼ କାଳିତେ ଗୋଲକ  
ସାହା ଆବୃତ (Sordes, (ଏକ୍ରମ, ମାଟ୍ ଟାଟାନି) ; ଗହ୍ଵର ମଧ୍ୟଭାଗ ହାଉଡ୍ରାଟ୍ ;  
ଗିହ୍ଵା ପ୍ରଥମତଃ ସାହା ଏବଂ ଉହାର ମଧ୍ୟେ ମାତ ଗୋଲକ ଭାୟ କୁଡ଼ାହାଣି ଓ  
ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କର୍ତ୍ତାବେନ ଗୋଲକ ଏବଂ ଉହାର ମାତ ବା ମାତ କାଳିତେ  
ଗୋଲକ ଓ ଉତ୍ତେଜ ; ଗିହ୍ଵା ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଉହାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ କର୍ତ୍ତାବେନ (ଗୋଲକ ;  
ଗିହ୍ଵା କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼, ଏପିମ୍, ଆମ୍, ବାଟ୍ ଟାଟାନି) ; ମୁଖେ ଗ୍ରହଣ, କର୍ତ୍ତା  
ପରିମାଣେ ଆଟାଳ, ଗୋଲକ, ଗୋଲକ ଉଠା, ଗୋଲକ ମଧ୍ୟେ ମାତ ଗୁଡ଼ ଏବଂ  
ଉହାର ମଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜେ ମୁଖେ ଗୋଲକ ଉଠା (ଗୋଲକ, ନାଉଡ୍ରାଟ୍, ଆମ୍) ; ଗୋଲକ ମଧ୍ୟେ ଗିହ୍ଵା  
ଏବଂ ମୁଖଗହ୍ଵର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ (ଏକନ୍, ଆମ୍, ବାଟ୍) ; ମୁଖେ ମାତ ଗୁଡ଼, (ଗୋଲକ,  
ହିପ୍-ଗୋଲକ, ଆଗୋଡ଼, ଗିହ୍ଵା, ନାଉଡ୍ରାଟ୍, ଆମ୍, ମାଟ୍) ; ମୁଖେ ମଧ୍ୟେ  
ଭାୟ ଗୁଡ଼ ; ମୁଖେ ଗିହ୍ଵା ଗୋଲକ କୋଲ ଗୋଲକ ଗୋଲକ (ଗୋଲକ, ବାଟ୍, ହିପ୍-  
ଗୋଲକ) ; ଗୋଲକେ ଗୋଲକ ହସ, ଗିହ୍ଵା ଗୋଲକ ଅନୁଭୂତ ହସ ; ଗୋଲକ ମଧ୍ୟେ

সঙ্কোচন বা উহাতে অঁটিবোধ, বাহার দক্ষণ বারম্বার ঢোক গিলিবার ইচ্ছা হয় (আস্, বেগ্, হায়োস্); মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগ কাল্‌চ লালবর্ণ (নেজা) এবং উহাতে কাল্‌চ পচা কত (মিউর-আস্, ক্যালী-বাই); টনসিল্‌স্ (Tonsils) এবং কর্ণমূলস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; কিন্তু উহাতে বেদনা পাকে না ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলক্ষম; ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria), বাহার দক্ষণ অক্রান্ত স্থানে পচাবুক্ত ঘা হইবা কাল্‌চ এবং হর্গকবুক্ত হয় (ক্যালী-বাই)।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী যেন পড়িয়া নেতা পানা হয় (মিমিসিক্, হাইড্রাষ্ট্, ইন্‌ফেন্স, মিসিয়া, সাল্‌ফ্); ক্ষুধাশূন্যতা। যকৃতে বেদনা এবং তদক্ষণ যকৃতের পিত্তাবাহে এত প্রবল বেদনা হয়, যে উহার দক্ষণ রোগী চিনিত পারে না; যকৃতের পিত্তাবাহে অনবরত বেদনা (বার্কে-রিস্); ডাইন ইলিয়া প্রদেশে (Right Iliac Region) অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই, চারনা, ক্যাপ্‌), এবং চাপিলে উহাতে ষড়্ ষড়্ শব্দ হয়; চাপিলে উদর প্রদেশস্থ পেণীতে অত্যন্ত বেদনা এবং টাটানির উদ্রেক হয়।

মল এবং মলবার। বারম্বার অল্পপরিমাণ, তরল, কাল্‌চে এবং কত কারক, হর্গকবুক্ত মলত্যাগ (আস্); অত্যন্ত হর্গকবুক্ত, হর্গলকারক উদগায় (আস্); ঘোলাটিনা এবং প্রচুর পরিমাণে স্লেখা মিশ্রিত মল ত্যাগ, কিন্তু উহার সঙ্গে বেদনা যন্ত্রণাদি কিছুই থাকে না; কাল্‌চে কটাবর্ণ, রক্ত মিশ্রিত স্লেখা ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার কঠিনায়ক কোথপাড়া এবং বিকারের লক্ষণ (আস্); আর্মান্য এবং টাট্‌কা রক্ত বা রক্তমিশ্রিত স্লেখা ভেদ; দান্তের পুর্ব্বে পেটে অত্যন্ত বেদনা, দান্তের সময় এবং উহার পর অত্যন্ত কঠিনায়ক কোথপাড়া (মাক্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রত্যাগের সময় মূত্র নানীতে জ্ঞানাত্তব (একন্, আস্ ক্যার); মূত্র পরিমাণে অল্প এবং কাল্‌চে লালবর্ণ (একন্)।

শ্বাসযন্ত্র। হৃৎকূলে রক্তাধিক্য বা রক্তাস্রবোধ এবং উহার সঙ্গে শ্বাস কষ্ট, বিছানায় বসিয়া থাকিলেও বাহার উপশম হয় না ও বাহার দক্ষণ বিস্তৃত বায়ু সেবনের আশাব্যবসায়ী ঘরের জানালার নিকট ঘাইতে বাধ্য হয় (সাল্‌ফ্); পূর্ণ নিশ্বাস টানিতে অশক্তি এবং শ্বাস যন্ত্রের শক্তির অভাব বা হ্রাস; শ্বাস কষ্টের দক্ষণ খুম ভাস্কিয়া যায় এবং রোগী ক্রমশঃ

অত্যন্ত আঁটা অম্লভব করে, বাগার দরুণ বিস্তৃত বায়ু সেবন করার অত্যন্ত ইচ্ছা হয় (আস', কার্বো-বেজ', সাল্ফ') ; বৃকে সঙ্কোচন এবং কঠোরভব ও ডাইন ফুফুসে বেদনা ।

**নাড়ী ।** নাড়ী প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্রতগামী এবং তৎপর মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং লুপ্ত প্রায় হয় ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** গ্রীবাদেশস্থ পেশী শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং উহাতে সঞ্চালন শক্তি থাকে না ; পৃষ্ঠদেশ এবং কুঁচকি অত্যন্ত শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও উহা অত্যন্ত কন্ কন্ করে ; অনেককণ চলিলা বেড়ানের পর বা অনেককণ মাথা হেটু করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে ঘেকুপ হয়, শুষ্কতারের ঠিক উপরিভাগে সেকুপ ক্রান্তি, চাপা এবং ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনামুভব, যাহা অতি শীঘ্রই কুঁচকির চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান এবং ডাইন পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সন্ধিতে মোচড় ইয়া পড়া বা থেঁলিয়া যাওয়ার জ্বায় বেদনা বা যাতনা এবং তন্দ্রকণ উহার সঞ্চালনে অশক্তি (আর্সিকা, বডোড, কটী) ; হাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া অম্লভূত হয় ; বাহু এবং পায় কসিয়া ধরার জ্বায় বেদনা বা যাতনা ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কন্ কন্ নানি ; বাম বাহু এবং হাতে অবশবোধ ও উহাতে কুটুকটানি ; পায়ের ডিম্ব কসিয়া ধরার জ্বায় অত্যন্ত প্রবল বেদনা বা যাতনা ; হাত পা ইত্যাদি অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং কাঁপে ।

**কর ।** বহির্বাহুতে শীতবোধ ; পৃষ্ঠদেশ এবং নিম্নাঙ্গে শীতবোধ ; লম্বায় শরীর উষ্ণ ও শুষ্ক এবং উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শীত, যাহা পৃষ্ঠদেশের উপরি এবং নিম্নভাগে অধিক অম্লভূত হইয়া থাকে ; আঙ্গিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার, বা যে প্রকার জ্বরে শুষ্ক অধিক আক্রান্ত হয় এবং রোগী ব্যৱস্থার প্রলাপ বলে ও মধ্যে মধ্যে অচেতন হওয়ার জ্বায় দুমাইয়া পড়ে ; যাতনার দরুণ ব্যথা হইয়া যাতনাদির কতক উপশমন হয় ; মৃদমণ্ডল এবং কপালে দুশিত ঘর্ম ; কপা বাগতে বলিতে বা কোন প্রকার উত্তর দিতে দিতে গভীর নিদ্রা আসিয়া ; মাথা ঘেঁষ ভাঙ্গিয়া থও থও হইয়া উড়িয়া গিয়াছে এরূপ অম্লভূত হওয়ার দরুন বোকা উহা কুড়াইয়া একত্রিত করার প্রয়াস

পায় ; মুখমণ্ডল কাল্‌চেনালবর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্বেগযুক্ত ; পেশীতে টাটানি এবং বিছানার কঠিন স্পর্শভূত হওয়া (বাস্টল্‌জ্, আর্নিকা) ; বিকারের লক্ষণাক্রান্ত আরক্ত-জ্বর এবং উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে ক্ষত, মুখে দুর্গন্ধ, ক্রিষ্টা শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত এবং বমন ।

নিদ্রা । সামান্য রকমের অচেতনতা এবং উষ্ণতার সঙ্গে প্রলাপ বলা ; রোগীর নিকট কথা বলিলে সে প্রথমে উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে (হারোম) ; রাত্রি ২টা বা ৩টা পর্য্যন্ত ঘুম ভাল হয় এবং তৎপরে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রোগীর ঘুম হয় না, যাঁহাৎ দ্রুত সে ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করে ; সর্বদা অসুস্থ এবং তদ্রূপ অবস্থায় ক্রান্তিবোধ ; চক্ষু অন্ধ খোলা রাখিয়া ঘুমানের ভাব ; নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থির নিদ্রা এবং তদ্রূপ সুমেষধোনে ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ।

চর্ম । চর্ম অত্যন্ত উষ্ণ এবং উষ্ণতায় অত্যন্ত আলায়তন (আস্) ; গায় ছাম বা আমবাতের তায় ফুস্‌ফুস (একন্, আণ্টি-ক্লড্, কফিয়া, পাল্‌) ।

বাবহার । আণ্ডিক-জ্বর বা জ্বর-বিকারের প্রথমাবস্থা এবং সকল প্রকারের বিকারের লক্ষণাক্রান্ত ও দুর্বলকারণ জ্বর এবং অন্তান্ত রোগের প্রথমাবস্থা ; শৈল্পিক ক্রিমীর ক্ষত, প্রধানতঃ মুখগহ্বরে ; ডিপ্‌থিরিয়া ; মুখে বা ; পাকস্থলীর প্রদাহ এবং উষ্ণতায় বেদনা ; মুখে পচাযুক্ত বা (Cancrum oris) ; সামান্য এবং বিকারের লক্ষণাক্রান্ত রক্তমাশয় ; একজ্বর ; পিত্ত-জ্বর ; যক্ষা কাশে পূর্ব নিঃসরণ হেতু জ্বর বা হেক্টিক জ্বার (Hectic Fever) ; উদরাময় ; রক্তমাশয় ; মস্তিষ্ক ও কসেৎকা মজ্জাবিকার প্রদাহ (Cerebro-Spinal Meningitis) ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অস্থিরতা, ভাল ঘুম না হওয়া (একন্, আস্, বাস্টল্‌জ্), অগ্নিবোধ এবং শয়ন করিয়া থাকিব ইচ্ছা ; সমুদয় শরীরেই মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতলিয়া যাওয়ার তায় বেদনা বা যাতনা ও ক্রান্তিবোধ (আর্নিকা, চায়না) ; দুর্বলতা এবং শরীর কম্পন ; নিম্নজ্বরের দুর্বলতা ; গায় চাপিয়া বা কসিয়া ধবার তায় বেদনা বা যাতনা (বেল্, মেক্‌জিরিয়াম্, নাক্স-বম্, বাস্টল্‌জ্) ; সমুদয় অংশের শৈল্পিকক্রিমী হইতে নিঃসরণই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (কার্কো-বেজ্) ; ডাইন অংশই অধিক

আক্রান্ত হয় (বেল্, আইরিস্, লাইকোপ্); নড়া চড়াতে অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে অস্থির উপশম (একন্, ব্রাই, মার্ক্) ইত্যাদি ব্যাপ্তিসিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। অর-বিকার এবং বিকাষের লক্ষণাক্রান্ত শিশুগণের স্বল্প বিরাম্য অরে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে জেল্‌সিমিথামের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অব রোগে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়া, মিউরিয়াটিক্‌ অসিড্‌ এবং রাস্‌ট্রেন্‌ব সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ব্যাপ্তিসিয়ার কার্যের সঙ্গে অসিনিট্‌, আর্নিকা, হারোসীয়েমাস্‌, মার্কিউবায়াস্‌, নাইট্রিক্‌ অসিড্‌ এবং ওপিরামের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

ডাইলুশন বিচার। ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় মূল আরোক দ্বারা মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেথক কখনও উক্ত ক্রমগুলি ব্যবহার করিয়া দেখেন নাই। অতএব উহার গুণাগুণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

### বারাইটা কার্বোনিকা,—বারাইটা কার্ব্

(BARYTA CARBONICA,—BARYT-CARB.)

ইহাকে কার্বোনেট্‌ অব্‌ বেরিয়াম্‌ (Carbonate of Barium) বলিয়া থাকে। কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত কার্বোনেট্‌ অব্‌ বেরিয়াম্‌ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগার অব্‌ মিক্‌ এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় শততমিক ক্রম পর্য্যন্ত ইহার গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় শততমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শততমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। ইহা মস্তিষ্ক এবং গ্যাংলিয়োনিক্‌ স্নায়ুগুলকে (Ganglionic system of nerves) উত্তেজিত এবং অবসন্ন করিয়া শারীরিক এবং মানসিক তুর্লভতা উৎপাদন করে, যাহার দরুণ অকালে শরীর ক্লান্ত এবং বৃদ্ধ বয়সের জায় চল্‌ চলে বা শিথিল হয়। লিম্ফেটিক্‌

গ্রন্থির (Lymphatic glands) উপরও উহার বিশেষ কার্য আছে। এই কার্যের ফল গলার মধ্যের লিম্ফেটিক গ্রন্থিতেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তালুকার পাশস্থিত গ্রন্থি (Tonsils) অতিক্রান্ত হওয়া উক্ত কার্যের এক বিশেষ উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়াতে অশক্তি এবং তদ্রূপ অনবরত মত পবিবর্তন করা (ইগ্‌নেস) ; ভয়, বা অরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস বা বিনাশ, বাহার দরুণ ক্রথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ উহা ভুলিয়া যাইতে হয় (হার্ণিকা)। অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা ও ছেলে মানুষের জায় স্বভাব ; বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতা ; অরণ শক্তির অত্যন্ত হ্রাস ; শিশুকে কোন কথা শিখাইলে তাহার সে কথা অরণ থাকে না (ক্যাক্স-কস) ; আপনার উপর বিশ্বাস থাকে না ; অপরিচিত লোকের ভয় ; রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন অল্পে তাহার কার্য দেখিয়া দোষ গুণ বিচার করিবে এবং হাসিবে ; রোগী (শিশু) খেলা করিতে চাহে না ; রাগের উদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভীকতা ।

মস্তক । সংজ্ঞাশ রোগ, মাথা ঘোরা ; শিশুর জায় স্বভাব বিশিষ্ট বৃদ্ধের উক্তবোগ ; সূর্য্যের উত্তাপে দাঁড়াইলেই মাথার উপরিভাগে চাপিয়া বা কসিয়া ধরার জায় বেদনা বা বাতনা যাহা সমুদয় মাথায় বিস্তৃত হয় ; মাথায় টাক পড়া বা মাথার তালু চুল পড়িয়া যাওয়া (জিক্স) ; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় মাথার সে পার্শ্বে বেদনা বা বাতনা এবং টাটানি, চুলকাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; শিশুগণের মুখমণ্ডলে কল্‌তানি বিশিষ্ট বা মরা চর্ম্ম বিশিষ্ট ফুসুড়ী (ক্যাক্স-কার্ক, গ্রাফ, হিশ-সাল্‌ফ, লাইকোপ) ; মাথায় জল পূর্ণ আব (Tumour) ।

চক্ষু । দৃষ্টিহীনতা ; একখানি পাতলা বা সরু কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, চক্ষে সেরূপ বাস্মা দেখা (কষ্ট, কস) ; চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষে শুষ্ক বোধ ; চক্ষুর তারা ক্রমাগত একবার সঙ্কুচিত হয় এবং একবার বিস্তৃত হয় ।

কর্ণ । ডাইন কর্ণ মূলস্থিত গ্রন্থি ক্ষীণ এবং স্পর্শনে বেদনায়ুক্ত হয় ;

কানের মধ্যে কসিয়া ধরা বা স্ফু স্ফু কবার জ্বাষ যাতনা ; কানে ছিড়িয়া ফেলার জ্বাষ বেদনা এবং উহার সঙ্গে ডাইন কানের সম্মুখ ভাগস্থিত হাড়ে ছিদ্র করা বা কসিয়া ধরাও জ্বাষ বেদনা বা যাতনা ; কানের মধ্যে চুলকানি ; হাঁচিবার সময়, গিলিবার সময় অথবা তাড়াতাড়ি চলিবার সময় কানের মধ্যে কেঙ্ কেঙ্ শব্দ হওয়া (গ্রাক্) ; প্রবলবেগে নাক ঝাড়িবার সময় কানে শব্দের প্রতিধ্বনিত শ্রুতিতে পাওয়া যায় ।

নাসিকা । নাকেব মধোব অনিবার্যঃ শুষ্কতা ; নাক দিয়া গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের স্লেয়া নির্গমন (এইলাস্) ; সন্ধি এবং উপবেশ ওঠা ক্ষীত : শিশুগণের মোটা পেট (ক্যাস্-কার্ণ) ; বাবষার নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বাকিকা এবং শোণের জ্বাষ টল্‌টলে ও ক্ষীত (আস্) ; নাকের জ্বাষ পড়িয়া থাকিলে যেকূপ হয়, মুখমণ্ডলে সেরূপ কসিয়া ধরাও জ্বাষ অন্তর্ভূত হয় (আলান্, রোমিন্, গ্রাক্) ; মুখ বুজিবার সময় মাড়িষ হাড়ের সন্ধিতে বেদনানুভব ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা আবদ্ধ পাবড় লেপযুক্ত ; জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা এবং চিড়িক মাথা ; জিহ্বা কত এবং ফাটায়ুক্ত ; জিহ্বার পক্ষাঘাত এবং তক্ষণ কথা বলিতে অশক্তি (কষ্ট্, জেন্স্) ; মুখগহ্বরের মধ্যে কোম্পাষ জ্বাষ কুসড়া মাথা গলার মধ্যে এবং তালুকায়ট অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; মুখের মধ্যে প্রচুর কঠিন তন তলে গ্লেয়ার সঞ্চয় ; মুখগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক এবং উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাট) । কোন দ্রব্য বা ডাক গিলিবার সময় গলার মধ্যে জ্বালা এবং চিড়িক মাথা , প্রত্যেকবার ঠাণ্ডা পান্যপান টন্‌সন্ (Tonsils) প্রদাহ যুক্ত হইয়া উঠতে পূর্ব হওয়ায় উৎকর্ষ হয় (হপ্, দাবক্) ; উন্মিলের পুষ্কতন আকারের বিবর্ত এবং কঠিনতা (ক্যাক্, কার্ণ) ; গলার মধ্যের সন্ধোতন ; ডেগার জ্বাষ কোন পদার্থ যেন লগিয়া বহিরাগে গিলিবার সময় গলার মধ্যে একপ অন্তর্ভূত হয় (বেল্, কালী-বাট, হিপ্-সালক্) ; হস্তাঙ্ঘ্রির নিয়ন্তাণাত্ত গ্রন্থি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষাতি এবং কঠিনতা (এরান্, ক্যাক্-কার্ণ, আমোড, পান্‌তম্, নেটাম-কার্ণ) ।

পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা যাবৎ ৩৬ ঘণ্টা, কিন্তু কোন দ্রব্য



খাইতে রুচি থাকে না ; পাকস্থলীতে দুর্বলবোধ, আহার কবিলে যাহা দ্রুত হয় ; এক খানি পাথর চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ ভারি বোধ (আস্, ব্রাই, মার্ক্, পাল্‌স্), উল্কাব উঠিলে দাঁহার উপ-শম হয় ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, প্রত্যেকবার পা বাড়াইলেই যাহা অধিক বেদনায়ুক্ত হয় ; পাকস্থলীতে অত্যন্ত টাটানি, বাহার দক্ষণ আহার সময় মনে হয় যেন আহার দ্রব্য ক্ষতযুক্ত স্থানের উপর দিবা চলিয়া যাইতেছে ; উদর ক্ষীত, বিস্তৃত এবং কঠিন (আস্, মার্ক্, ল্যাক্) ; বিজ্ঞানায় পাশ ফিরিবার সময় মনে হয় যেন অল্প উদরের মধ্যে এক পাশ্ব হইতে অপর পার্শ্বে ধপ্ করিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায় ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের স্ত্রী সহবাসের শক্তির হ্রাস (অগ্নান্) ; স্ত্রীসহবাসের শক্তির বৃদ্ধি (অগ্নারিকান্) ।

শ্বাসযন্ত্র । নাক দিয়া ধূম টানিলে যেরূপ হয়, কণ্ঠনালীতে সেক্রপ অনুভূত হয় (নেট্রাম্-আস্, ব্রোগিন্), অথবা আকাতরার গন্ধ প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালীতে এই প্রকার অনুভূত হয় ; রক্ত বয়সে শ্বাসরোধক শৈল্পিকরোগ ; হৃৎকূলের পক্ষাঘাত হওয়াব উপক্রম হওয়া ; গলার মধ্যে ধলধল এবং হুড়্ হুড়্ করার দক্ষণ আক্কেপিক কাশি (নাল্‌বম্), সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত বাহার বৃদ্ধি হয় ; কাশিবার সময় বুকের মধ্যে টাটানি (অগ্নিকা) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং মাথার পশ্চাৎভাগের গ্রন্থির ক্ষীতি (ক্যাক্-কার্ণ, ক্যারো-বেজ্, অ্যারোড্) ; ঘাড়ে শক্ত বোধ বা উহা নোয়ানে অশক্তি ; কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । \* বাহ্যে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বোগলের গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা (সাইগিসি) ; বাম পায়ে আগা গোড়া করিয়া ধরার জ্বার বেদনা ; হাটের সন্ধিতে হাতী বঁধানের জ্বার বেদনা ; পায়ের পাতায় ঘর্ষণযুক্ত ঘর্ম্ম (নাইট্‌ক্-আস্, সিপিয়া) ।

নিদ্রা । রাত্রিতে বারংবার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ; রোগী অত্যন্ত গরম বোধ কবে ; পায়ের পাতায় মোচড়াইয়া পড়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার জ্বার বেদনা অনুভূত হয় ।

চর্ম্ম । গ্রীবাদেশে চর্বি বিশিষ্ট আব (Fatty tumours) ; শরীরের

স্থানে স্থানে জালা এবং কুট্‌কুটানি ; গ্রন্থির ক্ষতি এবং কঠিনতা (কার্ক-কার্ক, আরোড, হিপ-সাল্‌ফ্‌ গ্রাফ্‌) ; শরীরের স্থানে স্থানে কল্‌তানি বিশিষ্ট ক্ষত ; গায় আঁচিল (Warts) (খুজা) ।

ব্যবহার । তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি দ্বয়ের প্রদাহ (Tonsillitis) ; উহাদের বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা ; গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষতি এবং ক্ষত ; শরীর অকালে বৃদ্ধের ভায় ঢল্‌ঢলে হয় ; বৃদ্ধ বয়সে সার্বসাদিক পক্ষাবাত ; ধ্বজ-ভঙ্গ ; হিষ্টিরিয়া ; হাপানি কাশি ; চর্নিবিশিষ্ট আঁচ (Fatty Tumours) ; আঁচিল (Warts) ইত্যাদি অস্থে ব্যারাইটা কার্সিনোমিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শরীরে ক্লান্তি এবং তারিবেধ ; বৃদ্ধ বয়সে মানসিক এবং শারীরিক দুর্বলতা , ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউলাম্, সিমিয়া, সাইলিসি) ; শরীরের এক (বাণী) পার্শ্বে তর্পাক্ত ঘর্ম্ম ; শরীর খাট (বামনের ভায়) : মানসিক এবং শারীরিক পরিপোষণের বিবৃদ্ধি বা অভাব ; বৃদ্ধবয়সে বামনদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট শিশু বা ছোট বাসক বালিকাগণের অর্জুন, প্রদানতঃ যে সকল রোগীর সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই উন্মিল্‌ প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষতি হয় ; বাম নিকই অধিক আক্রান্ত হয় ; প্রাতঃকালে, বসিয়া থাকিলে, রোগের লক্ষ-ণাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, আক্রান্ত স্থান পুঁলে বা ভিজাইলে, বেদনাকৃত পার্শ্বে শয়ন করিলে অস্থের ঢুকি এবং বাহ্যিকভাবে চলিয়া বেড়াইলে অস্থের উপশম ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্সিনোমিকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগ্রণবিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্সিনোমিকার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্সিনোমিক, ম্যাকউরিয়াস্, সাইলিসিয়া, আলাম, বেলা-ডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া আরোডাইড্‌, কষ্টিকাম্, চাপনা, জেন্‌ব্রিয়াম্, আরোডিন্‌, ফফাস্, সিমিয়া এবং সাল্‌ফাের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । অ্যান্টিমোনিয়াম্ টাটারিকাম্, বেগেডোনা, ক্যাল্‌ফার, ডাল্‌কেমেরা, জিকাম্ ইত্যাদি ব্যারাইটা কার্সিনোমিকার প্রতি-ষেধক ঔষধ মন্দো পরিগণিত । অধিক মাত্রায় কার্সিনোমেট অব্‌ বেরিয়াম্ দ্বারা বিধাক্ত হইলে সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা অথবা ম্যাগ্নেসিয়া ব্যবস্থা ।

ডাইগ্‌নসন বিচার । ৬ এবং ১২ ডাইগ্‌নসনই সচরাচর ব্যবহৃত

হইয়া থাকে । টন্সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং কঠিনতাতে ৬ষ্ঠ শতাব্দিক ক্রমের আরোক বিশেষ উপকারী । টন্সিল প্রদাহযুক্ত এবং ক্ষীণ হইয়া উঠাতে পুঁথ এবং ক্ষত হইলে, ১২ ডাইলুশন অপেক্ষাকৃত অধিক উপকারী । টন্সিলের পুরাতন আকারের প্রদাহ এবং বিবৃদ্ধিতে একটা ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের চিকিৎসায় ৩০ ডাইলুশন, প্রতি দিন প্রাতে ১ মাত্রা, এবং তৎপর ২০০ ডাইলুশন ১ দিন অন্তর এক দিন এক মাত্রা, এই প্রকার ৩ মাসব্যাপী ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে ।

### ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্লোরাস,—ক্যাক্ট্

(*CACTUS GRANDIFLORUS*,—*CACT. GRAND*)

মেম্ব্রিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া বীপে এই গাছ স্বভাবতঃ অধিক জন্মিয়া থাকে । ফুল ফুটিলে এই গাছেব ফুল এবং ফুলের নিকটবর্তী কোমল পাতা এবং ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া বথানিয়মে প্রক্স্পিরিটে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । নেপোল্‌স্ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (*Dr. Rubini*), যিনি এই ঔষধ প্রথম পরীক্ষা করেন, তাঁহার মতে এই গাছ যে স্থানে জন্মে সে স্থানে প্রস্তুত করা মূল আরোকই আনাদিগের ব্যবহার করা উচিত ।

সাধারণ ক্রিয়া । জংপিণ্ড এবং ধমনির চক্রাকারের স্তরের উপর উচ্চাব কার্য্য অঙ্গি প্রবল, তাহার দক্ষণ উক যন্ত্রাদির উত্তেজনা, অতিরিক্ত স্পর্শজ্ঞান, দ্রাব্যশূল, আক্ষেপ এবং জংস্পন্দন হইয়া থাকে । নিউমোগ্যাস্ট্রিক্‌ জ্বায়ু (*Pneumogastric nerve*) দিয়া জংপিণ্ড, কুক্ষুস এবং পাকস্থলীর উপর কার্য্য করিয়া ইহা অজীর্ণ বোগ, পাকস্থলীর অনুরোগ এবং কুক্ষুসের সঙ্কোচন হ্রাসপানি কাশি উৎপাদন করে । এক খানি লৌহের পাতা দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সেকপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ জংপ্রদেশে, সেকপ আঁটাবোধ হওয়া ক্যাক্টাসের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা কার্য্যের ফল মধ্যে পরিগণিত ।

সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । বিমর্ষ ভাব ; নিস্তব্ধতা এবং মনবোগ বা হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্

(Hypochondriasis); কঁদিবার অনিবার্য ইচ্ছা (লাইকোপ্, নেট্রা, নাক্স-মক্-প্রাটিনা, পালস্); সর্বদা কঁদি, রোগী জানে না সে কেন কঁদে ।

**মস্তক ।** একটী ভারি বস্ত্র চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেক্ষণ ভারি এবং চাপিয়াধরাব ভাব অনুভূত হয় (আলোজ্), চাপিয়া ধরিলে যাহাব উপশম হয় এবং গোলমাল ও আগোকে বাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্); মাথার দণ্ডপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ডাইন পার্শ্বে অত্যন্ত চাপা বোধ ।

**নাসিকা ।** নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে বহুস্রাব (বেল্, হ্যামোমিস্); ভরল'সদি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকাবক তরল স্রোতা নির্গমন (এরাম্, লাইকোপ্, কান্-গী-বাই) ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল শিউ বা ফিকা; মুখমণ্ডলের ডাইন অংশের পুরাতন আকারের স্নায়ুশূল, নড়াচড়াতে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

**গলারমধ্য ।** আহার বহা গলনালীর টিক উপরিভাগের সঙ্কোচন, বাহার দ্রুণ গিলিবার ব্যাঘাত জন্মে (আলমি, বেল্, হ্যামোমিস্, ষ্ট্রায়ন্); বাহরবার ঢোক বা লাল গিলা (বেল্) ।

**পাকস্থলী ।** পাকস্থলীর সঙ্কোচন এবং উহাতে ভারিবোধ ও দণ্ডপানি (পালস্); রোগী (স্ত্রীলোক) মনে করে যেন তাহার পেটে এক গাছি রসি কসিয়া বাধিতেছে (নাক্স-বম, প্রাটিনা); প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন; গলার মধ্য এবং মুখে টক জল উঠে, বাহার দ্রুণ আহার দ্রব্য টক লাগে; পাকস্থলীতে জ্বালা এবং দণ্ডপানি ।

**মল ।** মল কঠিন এবং কাল; প্রাতঃকালে উদরাময়, মল স্রোতা এবং পিত্তমিশ্রিত, জলবন্তবল; প্রচুর পরিমাণে রক্ত ভেদ (ক্যাক্-কার্প্, ক্যাক্টেরিলা, হ্যামোমিস্); গুহ দ্বারে অত্যন্ত ভারি এবং চাপা বোধ (সিপিরা); গুহদ্বারে অত্যন্ত বেদনামুক্ত অর্শেব বলী ।

**মূত্রবস্তু ।** মূত্রাশয়ের গ্রীবা সঙ্কোচন (ক্রিমোটস্, পিটোল্); মূত্রনালীতে জ্বালা, যবহার দ্রুণ বাবহারি মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; কোঁটার কোঁটার মূত্র নির্গমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীতে জ্বালাভাব (কোনারাম্); মূত্র দ্রবদেব রসের ভাব এবং উহাতে লাল বাসিৰ ভাব

তলানি পড়ে (লাইকোপ্, সাইলিন্দি); বক্ত মূত্রত্যাগ (ইপিকাক্, মিলি-ফোলিয়াম্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সিকেল্) ।

জননেন্দ্রিয় । স্ফলোকৈব জরায়ু এবং ডিম্বকোষে দণ্ডপরিমা-  
বেদনা; জরায়ু প্রদেশে সঙ্কোচন; অত্যন্ত কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের  
বেদনা (Painful menstruation) (ক্যান্, কুপ্রাস্, নাস্-বম্, সিমিলিক্);  
নিয়মিত সময়ের অশনক পূরো রক্তস্রাব ।

শ্বাসযন্ত্র । আকস্মিক কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা  
নির্গমন; সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপলব্ধি হলে উঠিবার সময় শ্বাস কষ্ট (একন্, অ্যানন্-  
কার্, অ্যাস্, ক্যান্-ক্যান্); সন্দ্বন্দিত কাশি এবং তদ্রূপ গলা দিয়া  
আটাল শ্লেষ্মা নির্গমন, বৃক্কের মধ্যে শ্লেষ্মার অত্যন্ত পঙ্ক্ততা (আঁটি-টাট্,  
ইপিকাক্); বোকা বিচ্যনান স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসন করিয়া থাকিতে পারে  
না; বাধিয়া রাখিলে বেকরণ হয়, বৃক্ক দেখিলে আঁটি বোধ, বাহ্যিক দরুণ শ্বাস  
প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে (অ্যাস্, ফন্); শ্বাসকষ্ট, বাহ্যিক দরুণ মধ্যে মধ্যে  
শ্বাসরোধ হইয়া রোগী ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ষ  
হয় এবং নার্ভী লুপ্ত হয় (পিরেট্-অ্যল্); শ্বাসকষ্ট: সঙ্কচিত হইলে বা  
বাড়িয়া ধরিলে বেকরণ হয়, বৃক্ক ক্রমাগত দেখিলে ব্যাঘাত (অ্যাস্,  
লিলিয়াম্ টাইগ্রি, ফন্), বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন বৃক্ক একখানি নৌহের  
পাত দিয়া কসিয়া বাধা রহিয়াছে; বৃক্ক রক্তবোধ্য বা রক্তাবরোধ,  
বাহ্যিক দরুণ শ্বাসন করিয়া থাকার ব্যাঘাত জন্মে; হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডে  
বাড়িয়া ধরার ভায় অন্তর্ভূত হয়; বক্ষাধ্বব মধ্যভাগে অত্যন্ত বাড়িয়া ধরার  
ভায় অন্তর্ভূত হয়, বাহ্যিক দরুণ মনে হয় যেন বৃক্ক কোন একটা নৌহ নির্মিত  
চাপা দেওয়ার যন্ত্র দিয়া চাপা দেওয়া হইয়াছে, বাহ্যিক দরুণ শ্বাসকষ্ট হয়  
এবং নড়াচড়াতে শ্বাস কষ্টাদির বৃদ্ধি হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নার্ভী । হৃৎপিণ্ডে আঁটিবোধ, বাহ্যিক দরুণ মনে  
হয় যেন হৃৎপিণ্ড এক খানি নৌহার পাত দ্বারা কসিয়া বাধা রহিয়াছে  
এবং বাহ্যিক দরুণ হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দনের ব্যাঘাত জন্মে (আর্বিকা);  
হৃৎপিণ্ডে অত্যন্ত প্রখর বেদনা এবং সূচী বঁগানের ভায় অন্তর্ভূত হয় (একন্,  
আর্বিকা, ব্রাই, ক্যান্-কার্, নেট্রাম্-মউর); হৃৎস্পন্দন (একন্, অ্যাস্,

স্পাইকেল (সাল্ফ), মিথা ব্রাজি স্বংস্পন্দন, চলিয়া বেড়াইলে, রাত্রিতে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে ঘাণাব বৃদ্ধি হয়; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধাংশে (Apex) বেদনা ঘাণা সরিয়া ঘাইয়া বাম হাতের অঙ্গুলার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; নাড়ী দ্রুত; শ্বাসকষ্ট; হৃৎপিণ্ডের মধ্যপ্রদেশে মড়মড় শব্দ হয় (Endocardial Murmurs); হৃৎপিণ্ডের বেগের অত্যন্ত আধিক্য; হৃৎ অগ্র প্রদেশে চপ্ চপ্ শব্দের (Precordial dullness) অতিবিক্ত বৃদ্ধি; বেন্ট্রিকেলের (Ventricle) অত্যন্ত বিবৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত দপ্পদপানি, বাহ্যিক দ্রুত হৃৎপিণ্ড কখন কখন অত্যন্ত ঘনঘন দপ্পদপ্ করে, কখন কখন বিলম্বে বিলম্বে দপ্পদপ্ করে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। হাতের শোথ এবং ক্ষীতি, বাম হাতেই ঘাণা অধিক ভব; পায়ের পাতার শোথ ঘাণা হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (এপিস)।

নিদ্রা। শরীরেব নানা স্থানে দপ্পদপানির দ্রুত ঘুম হয় না; রাত্রিতে ঘুম ভাঙিলে প্রলাপ (ব্রাউ); নিদ্রাশূন্যতা, ঘাণাব কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্বর। পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং হাত বরাবর জ্বাশ শীতল; ঐকান্তিক আকারের সঘিরাম বা পালাজ্বর, অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঘাণা এক সময়ে আটসে (দিনা); পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় মানান্ত শীত বোধ এবং দাঁত দাঁত খট্ খট্, খট্ খট্ শব্দ করা; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; পালাজ্বর যোগাতে শীত প্রতিদিন এক সময়ে (অপরাহ্ন ১ টার সময়) আশ্রয় হইয়া তৎপর শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, শ্বাসকষ্ট এবং করাস্থ প্রদেশে দপ্পদপানি বেদনা হয়, ঘর্ম্ম হয় না এবং অত্যন্ত পিপাসা বর্জনান থাকে।

ব্যবহার। হৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন আকারের অমুখ; তরুণ এবং পুরাতন বায়ুনল প্রদাহ, ফুফুস প্রদাহ (Pneumonia); ফুফুসাবরক বিষী প্রদাহ (Pleurisy); রক্তাংকাশ; বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মরুত প্রদাহ; ঐকান্তিক সঘিরাম বা পালাজ্বর; কষ্টকর মস্রা-শ্রাব এবং বাধকের বেদনা (Painful menstruation); তরুণ কর্ণ প্রদাহ

(Acute otitis); রক্ত বমন; পাকস্থলী এবং অন্ত্র প্রদাহ; (Gastritis and Enteritis); রক্ত মূত্রত্যাগ (Hæmaturia); হৃৎস্পন্দন; হৃদযন্ত্রের ক্লান্তির তরুণ প্রদাহ (Acute Pericarditis); হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জনিত অস্থখ; হৃৎ কপাটের অস্থখ জনিত বাতনা; হৃৎস্রাবস্থূল বা হৃৎস্বেদনা (Angina Pectoris) ইত্যাদি অস্থখে ক্যাক্টাস্ ব্যবহার্য্য। আভ্যন্তরিক ধমনির প্রদাহ এবং বিস্তৃতিতেও (Aneurism) ক্যাক্টাস্ বিশেষ উপকারী বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক বলেন। ডাক্তার লিপে (Dr. Lippe) বলেন যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব জনিত শিরঃ পীড়ায় চিকিৎসায় ক্যাক্টাস্ ব্যবহারে তিনি বিশেষ ফল পাষ্টয়াছেন। মোনি দাবের আক্ষেপ এবং বক্ষ ও উদর কৌণ্টেরের মধ্যবর্তী গোল পেশীর (Diaphragm) বাত বোগে ক্যাক্টাস্ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। শরীরের স্থানে স্থানে আঁটাবোধ, বিশেষতঃ হৃৎপ্রদেশে, বাহ্যিক দক্ষণ মনে হয় যেন আক্রান্ত স্থান একখানি লৌহ নির্মিত হাত বা পাত দ্বারা কসিয়া বাঁধা রহিয়াছে। পূর্বাঙ্কে (উদর-ময়), রাত্রিতে (হৃৎস্পন্দন, মাথা ধরা), বান পার্শ্বে শয়ন করিলে (হৃৎস্পন্দন), আহাবের পর (পাকস্থলীতে ভারি বোধ) অস্থখের বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্যাক্টাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্রান্ত স্থান একখানি লৌহনির্মিত হাত বা পাত দিয়া কসিয়া বাঁধা থাকিলে ত্রায় অল্পভূত হওয়া ক্যাক্টাসের একটা সর্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। ক্যাক্টাসের কার্য্যে সঙ্গ একোনাইটের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। হৃৎপিণ্ডের উপর ইহার কার্য্য নেত্রায় ত্রায়। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে ক্যাম্ফার, ডিজিটালিস্, স্পাইজেলিয়া ইত্যাদি ঔষধের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। একোনাইট্, ক্যাম্ফার, চায়না ইত্যাদি ক্যাক্টাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। নেপেল্‌স্ নিবাসী ডাক্তার রুবিনী (Dr. Rubini) যিনি ক্যাক্টাস্ প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মতে হৃৎপিণ্ডের তরুণ প্রদাহ এবং উহার দায়িত্বক অস্থখে এই ঔষধের মূল

আরোক ব্যবহার্য। দায়বিক অমুখে ৬,১০ এবং ৩০ ডাইলুশন উপকারী। হৃৎপিণ্ডের তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার অমুখেই লেখক ১ম দশমিক ক্রম এক কোটা মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকারের অমুখে তিনি ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রমও কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন। দায়বিক অমুখে কোন কোন চিকিৎসকের মতে ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশন নিম্ন ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকারী। লেখক এই ঔষধের ১০০ বা ২০০ ডাইলুশন কখনও ব্যবহার করেন নাই, অতএব উহার উপকারীতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না।

### ক্যাল্কেবিয়া ফস্ফরিকা,-ফস্ফেট্ অব্ লাইম্,-ক্যাল্ক-ফস্ (CALCAREA PHOSPHORICA,-PHOSPHATE OF LIME,-CALC.-PHOS.)

কোন এক বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদত ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে সুগন্ধ অর্থাৎ মিষ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩য় দশমিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় দশমিক ক্রম হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ দশমিক ক্রমেব আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ প্রকৃতি। এই প্রকার লক্ষণ প্রাপ্ত শরীরেই উপকার হয়, শরীরের যে যে অংশে ইহা পাতলা যাই, তথ্যেই অতি, মলিক এবং গ্রন্থিতেই ইহা অধিক থাকে। ইহা উক্ত অংশের পরিপাক্য কাৰ্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া উহার ক্ষয় বা বিনাশ সংঘটন করে। গ্রন্থি এবং পাক্ই ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। পিত্ত বা ছোট বাগ বা মলিকাগর অত্যন্ত চিড়্ চিড়্ এবং খিট্ খিট্ করে (ক্যান্ দিনা); সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাওয়া; কোন প্রকারের মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তাতে অশক্তি।

মস্তক। মাথার উপরিভাগ দিয়া যেন কোন শ্রাণী হায়া দিয়া বাই-তেছে একরূপ অশ্রুত হয়, বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার পশ্চাত্তাগে বহুক্ষ লাগিয়া বাঁধিয়াছে (বিদ্রেট্-আল্); মাথা গরম, চুলের গোড়ায় যেন



চিড়িক মারে; মাথার হাড়ের জোড় বন্ধ হইতে গৌণ হওয়া বা জোড় এক  
কয় বন্ধ হইয়া, পুনরায় খুলিয়া যাওয়া (Open fontanelles) (ক্যাক্-  
কার্ক); মাথার হাড় কোমল এবং পাতলা; কাগজ চাপিলে যেমন হয়,  
মাথা চাপিলেও স্বেচ্ছাপূৰ্ণ হয়, বাহ্য মাথার পশ্চাৎ ভাগেই অধিক হয়।

চক্ষু । আলোক, প্রধানতঃ মোমবাতি বা গ্যাসের আলোক চক্ষে  
নয় হয় না বা চক্ষে লাগে।

কর্ণ । কানে গান করা বা অন্তান্ত রকমের শব্দ হয় (ক্যাক্-কার্ক);  
কানের মধ্য এবং বহির্দেশে কীত, লালবর্ণ, ক্ষতযুক্ত, চুলকানি বিশিষ্ট এবং  
উষ্ণ; কান দিয়া কতকরক নিঃসরণ।

নাসিকা । সর্দি; শীতল ঘরে নাক দিয়া প্রচুর তরল স্লেয়া নির্গমন  
(পাল্‌স্); উষ্ণ বাতাসে এবং বহির্বাযুতে নাক দিয়া স্লেয়া নির্গমন এক হয়;  
অপরূহ নাক দিয়া রক্ত পড়া; বড় খাড়া রকমের নাসা বা নাকড়া।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে বেদনা, উপরের মাড়ির হাড়েই বাহ্য অধিক  
অম্লভূত হয় এবং বাহ্য ডাইন হইতে বাম দিকে বিস্তৃত হয়; উপরের ওষ্ঠ  
কীত (বেল, ক্যাক্-কার্ক, সোরিনাম), কঠিন, বেদনা এবং আলায়ুক্ত।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । শিশুগণের দাঁত উঠিতে গৌণ  
হওয়া (ক্যাক্-কার্ক) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর জীর্ণ জীর্ণ হওয়া; জিহ্বার  
অগ্রভাগ ক্ষত এবং আলায়ুক্ত (ক্যাক্-কার্ক, কার্কো-আনিমেল, কলোস,  
ক্যালী-কার্ক) এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকার জায় ফুসুড়ী; প্রাতিঃকালে  
মুখে তিক্ত স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা (ব্রাই, নাক্স-বম, কার্কো-  
আনিমেল, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্)। গলার মধ্যে টাটানি এবং কনকনানি,  
গিলিবার সময় বাহ্য অধিক অম্লভূত হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । অপরূহ পটার সময় অস্বাভাবিক  
ক্ষুধা; শিশু সমস্ত দিন স্তন হৃৎ পান করিতে চাহে; প্রত্যেকবার খাওয়ার  
সময়ই পেটে বেদনা বা যাতনার উদ্বেক হয়; মধ্যাহ্নে আহারের পর যুদ্ধ  
জালা এবং পাকস্থলীর অন্তান্ত প্রকারের অম্ল (কার্কো-আনিমেল); উদর  
উঠার পর উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে আলায়ুক্ত; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশে খালি খালিবেশ  
(ইম্পেন্স); গলার খেকুর দিয়া স্লেয়া তুলিবার সময় বমন; পাকস্থলীতে জালা

এবং মুখে জল উঠা; পাকস্থলী যেন বিস্তৃত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়।  
নাভির চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে বেদনা বা যাতনা এবং টাটানি বা কন্কনানি,  
শুষ্ক দ্বার দিয়া হর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণে যাহার উপশম হয়; উদরে জ্বালা-  
হুতব (একন্, আস্, ক্যাস্); উদরে কঠিনবৎ, চিন্টিনে বা প্রবল শূল  
বেদনার স্তায় বেদনা এবং তৎপর উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার। অত্যন্ত হর্গন্ধযুক্ত উদরাময় (আস্); রসাল  
ফলাদি খাইলেই উদরাময়; শুষ্কদ্বার দিয়া প্রচুর হর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু  
নিঃসরণ; শুষ্ক দ্বারে টাটানি বা চড়্‌চড়ানি বাহা শুষ্ক দ্বারের বহির্দেশেই  
অধিক অনুভূত হয় এবং উহা বসন্তে বসন্তে শুষ্ক দ্বারে স্ত্রী বিধানের স্তায়,  
জ্বালাযুক্ত এবং দগ্ধপিপা বেদনা বা যাতনা; শুষ্ক দ্বারে চুলকানি (সাল্ফ);  
শুষ্ক দ্বারে নালী বা বাহা শুকাইলে বুকে নানা প্রকারের অস্বস্তি প্রকাশ পায়  
(পর্যায়ক্রমে শুষ্কদ্বারে নালী বা এবং বুকের অস্বস্তি)।

মূত্রযন্ত্র। কোন ভারি দ্রব্য উঠাইবার সময় বা নাক কাড়িবার সময়  
মূত্রকোষ প্রদেশে প্রবল বেদনা; অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ এবং তদ্রূপ  
অত্যন্ত দুর্বলতা।

জননেন্দ্রিয়। গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইবার সময় পুরুবাক্স পাড়া  
হয়, কিন্তু তদ্রূপ ক্রীসহবাসের ইচ্ছা হয় না; শুষ্ক দ্বার এবং অণ্ডকোষাধারের  
মধ্যবর্তী স্থান (Perineum) হইতে পুরুবাক্স পর্য্যন্ত আগাগোড়া বেদনা-  
হুতব; অণ্ডকোষের স্ফীতি; অণ্ডকোষাধারে (গোতায়) ক্ষত এবং উহা হইতে  
কল্‌তানি পড়া। ক্রীলোকের জন্য প্রদেশে দুর্বল বোধ এবং কষ্টানুভব,  
মল মূত্রত্যাগের সময়ই বাহা অধিক অনুভূত হয়; যোনির লোমযুক্ত স্থানে  
উপর দিকে চাপাবোধ; যোনির সমুদয় অংশেই হুড়্‌হুড়ী এবং দগ্ধপানি  
ও তদ্রূপ পুরুব সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা; বালিকাগণের নিরমিত  
সময়ের অনেক পূর্বে উজ্জল লাগবর্ণ রক্তশ্রাব; যুবতীগণের নিরমিত  
সময়ের অনেক পর কাল্পে, অথবা প্রথমতঃ উজ্জল লাগবর্ণ এবং তৎপর  
কাল্পে রক্তশ্রাব; ত্বনের দুই লোন্‌তা হস্তদ্বারা দ্রুত শিশু পান করিতে  
চাহে না; ডিম্বের লাগের স্তায় খেত প্রদর নিঃসরণ (আমন্‌বিউর,  
বোরাস্), তন স্পর্শে অত্যন্ত টাটানি (ত্রাই)।

**শ্বাসযন্ত্র ।** স্বরভঙ্গ (একন্, হিপ্-গাল্, ফস), বাহা দ্রুতীভূত করার ভক্ত রোগী ব্যৱহার গলার খেঁকু ব দেয় ; অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক দীৰ্ঘ নিশ্বাস ভাগ (ইগ্নেস্, সিকেল্); শ্বাস প্রাশ্বাস ঘন ঘন এবং কষ্টকর ; কষ্টে মীত উত্তিবার সময় কাশি ; স্ফায়া হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত বুকেব সঙ্কোচন এবং শ্বাস কষ্ট, শয়ন করিলে বাহার উপশম হয় এবং উত্তিরা বসিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** বাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান ব্যৱনা এবং উগাতে বাতের বেদনার জ্বার বেদনা বা ব্যতনা (রাস্-টন্স) ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিমটবোধ ; সামান্ত বাতান লাগিলেই ঐ রকম হয় ; বাড়ি খিল ধরার জ্বার বেদনা বাহা প্রথমতঃ এক পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া অপর পার্শ্বে বিস্তৃত হয় ; পৃষ্ঠদেশ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে কনকনানি বা বেদনা (সিমিসিফ্, পাল্‌ন্) ; ভাজিলে বেকরণ হয়, কুঁচকির শক্তির পশ্চাৎ এবং নিম্নভাগে সেকরণ বেদনা বা ব্যতনা ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** বৃষ্টিতে ভিজিয়া পাতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশে বেদনা বাহা আক্রান্ত অঙ্গে যেন সর্সদা চলিয়া বেড়ায় (রাস্‌টন্স) ; সমুদয় অঙ্গে কনকনানি এবং উহাতে শ্রান্তিবোধ । ফর্ক এবং বাহতে বাতের বেদনা ; ক্ষত হইলে বেকরণ হয়, হাতের নখের চতুর্দিকে সেকরণ বেদনা, ডাইন হাতেই বাহা অধিক হয় । হাত পা নিম্নাঙ্গ অঙ্গাড, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা, উদ্বেগ, বাহার দরুণ রোগী আক্রান্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করার পর ক্রান্তিবোধ, দুর্বলতা, অস্থিরতা এবং উহাতে হুড়্‌হুড়্‌ এবং কুট্‌ কুট্‌ করা ; হাঁটুর উপরিভাগে বেদনা ; চলিবার সময় পায়ের ভিমে খিল ধরার জ্বার বেদনা বা ব্যতনা (একন্, ক্যাক্-কার্ক্, নাক্স-ণম্) ।

**নিদ্রা ।** অনবরত হাইতোলা এবং সমস্ত দিন ঘুমের অনিবার্য ইচ্ছা বা বিধান (নাক্স-বক্) ; প্রাতঃকালে সহজে ঘুম ভাঙ্গে না ।

**জ্বর ।** শীতবোধ এবং শরীরের স্থানে স্থানে হামা দেওয়ার জ্বার অল্পকৃত হয় ; রাত্রিতে শরীরের কোন কোন অংশে প্রচুর ঘর্ম ।

**ব্যবহার ।** যে সকল অস্থখে ক্যালেকেরিয়া কার্কোনিকা ব্যবহৃত

হইয়া থাকে, ক্যান্‌কেরিয়া কক্ষরিকাও এরি সেনসকল অস্থুখেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; গণ্ডমালা খাত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অস্থি এবং গ্রন্থির অস্থুখ ; অভ্যন্তরিক বহুর কোটিক রোগ (Tuberculosis) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ হেতু রোগ (Rachitis) ; হাড় জারিলে উহা পুনরায় জোড়া না লাগা ; মস্তিষ্কের পুৰাতন পোথ (Chronic Hydrocephalus) ; স্নুলের বালিকাগণের মাথা ধরা ; শিশুগণের কষ্টে দাঁত উঠা ; বাতরোগ ; অজীর্ণ রোগ ; শ্বেতপ্রসর ; বক্ষাকাশ ; মেরুদণ্ড দুই ভাগ হওয়া (Spina bifida) ; কোড়া ; মেরুদণ্ডের বক্রতা (Spinal Curvature) ; বৃদ্ধবয়সে মাথা ঘোরা ; অস্থকরের প্রথমাবস্থা (Incipient Tabes Mesenterica) ; উকর সন্ধির অস্থুখ ; শরীরে গণ্ডমালা জনিত কত : সোয়াস ফোড়া (Psoas abscess) ; টনুসিলের পুৰাতন বিবৃদ্ধি ; মানসিক শক্তির তেজের হ্রাস বা বিনাশ ; বক্ষাকাশ (Phthisis) বা অস্থকর (Tabes mesenterica) জনিত ~~শিরাম~~ বা পেটের অস্থুখ ; জীলোকের সন্তান প্রসবের পর অভ্যন্ত হ্রস্বলতা ইত্যাদি অস্থুখে ক্যান্‌কেরিয়া কক্ষরিকা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । উপরের ধরে নির্দিষ্ট জাতির উষ্ণিতে অভ্যন্ত ক্রান্তিবোধ ; সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই (জীলোকের) অস্থুখের বৃদ্ধি ; শিশু, বালক, বালিকাগণের জর্ণ শীর্ণ হওয়া ; তলুতলে কোঁচকান চর্ম বিশিষ্ট, শীর্ণ বালক বালিকাগণের অস্থুখ ; হাত পা শুটানের সময় পেশীর অগ্রভাগে টাটানি ; বালিকাগণের যৌবনাবস্থা বাউহার নিকটবর্তী সময়ের অস্থুখ ; শিশুগণের দাঁত উঠার সময় অস্থুখ ; বৃদ্ধ বয়সের অস্থুখ । প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়, নড়াচড়াতে, মোম বাতি বা গ্যাসের আলোকে, ঠাণ্ডা লাগিলে, আহারের পর, বসাল ফল খাইলে, বায়ুর পরিবর্তনে অথবা বৃষ্টিতে ভিজিলে অস্থুখের বৃদ্ধি এবং শরন করিয়া থাকিলে অস্থুখের উপশম ইত্যাদি ক্যান্‌কেরিয়া কক্ষরিকার সততগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । ব্যারাইটা কার্ব, ক্যান্‌কেরিয়া কার্বো-নিক, ক্রুমোরিক্‌ অ্যানিড্‌, আরোডিন্‌, কক্ষরাস্‌, সাইজিনিয়া, বার্কেরিস্‌, নাইট্রিক্‌ অ্যানিড্‌, কটা এবং সাল্‌ফারের কার্য্যের সহে ক্যান্‌কেরিয়া কক্ষরিকার কার্য্যের সাহুত আছে ।

ডাইলুশন বিচার। অহির অল্পে ১২, ২৪, ৩৬ দৈনিক ক্রমের ভাঁড়া উপকারী। বকাকান্ধেও উক্ত তিন ক্রমের ভাঁড়া উপকারী। বকাকান্ধ বা অহির অসম্পূর্ণ বিকাশ জনিত অল্পে অনেক চিকিৎসক আদত কফেট অব লাইন্ (Phosphate of lime) ২০ গ্রেইন মাত্রার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অথচ অল্পে ৬ষ্ঠ দৈনিক ক্রমের আরোক ব্যবহার্য। ১২ এক ৩০ ডাইলুশনও কোন কোন চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## ক্যাম্ফোরা, - ক্যাম্ফার, - (কপূর), - ক্যাম্ফ

(CAMPHORA, - CAMPHOR, - CAMPH.)

বচন এবং জাপান দেশ হইতে কাচের ছাত্র চক্ৰকে পরিষ্কৃত বে কপূর আইসে উহা বথানিয়মে রেক্টিফাইড্ (৩০ ওয়া। প্রভ) স্পিরিটে (Rectified spirit, - 60° Over proof) মিশাইয়া কপূরের মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক কর্পোরেশনের মন্ত্রনসালে ওলাউঠার ব্যবহার্য কপূরের মূল আরোক তিন প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। (১) হোমিওপ্যাথিক আনিক্তঃ মূল নহাড়া সামুদ্রিক তানিবানের মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর ১২ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিত হয়। ডাক্তার কুইনের (Dr. Quin) মতে ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর ৬ ভাগ রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত হয়। ইটালী দেশীয় ডাক্তার রুবিনী (Dr. Rubini's) মতে বহু পরিমাণ পরিষ্কৃত কপূর উহাতে তত পরিমাণ (৩৩৩৩ করিয়া) রেক্টিফাইড্ স্পিরিট মিশাইয়া মূল আরোক প্রস্তুত করিত হয়। এই প্রকার প্রস্তুত করা মূল আরোককেই ডাক্তার রুবিনী ওলাউঠা ক্যাম্ফার (Dr. Rubini's "Saturated Spirits of Camphor") বলে। এই প্রকার কপূরের আরোকই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখক এত দিন রুবিনী ক্যাম্ফারই সর্বত্র ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইং ১৮৩০-৩১ সনে অন্টারিওর মেলায় (International Exhibition of 1883-84) পর কলিকাতার

গুল্লাউঠার বে এক ডরানক আকারের মহামারী উপস্থিত হইরাছিল, সেই মহামারীতে কবিত্তীর ক্যান্সার ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল না পাইয়া, ১ ভাগ পরিষ্কৃত কপূর, ২ ভাগ রেঙ্কাইড্ স্পিরিট্ এই নিয়মে কপূরের আরোক প্রস্তুত করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসার ব্যবহার করিয়া লেখক বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন । সেই অবধি তিনি গুল্লাউঠা রোগের চিকিৎসার এই প্রকারে প্রস্তুত করা কপূরের আরোকেই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কসেকর্কা মৰ্জ্জা লব্ধকীয় বায়ু মণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । উহার গতি এবং জ্ঞান উৎপাদক শক্তি এবং সমুদয় দ্বারবিক মণ্ডলীকে অবসন্ন এবং দুর্বল করার দক্ষণ মাথা ঘোরা, এবং মস্তিষ্কের অবসন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । মৈত্রিক কিল্লী উত্তেজিত হইয়া সদি, উদরানয় হয় । পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মৈত্রিক কিল্লী এবং চর্ম্মের স্নীতলাবহা এবং জড়তা উৎপাদন করা কপূরের এক মুখ্য কার্য্য বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত । মূত্র এবং জননেত্রির আক্রান্ত হইয়া জননেত্রির স্নীতল এবং শিথিল হয় এবং মূত্র ক্রুদ্ধতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । সম্ভব্য দেখে কপূরের কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র বা অবিলম্বে প্রকাশ পায় এবং অনেককণ স্থায়ী হয় না ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

● মন । মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং অস্থিরতা (একন্, আস্, রাস্-টন্); অচেতনতা (আস্, বেল্, ওপিহাম); একাকি থাকিলে ভয়, প্রধা-নতঃ রাজিতে ।

● মস্তক । মাথাঘোরা এবং মাথার ভারিবোধ, মাথা হেট করিলেই বাহা অধিক হয় (একন্, বেল্, পাল্, সাল্); মস্তিষ্ক আঁটির ধরিলে বেদন হয়, সেরূপ মাথা ধরা; কপালের হাড়ের উপরিভাগে ঘূশ্-ঘূশে বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বিগ্ন; চক্ষুর কর্ণ মাধ্যবর্তী লোম শূন্য হানে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে (Cerebellum) একগাছি কিতা দিয়া কসিয়া রাখিলে বেদন হয়, মাথার সেরূপ সংকোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীর স্নীতল; ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে দপ্পদপানি (মেনিঙ্গেন্, আই) ।

চক্ষু । চক্ষু বিহীন ভাব বিশিষ্ট এবং বিকৃত ও এক দৃষ্টে জাহান (বেল, হায়োস্, ট্রায়ন) এবং চক্ষু বেন উহার কোটরের মধ্যে জ্বিলা রাই ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান বেন অভ্যন্ত উজ্জ্বল এবং চক্চকে হয় ।

নাসিকা । নাসার হঠাৎ পরিবর্তনে সন্ধিলাগা এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্রোতা নির্গমন ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা বা ফিকা, নীলবর্ণ এবং ক্রুর বা ক্রকনা; মুখমণ্ডল শিটা এবং উদেগ বা অভ্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আস্, প্রাধাম্) ; মুখাকৃতি বিকৃত, নীলের আভাষুক্ত, শীতল (বিরেট্-আল্‌ব্) ।

মুখগহ্বর । জিহ্বা শীতল (নেজা, বিরেট্-আল্‌ব্) ; বস অভ্যন্ত গুহ এবং স্বরভঙ্গ ।

পাকস্থলী এবং উদর । সকল আহার জ্যেষ্ঠ অতিরিক্ত স্বাদ অর্থাৎ আহার জ্বা সামান্য মিষ্ট হইলে অধিক মিষ্ট বলিয়া বোধ হয় বা সামান্য টক হইলেও অধিক টক বলিয়া অনুভূত হয় ইত্যাদি ; আহার বহা গলনালী এবং পাকস্থলীতে জালা (আস্, ক্যাঙ্ক্) ; পাকস্থলীতে ঠাণ্ডাবোধ (কল্‌চ) ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার জ্বায় বেদনা । বকুতের সমুদ্র আংশের কন্ধকনানি ; ক্ষুদ্র পাঞ্জরার হাড়ের নীচে সর্কোচক বেদনা যাহা কোমরের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; উদরের উপর এবং নিম্নভাগে ঠাণ্ডাবোধ হইয়া তৎপর উত্ত প্রদেশে ভয়ানক জালামুভব ।

মল । ঠাণ্ডা লাগিয়া শূলবেদনা এবং উদরাসয় (কলোস্, ডাল্‌ক্) ; ওলাউঠা, যাহাতে ভেদ বা বমন কিছুই হয় না (“ওক ওলাউঠা”) (আস্, কুপ্রাম্, বিরেট্-আল্‌ব্) ; গুহের জড়তাব দরুণ কোষ্ঠবন্ধ (আলাম্) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্র পরিমাণে স্বাভাবিক অপেক্ষা অভ্যন্ত কম ; মূত্র-বরোধ (একন্, হায়োস্, বিরেট্-আল্‌ব্) ; মূত্র কুচ্ছ ; জালা উৎপাদক মূত্র ত্যাগ (একন্, এশিস্, আস্, ক্যাঙ্ক্) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের স্রীসহবাসের ইচ্ছা একবারেই থাকে না ; অথকোষ উপর দিকে আকৃষ্ট হয় (আগ্‌নাশ্, আর্জেট্‌ নাইট্রিক্, ক্রোনা-রাম্, সাল্‌ফ্) ; অজডঙ্গ (আগ্‌নাশ্, ফস্ আস্) ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনলের মধ্যে স্রোতার সঞ্চার (আন্টি টাট্, ইপি-

কাক); খাদ্য প্রাথমিক প্রায়বদ্ধ হইয়া আইসে; চাপ পড়িলে বেয়শ হয় পাক-  
হীন মনো সেক্ষণ ফাঁপড় হওয়ার জায় স্থান কষ্ট।

হৃৎপিণ্ড এবং নাদী! হৃৎপ্রদেশে অভ্যন্ত বাতনা বা আঁটাবোধ  
একন্. আস্), অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ এবং ঘূর্ণাইবাণ অনিবার্য ইচ্ছা; নাদী  
মতান্ত্র ক্রুর, তর্জন এবং সূত্র না। (একন্. অংস)।

ব্যবহার। ওনাউট; সার্দ (প্রপমাবহার); মূত্রকৃচ্ছ্র; আক্ষেপ বা  
বিলম্বনা; আশ্রয় উত্তরনা; মূত্রগণা; তিষ্ঠিরনা; উগ্র বিবাক্ত উত্তর  
পদার্থ স্থান বিবাক্ত হইলে বাসন্ত। ওনাউঠাতে 'কপূর' ব্যবহার সম্বন্ধে  
চিকিৎসকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মতগুলি লেখক  
প্রণীত হোমিওপ্যাথিক মতে ওনাউঠার চোকাংনা; ২য় সংস্করণের ১১ পৃষ্ঠার  
উষ্টব্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। হাত পা ঠাণ্ডা (আস্, কুগ্রাম্, বিরেট-  
আল্); পারোডনে গিল ধরা (একন্, ক্যাক্স-কার্ক, নাইটিক্ আস্,  
নাক্স-এন্, সাইনিস, সান্); অত্যন্ত বলক্ষর এবং নিশ্চেষ্টতা; হঠাৎ  
অত্যন্ত বলক্ষা (আস্, নিফেল্); সমুদয় শরীর বরফের জায় শীতল; মূত্র  
এবং হিষ্টিরিয়া বোগা জায় আক্ষেপ; শীতল চট্‌চট্টা এবং অভ্যন্ত হৃদয়-  
কারক বর্ষ (আস্, তিষ্ঠিরনা; শরীরের বাতাস এবং আভ্যন্তরিক অংশে  
গিল ধরা; পশুনাগ, বাত; বাতাস, অক্ষমতা, মড়াচড়াতে, ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা  
বাতাসে অস্থির বৃদ্ধি এবং বতিবাতাসে অস্থির উপশম; যন্ত্রণাদির বিষয়  
স্মরণ হইলেই যন্ত্রণার দীর্ঘত হয়।

সমস্ত বিশিষ্ট ঔষধ। রক্তের উপর ক্যান্ফারের কার্য একো-  
নাইট, অসিনিক্ এবং বিগ্রেইন্স্ অলোবানেব জায়। মূত্র কৃচ্ছ্রে ইহার  
কার্য ক্যান্ফারিস্ ও টিবিবিস্তনা এবং কথু কখন বেলাডোনার জায়।  
ককিউলাস্ এবং ওপিথামের কার্যের সঙ্গেও ক্যান্ফারের কার্যের কতক  
সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ওপিথাম্ ক্যান্ফারের প্রতিষেধক।

ডাইলুশন বিচার। উহার আদিত আরোকই স' পাচর ব্যবহার  
হইয়া থাকে। মূত্র এবং হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে কবিরীর ক্যান্ফার অধিক



উপকারী। অত্যন্ত অল্পবে হানিধান, ফুইন এবং লেথকের বতাহুলসীরে যে ক্যান্ধার প্রস্তুত হয় তাহাই ব্যবহার্য। ওগাউঠাতে লেথকের মতে কবিণীর ক্যান্ধার অপেক্ষা অত্যন্ত প্রণালীতে প্রস্তুত করা ক্যান্ধার ব্যবহার করা উচিত। কবিণীর ক্যান্ধারে অনেক সময় পেট কাঁপিয়া উঠে, অত্যন্ত প্রকারের ক্যান্ধারে সেরূপ হইতে দেখা যায় না। লেথকের মতে শিশুর পক্ষে অর্ধ বা এক কোঁটা, ছোট বালক বালিকার পক্ষে ২ কোঁটা, এবং যুবা যুবতীর পক্ষে ৫ কোঁটার অধিক মাত্রায় কবিণীর ক্যান্ধার সেবন করণ, অনিষ্টকর।

## ক্যান্থারাইডিস্,—ক্যান্থারিস্,—ক্যান্ধ্

(CANTHARIDES,—CANTHARIS,—CANTH.)

ইহা এক মাছি বিশেষ। মরা শুকনা মাছির সমুদয় অংশ একত্রে খুঁড়া করিয়া এক প্পিরিতে ঘিশাহয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। চর্ম এবং শৈল্পিক বিস্তার উপরই ইহার কার্য্য অতি প্রবল। \* মুহম্মদের সমুদয় অংশের শৈল্পিক বিস্তার উপরই ইহার কার্য্য সর্বাঙ্গেক্ষা প্রবল, বাহ্যিক মরুণ উক্ত যন্ত্রের প্রবল উত্তেজনা এবং তৎপন্ন বিনাশকারক প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাকস্থলীর শৈল্পিক বিস্তার প্রবাহবৃত্ত হইয়া থাকে। চর্মের উপর ইহা বিনপের ক্ষার (Erythematous) প্রবাহ এবং ফোকার ক্ষার কুঙ্কী উৎপাদন করে। আনো-প্যাথিক চিকিৎসকগণ শরীরে ফোকা উৎপাদন করার জন্য চর্মের উপর ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বারম্বার মুহম্মদের ইচ্ছা, অল্প পরিমাণে মুহ গির্গমন এবং মুহম্মদের সময়, উহার পূর্বে এবং উহার পর, মুহম্মদীতে প্রবল কর্তনবৎ বা আনোবৃত্ত বেদনা ক্যান্থারিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। অত্যন্ত অস্থিরতা; উগ্র প্রলাপ; মনের উত্তেজনা এবং অস্থি-

যত্ন বাহা প্রকৃত ক্রোধে পরিণত হয়; অনবরত উগ্র বা সম্পূর্ণ পানিপের  
 জার প্রকাশ (বেল, হায়োস্, ট্রামন্); বাহ্যিক খাওয়া খাওয়া বাহ্যিক  
 উজ্জ্বল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কান্দা এবং কুকুরের ডাক ডাকা, কঠিনালী  
 স্পর্শ করিলে বা জল পান করিলেই বাহ্যিক উজ্জ্বল বা পুনরুজ্জ্বল হয়  
 (বেল); বাচলানী এবং প্রতিবাদ করার স্বভাব (ব্রাই, নাক্স-বন্)।

মস্তক । মাথার পশ্চাৎভাগে স্ট্রুটবিধানের জার বেদনা বা বাতশা;  
 দৃষ্টিকে জালা এবং টাটানি (একন্, আর্গিকা); মাথার পাশে জালা-বাহা  
 গ্রীবাদেশ হইতে আরম্ভ হয়; কপালের দুই পাশে মণ্ডপানি (একন্,  
 বেল); মাথার অধিক পরিমাণে মড়া চাম ওষুধ পড়ে (মেজিরিয়াম);  
 আঁচড়াইবার সময় মাথার চুল উঠিয়া বা পড়িয়া যায় (ক্যাক্-কার্ব, গ্রাক্,  
 নেটাম্-মিউর, নাইট্রিক্-আস্, সিপিগা, সাল্-ক্)।

চক্ষু । চক্ষুর আকস্মিক সঞ্চালন; চক্ষু আঁশ্রনের জার উজ্জ্বল এবং  
 হ্রিভাব বিশিষ্ট (বেল, হায়োস্, ট্রামন্); চক্ষু জালা এবং টাটানি; চক্ষু  
 হরিদ্রাবর্ণ (চায়না, চেনিডন্, পডোক্, আয়োড্, স্লাবাম্) এবং সবুজ বস্তু  
 যেন হরিদ্রা বর্ণের জার দেখায়।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল অত্যন্ত যন্ত্রণার চিহ্নযুক্ত (আস্); বেদনা  
 যন্ত্রণাদি ভোগের সময় এবং উহার পর মুখমণ্ডল মৃতবৎ (বিরেট্-আল্-ব)।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বর, আহার বহা গলনালীর  
 উপরিভাগ, আহারবহা গলনালী এবং পাকস্থলীতে জালাগ্ৰস্তব (আস্,  
 আইরিস্, নাক্স-বন্); মুখগহ্বর এবং আহার বহা গলনালীর উপরিভাগের  
 প্রদাহ (আস্, বেল); জিহ্বা গাঢ় ফাদযুক্ত (Furred) এবং উহার ধার  
 লালবর্ণ; জিহ্বার নীচের গ্রন্থি স্ফীত এবং লালবর্ণ; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের  
 পশ্চাৎভাগের কতক অংশে ছাল উঠিয়া যায় এবং কতক অংশে কোঁকায়  
 জার ফুসুড়ী; মুখগহ্বরের শুষ্ক; মুখগহ্বরে জালাযুক্ত বেদনা (একন্, আস্,  
 ক্যাপ্); দাঁত লাগা (Lock-jaw) এবং দাঁত দিয়া কড়মড় শব্দ  
 করা। গলার মধ্যে জালাগ্ৰস্তব (আস্, ক্যাপ্, নাক্স-কর), বাহ্যিক দৃশ্য  
 মনে হয় যেন গলা আঁশ্রনের উপর রহিয়াছে; গলার মধ্য প্রদাহযুক্ত এবং  
 গাঢ় স্লেষ্মার জার পদার্থ দ্বারা আবৃত; গলার মধ্য স্ফীত (বেল, নাক্স,

কাপালী-বাই); গলার মধ্যের পশ্চাৎভাগের সঙ্কোচন এবং উহাতে প্রবল বেদনা; টম্‌সিলের প্রদাহ এবং তদ্রূপ তরল পদার্থ গিলিতে কষ্টানুভব (বেল্, হায়োস্, ট্রান্‌); মুখগহ্বরে কোষার জ্বর ফুসুড়ী; মুখগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগে এবং ডাইন টম্‌সিলে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বর ক্ষত।

পাকস্থলী এবং উদর। আহারে অকুচি; অত্যন্ত প্রবল লিপাসী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের তরল পদার্থে অকুচি ও গলার মধ্য এবং পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, আইরিস্, কন্‌, মেজিরিয়াম্, বিরেট্-আল্‌ব্); পাকস্থলী প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, নাক্স-বম্, কন্‌); পাকস্থলী অত্যন্ত টাটায় (ব্রাই, নাক্স-বম্, নাক্স-বম্), বমন এবং বমনোদ্বেগ (আটি-টার্ট্, ইলি-কাক্); পাকস্থলী এবং মূত্রাধারে এত বেদনা হয় যে উহাতে সামান্য চাপ দিলেই যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া রোগীর আক্ষেপ হয়। উদরের ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি ও প্রচাপনে উহাতে অত্যন্ত বেদনানুভব (বেল্); গলা হইতে মল দ্বার পর্যন্ত আহার বহা নালীতে আগা গোড়া প্রবল জ্বালাযুক্ত (আস্); উদরে কর্তনবৎ বেদনা (একন্, আস্); যকৃত প্রদাহ।

মল এবং মলদ্বার। তরল ভেদের পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা (আস্, ব্রাই); শুষ্ক দ্বার এবং অভ্যন্তরীণ দ্বারের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বেদনা বা যাতনা, মূত্রাধারের প্রীবা হইতে বাহার উৎপত্তি বলিয়া অনুভূত হয়; দান্তের সময় উদরে কর্তনবৎ বেদনা; দান্তের পর শীত এবং কন্‌ (মাক্স); রক্তমাশর; অল্প টাচিয়া কেলিলে বেরূপ হয়, সাদা, লাল, চকচক মাছ মাংস ধোয়া জলের জ্বা, ছেকড়া ছেকড়া পর্দার জ্বা পদার্থযুক্ত লেক্রপ স্লেমা ভেম (কলোস্, কল্‌চ); মল রক্ত মিশ্রিত স্লেমা (মার্ক্); চট্‌চটিয়া, রক্তমিশ্রিত, সাদা বা রক্তমিশ্রিত স্লেমা (মার্ক্-কন্‌); টাট্‌কা রক্ত মলত্যাগ; লব্ধ বা রক্তমিশ্রিত স্লেমা ভেম; দান্তের পূর্বে পেটে প্রবল শূল বেদনা; দান্তের সময় শুষ্কদ্বারে জ্বালাযুক্ত; দান্তের পর কষ্টদানক কোষ পাড়া এবং শুষ্ক দ্বারে জ্বালাযুক্ত, কামড়ানীর জ্বা বা হল ফুটানের জ্বা প্রবল বেদনা বা যাতনা।

মূত্রাশয়। মূত্রকোষের প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকোষে

দ্বিভিন্ন কেশা, হলফুটান বা আলাবুক বেদনা বা বাতনা (টিরিবিহ্) ;  
 মূত্রকোষ হইতে মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters) দ্বারা মূত্রাধার পর্য্যন্ত  
 আগাগোড়া চাপিয়া ধরার জার বেদনা বা বাতনা; অনবরত মূত্র ত্যাগের  
 ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে একবারে কএক কোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না  
 এবং মূত্রের সঙ্গে কখন কখন রক্তও মিশ্রিত থাকে (ক্যানাবিস্-স্যাট্,  
 ক্যান্স্, টিরিবিহ্); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত আগা এবং  
 কর্তনবৎ বেদনা (ক্যান্স্, নাইটিক্-অ্যাস্); প্রমেহ রোগ এবং মূত্র নালীতে  
 টাটানি, কত এবং উহা হইতে রক্ত পড়া; মূত্র নিঃসারক নালী (Ureters)  
 হইতে পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত কর্তনবৎ বা সঙ্কোচক বেদনা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ  
 চাপিলে যাতার কতক উপশম হয়; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরার  
 জার ঘৃণ্ ঘৃণ্ বেদনা; মূত্রাধারে প্রবল বেদনা বা কীতনা এবং উহার  
 সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও বারম্বার কোঁথপাড়া; মূত্রাধারে  
 পুশানি (মার্ক্-কর); মূত্রাধারের গ্রীবার কর্তনবৎ প্রবল বেদনা, মূত্র-  
 নালীর শেষ পর্য্যন্ত বাগা বিস্তৃত হয়; মূত্রনালী দ্বারা রক্তপড়া; মূত্রত্যাগের  
 সময়, উহার পূর্বে এবং পরে মূত্রনালীতে কর্তনবৎ এবং আলাবুক বেদনা  
 (আন্টি টার্ট্, ক্যানাবিস্-স্যাট্); বারম্বার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা, কিন্তু বেগ  
 দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্রনালীতে আলাবুকৃত হয় (নাইব্-বন্);  
 মূত্র একধারে নির্গত না হইয়া বহুধারে নির্গত হয় (ক্যানাবিস্-স্যাট্); মূত্রা-  
 বরোধ এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টাত্তব; রক্তমিশ্রিত হইলে বেরূপ হয়, মূত্র  
 সেরূপ লালবর্ণ (একন্, কার্কো-বেজ্); মূত্র কালচে (একন্); মূত্র রক্ত  
 মিশ্রিত (অ্যাস্, মিলিকলিয়াম্), ঘোলাটিয়া, পরিমাণে অল্প (ভিজিট্);  
 রাতিতে ভাতের পাঠনা ফেনের জার মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রে সাদা তলানী  
 পড়ে (ক্যাক্-কার্ক্, কলচ্)।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষাঙ্গের মাথার অত্যন্ত কষ্টদায়ক ক্ষতি; পুরু-  
 ষাঙ্গ অনবরত খাড়া হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত কষ্টাত্তব (প্রমেহ রোগে) ও  
 জীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা (কন্স); পুরুষাঙ্গ অনবরত ক্রমগত খাড়া হইয়া  
 থাকে, কিন্তু উহার দরুণ জীসহবাসের ইচ্ছার উল্লেখ হয় না বটে, কিন্তু  
 মূত্রনালীতে আগা গোড়া আলাবুক বেদনা বা বাতনা অগ্রকৃত হয়;

জীৱনহাসের ইচ্ছা এত বৃদ্ধি হয় যে উহার দক্ষণ রাহিতে যুগের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। জীলোকের ঘোনি অত্যন্ত ক্ষীত এবং উহাতে উত্তেজনা বা টাটানি (আসফিটিডা); ডিবকোষ প্রদাহ এবং তদক্ষণ ডিবকোষে কর্তনবৎ এবং আলায়ুক্ত বেদনা; ঘোনিতে অত্যন্ত চুলকানি এবং তদক্ষণ পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; ঘোনিদ্বারে ভয়ানক চুলকানি (কোনারাম্, মার্ক্); নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতিরিক্ত রক্তঃস্রাব (ক্যাক্-কার্ক্, মাল্-বম্); অল্প পরিমাণে কাল্-৫ রক্তঃস্রাব (পাল্-স্)।

খাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে খাসবহ্নে অত্যন্ত দুর্বল বোধ; বৃকে হৃদী বিধানের জাব যাতনা (ব্রাই, কন্, কালী-কার্ক্), ডাইন পার্বেই বাহা অধিক অমুভূত হয়; ফুফুসাববক কিল্লীর মধ্যে দূষিত জলের সঞ্চার; খাস কষ্ট; হৃৎস্পন্দন; মূত্র পরিমাণে অল্প এবং মূচ্ছার ভাব।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন; হৃৎস্রাবক কিল্লী প্রদাহ (Pericarditis) এবং হৃৎস্রাবক কিল্লীতে দূষিত জলীয় পদার্থের সঞ্চাব; নাড়ী দুর্বল, এবং অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে; মূচ্ছার ভাব।

পৃষ্ঠদেশ । কোমর, মূত্রকোষ এবং উপরে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র তাপের সময় এত আলা যন্ত্রণাব উদ্ভেক হয় যে উহার দক্ষণ এক কোঁটা মূত্র তাপ করিতেও বোগী অত্যন্ত কোঁথার বা কোঁকার এবং চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠে।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । শায়ে পাতার তলার কত হওয়ার জার আলায়ুতব, ঘাটার দক্ষণ এক বাপও চলিতে পারা যায় না; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছিড়িয়া ফেলার জার বেদনা, হাত ঝাড়া ঘর্ষণে বাহির উপ-শম হয়।

চর্ম্ম । চর্মে বিসর্পের জার (Erysipelatous) প্রদাহ এবং আক্রান্ত স্থানে ফোকার জার ফুফুড়ী (বাস্টিগ্); শরীরের স্থানে স্থানে কত হওয়া বা ছিড়িয়া ফেলার জার বেদনা; ফোকা পড়ার পূর্বে আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত আলায়ুতব (পুড়িলে বেক্ষণ হয়)।

বাবহার । মূত্রাধারের তরুণ প্রদাহ (Acute Cystitis); মূত্রকোষের তরুণ প্রদাহ (Nephritis) এবং প্রদাহ সম্বলিত মূত্র কৃচ্ছ; রক্ত মূত্রঃ

(Haematuria) : মূত্র কোষের রাইট্‌স্ ডিজিজ্ (Bright's Disease) : মূত্রাবরোধ ; ওলাউঠা রোগের মূত্রাবরোধে বিশেষ উপকারী ; শুক্রকরণ (Spermatorrhoea) ; প্রমেহ বোগ (তকন ও পুরাতন আকারের) ; পুরুষ বা স্ত্রীসহবাসের অভ্যাস ইচ্ছা ; ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis) ; ধবজভঙ্গ এবং বক্ষ্যাত্ত ; পাকস্থলী প্রদাহ ; অগ্ন প্রদাহ ; মলুট্টকাবেল জায় আক্ষেপ ; বিসর্প ; ক্ষত ; পোড়া ঘা ; হুটুত্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) ; পচন বিশিষ্ট ঘা বা গ্যাংগ্রিন্ (Gangrene) ; শাস্তক কিল্লী (Serous membranes) প্রদাহ ; লম্বাহাবরক কিল্লী প্রদাহ ; ফুফুসাবরক কিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) ; (একো-নাইট্ এবং ত্রাইওনিয়ান পর) ; আভ্যন্তরিক অংশের ছান উঠা এবং ক্ষত হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থাব লক্ষণ ইত্যাদি রোগে ক্যান্সারিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । জননেত্রির এবং মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল ; শবীরের নানা কোটরে জ্বালানুক বেদনা এবং ক্ষত ও তদ্রূপ টাটানি ; ডাইন অংশই অধিক আক্রান্ত হয়, (ব্যাপ্ট্, বেল্, আইরিস্) ; অভ্যন্তরীণতা, নিস্তেজতা এবং অবসন্নতা বা মূর্ছার ভাব ; সমুদয় শরীরেই জ্বালা এবং টাটানি ; আক্ষেপ এবং উগ্রাব সঙ্গে সঙ্গে মূত্র-কৃচ্ছ বা মূত্রাবরোধ এবং জলভয় (Hydrophobia) লক্ষণ ; কাকি খাইলে অস্থির বৃদ্ধি এবং শবন কবিতা থাকিলে অস্থির উপশম ইত্যাদি ক্যান্সারিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । মূত্র যন্ত্রের উপর ক্যান্সারিসের কার্য্য ঈরিবিছিন্নর জ্ঞান । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য আশ্চর্য্যক, মার্কিউরিয়াম্ ক্রোসাইবাস্, সিলি, সাবাইনা, ক্যানী-বাইক্রিনিকাম্, এপিস্, ক্যান্ডার, ক্যানাবিস্ সাটাটো, কোপেইনা, একোনাইট্, বেলাডোনা, ক্যান্সিকাম্, ফক্ষরাস্ এবং পাল্ফাংগের কার্য্যের জ্ঞান ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট্, ক্যান্ডাব, লরোসিরেগাস্, পাল্‌সেটো, ক্যান্সারিসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ওয় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পুরাতন রোগে কোন কোন সময় ৩০ ডাইলুশন দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক ফল পাওয়া যায় । বাহ্য প্রয়োগে মূল আরো এক ডোজ

৫০ ভাগ কলে মিশাইয়া লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগান যাইতে পারে। ১ ভাগ মূল আবেক ৯৯ ভাগ কলে মিশাইয়া লেখক সচরাচর বাহ্য প্রয়োগে লোশন ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## কষ্টিকাম্,—কষ্ট ।

((CAUSTICUM,—CAUST.))

কোন এক বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধানব হটেতে আদত কষ্টিকাম্ বা মূল আরোক ক্রয় করিয়া উহার ১ ভাগ ৯ ভাগ বেবটিকাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ১ম দশমিক ক্রমের আবেক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ততোধিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হয় না। যাহা মূল আবেক বলিয়া বিক্রী হইয়া থাকে উহাকে প্রকৃত পক্ষে মূল আরোক বলা যাইতে পারে না।

সাধারণ ক্রিয়া।) মেডেলা অব লম্বোটা (Medella oblongata) এবং নিউমোগাস্ট্রিক্ নার্ভাস (Pneumogastric nerve) নিম্ন শাখার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহাব দ্বারা স্ববউৎপাদক যন্ত্রের পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের যোজক শৈল্পিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়। ইহা মুখ-মণ্ডলের পেশী এবং গ্ৰহস্থানের স্ফোটক যন্ত্রের কার্যের সফলকারী পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। অতএব পক্ষাঘাত এবং কণ্ঠনালী ও বায়ুনলের স্লেয়া জনিত বোগেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্লেয়া জনিত রোগ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতা উৎপাদন করা কষ্টিকমের এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। স্বরন শক্তির দুর্বলতা; সমদা নিশ্চলতা, ভয় এবং নিরাশী ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চলতা; সমদা চিন্তাশূন্য, অস্থির এবং কোন প্রকার কাজ করিতে অশক্তি; সর্বদা রাগ করা এবং খিট্ খিট্ করা (ক্যাণ্‌ক্-ফন্, কাম্, সিনা); সকল বিষয়ে অমনযোগ বা কোন বিষয়েই মন নিবিষ্ট না হওয়া; কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না।

মস্তক । মাথা ঘোরা এবং তদ্রূপ সম্মুখপানে বা পার্শ্বের দিকে টলিয়া পড়ার উপক্রম হওয়া ; রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকিলে মাথা ঘোরা ; বিছানা ছইতে একবার উঠিয়া পুনরায় শয়ন করিলে মাথাঘোরা ; কোন বস্তুব দিকে এক দৃষ্টে তাকাইবা থাকিলে মাথাবোরা ; মাথার সমুদয় অংশেই খনন করার জায় যাতনা অল্পভূত হয় ; মাথার উপরিভাগে দপ্পপানি বা স্ফী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ; কপালের ডাইন পার্শ্বের উচ্চ স্থানে চাপিয়া দগ্নের জায় বেদনা বা যাতনা ; মাথার উপরিভাগের কোন এক নির্দিষ্ট কুস্থ স্থানে মোচড়াইয়া পড়া বা খেঁতনিয় বা ওয়ার জায় বেদনা, স্পর্শ করিলেই যাহা কেবল অল্পভূত হয় ; কপালের জুই পার্শ্বে স্ফী বিধানের জায় বেদনা ; মাথার চুলকানি (গ্রাক, নার্ভটিক্-আস, কস্, সিপিয়া, সাল্ফ্) ; মাথার হাড়ে কসিবা ধবা (আসেবাম্, কস্) ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ এবং তদ্রূপ চক্ষে আলোবুক এবং হল ফুটানের জায় বেদনা ; চক্ষে গুল্মভব এবং চক্ষে আলোক সহ হয় না ; বালি প্রবেশ করিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ চাপাবোধ (আস্, ইয়েস্, নেট্রাম্-মিউর, সাল্ফ্) ; চক্ষু, প্রধানতঃ চক্ষুর পাতা চুল্কার (ক্যাক্-কার্, সাল্ফ্) ; চক্ষুর পাতায় ভারিবোধ, যাহার দরুন চক্ষু বুজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় (কোনারাম্) বা চক্ষুর উপরেব পাতার পক্ষাবাত (জেলন্, প্রাষাম্, সিপিয়া, জিকাম্) ; চক্ষুর বেক্টাই নামক পেশীর দুর্গতিতা ; চক্ষুর নাকের নিকটবর্তী কোণে ছালা এবং চুনকানি (আস্) ; চক্ষুর সম্মুখ পার্শ্বের ডানা বাড়ার জায় ধড়্ ফড়্ করা বা আগুণের কণা জায় কণা ভাসে (সাই-ক্রেমনন্, কস্, মার্ক্) ; আলোক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাতলা বা সফ কাপড থাকিলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ ব্যাপ্তা দেখা (বারাইটা, ক্রোকাশ, বাস্টেজ্, সাল্ফ্) ; পক্ষ মেঘ বা কৃয়াশার মধ্য দিয়া তাকাইলে বেক্রপ হয়, চক্ষে সেক্রপ দেখায় (নাক্স-বম্, কস্, পাল্গস্) ; নাক বাড়িয়া কক্ষ ফেলিবার সময় কণকালের জন্ত চক্ষে ব্যাপ্তা দেখা ।

কর্ণ । কানে সোঁ সোঁ, বজ্ বজ্ শব্দ হওয়া (বেল্, চায়না) ; কথা বলার সময় এবং চলিবার সময় পায়ে শব্দ কানে প্রতিধ্বনিত হয় (মার্ক্, কস্) । ডাইন কানে গুচী বিধানের জায় যাতনা ।



নাসিকা । শুকনা সর্দি এবং তদ্রূপ নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া থাকা (নাস-বন্ধ) ; বারম্বার হাঁচি দেওয়া ; নাকের আগায় ত্রণ ; নাক দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব ; নাকে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আঁচিল (Warts) ।

মুখমণ্ডল । ডাইন গালে কসিয়া ধরার ভায় ক্ষণস্থায়ী প্রবল বেদনা, যাহা কানে বিস্তৃত হয় ; মাড়িতে কসিয়া ধরার ভায় বেদনা বা ব্যতনা, যাহার দরুণ রোগী (স্ট্রীলোক) হা করিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং একটী দাঁত লম্বা হওয়ার ভায় অনুভূত হওয়ার দরুণ সে চিবাইতে পারে না (মার্ক) ; মুখ মণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত ; নিম্ন মাড়িতে বাতব বেদনা ; মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ; মুখমণ্ডলে আলায়ুজ চুলকানি বিশিষ্ট কুসুড়ী যাহা হইতে কল-তানি পড়িয়া শুকাইয়া থোলা (চুমটী) পড়ে ।

মুখ গহ্বর এবং গলার মধ্য । কোন দ্রব্য চিবাইবার সময় গালে কামড় পড়ে ; দাঁত নড়িয়া লম্বা হয় এবং তদ্রূপ অত্যন্ত বেদনার উদ্বেগ হয় (লাইকোপ্, নাইট্রিক-আম্), দাঁতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলা বা ফুটী বন্ধানের ভায় বেদনা (পাল্ন্স) ; মাড়ি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটার (কার্কো-বেজ্, মার্ক) ; জিহ্বার অগ্রভাগে কষ্টদায়ক ফোঁসার ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুড়ী ; মুখে তৈল বা চর্শ্বির ভায় বা পচা স্বাদ (কাম্, পাল্ন্স) ; গলা কাপাইয়া অতি কষ্টে অস্পষ্টরূপে কথা বলা (হারোস্, ট্রায়ন্) ; কথা বলার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার দরুণ কথা বলিতে অশক্তি (ডাল্ন্স, জেল্ন্স, হারোস্, নেজা, নাস-বন্ধ) । গলার মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যাহা কালি দ্বাবাও তোলা যায় না এবং যাহার দরুণ রোগী উহা গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয় ; গলার মধ্যে শুষ্ক, ছাল উঠিয়া যাওয়া, টাচিয়া ফেলা অথবা ফুড়-ফুড়ীর ভায় অনুভূত হয় (আমন্-কার্ক, কার্কো-বেজ্, ফন্, পাল্ন্স) ; নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে কোন ঠাণ্ডা পদার্থ ঠেলিয়া উঠিতেছে গলার মধ্যে এরূপ অনুভূত হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । মিষ্ট দ্রব্যে অকচি ; মুখে চর্শ্বির ভায় স্বাদ ; চুল পোড়াইলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেক্রপ অনুভূত হয় ; অত্যন্ত উষ্ণ উদগার উঠা (লাইকোপ্) ; কাঠ উদগার বা স্বাদশূন্য উদগার উঠা ; পাক-স্থলীতে বেদনা, শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার উপশম হয় ; দীর্ঘ নিশ্বাস

প্রাণসের সময় পাকস্থলীর মধ্যে আকড়াইয়া ধরার ভাৱ, চিন্তিনে বেদনা ; পাকস্থলীর মধ্যে চাপিয়া ধরার ভাৱ বেদনা ; ক্ষীত প্রদেশে স্থলীবিধানের ভাৱ বেদনা বা যাতনা ; উদর বেদনা বাহ্য দরুণ বোণী (আলোক), হাঁটু ওটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ, কলোস, আইরিস), আহাৰ করিলে বা কোমরে কসিয়া কাপড় পরিলে বাহ্যর বুদ্ধি হয় ; শূল-বেদনা এবং উদর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় উচ্চাত্তব, সমুদয় শরীরে শীত বোধ, শয়ন করিয়া থাকিলে যাতাব উপশম হয় ।

মল এবং মলদ্বার । অশ্রোণ এবং শুষ্ক দ্বাবে বড় কঠিন এবং হলফুটানের ভাৱ বা আনায়ুক্ত বেদনা বিশিষ্ট ভুলী, স্পর্শ করিলে যাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটার, যাহান দরুণ রোগী চলিতে অত্যন্ত অসহ বেদনা বা যাতনা অনুভব করে ; শুষ্ক দ্বাব ফাটা (Fissure in the anus), বাহ্যর দরুণ চলিবার সময় অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় ; শুষ্কদ্বার দিয়া বারম্বার অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দৃষিত বায়ুনিঃসরণ, শুষ্ক চাপাবেধ, শুষ্ক বাবম্বার হঠাৎ ছুরী বিধানের ভাৱ প্রবল বেদনা ; শুষ্ক মাটিয়া ধরা এবং চুলকানি ; শুষ্ক দ্বাবে চুলকানি (ক্যাম্ সাল্‌ক্) ; বাবম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; দাঁড়াইলে মল অপেক্ষাকৃত ভালরূপে নির্গত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন, তলতলে নেড় এবং চক্‌চকে চর্কিয়া ভাৱ স্লেয়া দ্বারা আবৃত ; মল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু নেড় (কম্) ; রক্ত মিশ্রিত মলভাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কর মধ্যে আলা এবং টাটানি, ভগন্দর (Fistula in ano) ।

মূত্রাশ্রয় । মূত্রাধারে অনেককাল মূত্র সংকীর্ণ থাকি বা মূত্রকোষের দরুণ মূত্রাধারের পক্ষাঘাত ; যুগ্মরোগের অসাড় বা অনিচ্ছা পূৰ্বক মূত্র ভাগ (আস্, কুগ্রাম্) ; কাশিবার সময় অসাড় বা অনিচ্ছা পূৰ্বক মূত্র নির্গমন (কল্‌চ) ; হাঁচি পেওয়া বা নাক কাড়িয়া কক্ষ ফেলিবার সময় অনিচ্ছা পূৰ্বক মূত্র নির্গমন (নেট্রাম্ মিউর, পাণ্‌স্, জিকাম্) ; মূত্রনালাতে জালা (এপিস্, একন্, আণ্টি ক্রুড, কাস্‌) ; মূত্রাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র ভাগের বারম্বার টেচ্ছা, এবং কখন কখন মাত্র একক ফোঁটা বা কল্প পরিমাণ মূত্র বহিয়া পড়ে (একন্) ; মূত্র এত অনায়াসে নির্গত হয়, যে মূত্র যে অসাড় নির্গত হইয়াছে তাহা রোগী কিছুই টের পায় না (আজেন্ট্-

নাইট্রিক) : মূত্র কান্ঠে কটাবর্ণ (ব্রাই), ঘোলাটিয়া এবং মূত্র কোন পাঞ্চে ধরিয়া রাখিলে অস্বচ্ছ বা ঘোলাটিয়ার জায় দেখায় ; দিবা রাত্রি অনন্তরত অসাড়ে মূত্র নির্গমন।

জননেন্দ্রিয়। কোন কঠিন পদার্থ দিয়া প্রবল বেগে চাপিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, ডাইন অত্যকোশে সেক্রপ চাপিয়া ধরার জায় বেদনা (একন্, আর্জেন্ট-নাইট্রিক) ; স্রীষহবাসের সময় মূত্রনাশী দিয়া ধাতুর সঙ্গে রক্ত পড়ে। স্রীলোকের পুরুষ সহবাসে অত্যন্ত অনিচ্ছা ; নিয়মিত সময়ের অনেক পর এবং প্রচুব পরিমাণে রজঃস্রাব ; কেবল দিনের বেলা থানা থানা দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে থেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জায় বেদনা এবং যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি ; রাত্রিতে রক্তস্রাব একবাবে বদ্ধ হয় ; বালিকাগণের অতিকষ্টকর প্রথম রজঃস্রাব (পাল্‌স্) ; রজঃস্রাবের সময় তলপেটে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা বা যাতনা এবং উদরাময়, রাত্রিতে দুর্গন্ধযুক্ত স্বেতপ্রদর (আম্বা) বাহা রজঃস্রাবের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয় ; স্তনের বোঁটা ফাটা এবং ক্ষত-যুক্ত ও উহা দাঁদের জায় ফুকুড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত ; স্তনে বর্ণোচিত পরিমাণে দুগ্ধ থাকে না।

শ্বাসযন্ত্র। কঠিনালীহ পেশীর জড়তার দরুণ রোগী সজোরে কথা বলিতে পারে না (এরাস্, ফন্) ; স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময়ই যাহা অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে চাচিয়া ফেলার জায় অস্বভূত হয় (নাস্, বন্) ; অনেক দিন ধরিয়া সজোরে কথা বলিবার অশক্তি (পাল্‌স্) ; বায়ুনের মধ্যে শুষ্কভব ; প্রবল কাশি, কখন কখন শুষ্ক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকেব ডাইন পার্শ্বে বেদনা ; রাত্রি এবং প্রাতঃকালে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকের মধ্যে ঘেন শ্লেষ্মা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে ; বৃকে টাটানি, স্ফু-স্ফু, থাকিয়া থাকিয়া যাহার উদ্রেক হয় এবং বাহা বায়ুনের মধ্যে আগা গোড়া অস্বভূত হয় ; কাশিবার সময় বায়ুনে বেদনা বা টানানি, যাহার দরুণ ঘুম ভাঙিয়া যায় ; গলার মধ্যে হামা দেওয়ার জায় অস্বভূত হওয়ার দরুণ বা মাথা হেট্ করিয়া উপুড় হইলে কাশির উদ্রেক ; কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুচ্ছিতে

বেদনা। যাতনা ও অসাড়ে মূত্র নির্গমন (আলাম); এক চোক ঠাণ্ডা জল গিলিলেই কাশির উপশম হয়; কাশির উদ্বেকের পূর্বেই খাস প্রখাস ঘন ঘন হয়; কথা বলা বা চলিবার সময় হঠাৎ খাসরোধ হয়; কাশিবার সময় বুকের মধ্যে শ্বেতার ঘড় ঘড়ি; বুকে আঁটিবোধ, বাহার দরুণ বোগী বারবার দীর্ঘ নিশ্বাস উল্লিখিত বাধা হয়; বুকের মধ্যে টাটানি (আগিকা, ব্যাটাইটা-কাস্); বক্ষান্তির নিচ দিয়া আগাগোড়া এক লাইন ধরিয়া আলায়ুক্ত টাটানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি, স্থিতিভাবে বা শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার অধিক উদ্বেক হয়; কেবল রাত্রিতে কাশিতে কাশিতে গলা দিয়া শ্বেতা উঠে; সন্ধ্যা হইতে রাত্রি চই প্রহর পর্যন্ত কাশির বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা জল খাইলে যাহার উপশম হয়; খাস টানিবার সময় বুকে স্থলী বিধানের জ্বর বেদনা; কংস্পন্দন; কংস্পন্দনে স্থলী বিধানের জ্বর বেদনা।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ঘাড় এবং চই বক্ষস্থি বধ্যবর্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, বাহার দরুণ ঘাড়াদি নোয়ান যায় না; খেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে সেরূপ হয়, ঘাড় সেরূপ বেদনা; গলার গলগঞ্জের জ্বর স্থিতি; কোমরের বাম দিকে স্থলী বিধানের জ্বর বেদনা বা যাতনা; মূত্রকোষ প্রদেশে চাপিয়া ধরা বা ঝিল ধবার জ্বর বেদনা বা যাতনা; ওহু ঘাবের উপরিভাগে কসিয়া ধরা, বা খেঁতলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার জ্বর পুণ্ ঘুশে বেদনা।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, প, ইত্যাদি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের জ্বর তুর্লভতা এবং উহার কাঁপন; সন্ধ্যার সময় লক্ষ প্রত্যঙ্গে অসহ্য ক্রান্তিবোধ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুদয় অংশেই সন্ধি বাতের জ্বর বেদনা। হাত এবং বাহুতে ছিড়িয়া ফেলার জ্বর পুণ্ ঘুশে বেদনা; বাহুতে অত্যন্ত ভারি এবং তুর্লভ বোধ; ডাইন মণিবন্ধে ছিড়িয়া ফেলার জ্বর প্রবল বেদনা; হাতের কাঁপনি এবং হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা বা যাতনা। শিশুর সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড় কেড় শব্দ হওয়া; উরু এবং পায়ের সন্ধিতে তীব্র বেদনা; খেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিতে তীব্র বেদনা; সন্ধ্যার এবং তরুণ উহা নোয়ানে অশক্তি; প্রত্যঙ্গের পায়ের ডানে ধরা; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাঝার স্থল্ স্থল্

করা, হানাদেওরা, আলায়ুক্ত এবং চাপিরা ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা এবং উহাতে আলায়ুক্ত স্থীতি বিধানের ন্যায় ব্যতনা ।

চন্দ্র । সমুদয় শরীরে চুলকানি ; শিশুর দাঁত উঠার সময় শরীরের স্থানে স্থানের চন্দ্র ফাটিয়া যাইয়া ক্ষত হওয়া ; শরীর অত্যন্ত চুলকায় ; গ্রীবাদেশে কল্‌তানি বিশিষ্ট ফুসুড়ী ; নাকের আগায় ত্রণের ন্যায় ফুসুড়ী ; গায় যা হইলে শুকাইয়া সামান্য আঘাতেই উক্ত স্থানে পুনরপি বা হয় ।

নিদ্রা । নিদ্রা ভাল হব না বা ঘুম হইলেও উদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি স্তম্ভ মনে কট্টে না ; বারম্বার হাইতোলা এবং গা ভাঙ্গা ; ঘুমেরঘোরে তাত পাখের স্তম্ভকবাব সঞ্চালন ; অত্যন্ত নিদ্রাবেশ বা ভিমান বাহা কোন মতেই নিবারণ করা যায় না এবং বাহ্যিক দরুণ রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয় : ঘুমেরঘোরে চমকিয়া উঠা ।

জ্বর । নাড়ী কেবল সন্ধ্যার সময়ই দ্রুতগামী হয় ; বাম অংশেই কেবল শীত অনুভূত হয় ; বারম্বার পার্শ্বে শীতবোধ ; আত্যন্তিক শীতবোধ এবং তৎপর ঘর্ষ, কিন্তু শরীর উষ্ণ হয় না ; বারম্বার দমকা উষ্ণাহুতব হইয়া তৎপর শীতবোধ ।

ব্যবহার । পেশী এবং সন্ধিবাহেব ন্যায় প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুটানের সহায়কারী পেশীর সংকোচন এবং সন্ধির সঞ্চালনে অশক্তি ; হুগীরোগ ; কোরিয়া (Chorea) ; আক্ষেপ ; পক্ষাঘাত, বাহা মুখ মণ্ডল এবং মূত্রাধারই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে ; মায়ুল ; বরভঙ্গ এবং বরশূন্যতা ; কাশি ; ইপানি কাশি ইত্যাদি অনুরূপ কটিকাম্ব ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্বল, গণ্ডমালা ধাহু বিশিষ্ট রোগীর লক্ষ্যে বিশেষ উপযোগী । ঐস্থির কঠিনতা ; মস্তকের ছুৎবারিতে অত্যন্ত সহ্য-হুত্ব ; ঘুমেরঘোরে হুগীরোগের আক্রমণ ( ক্যাক্‌কান্‌, কুগ্রাম্ ) ; স্নায়ুতে এক মিনিটের জন্তও স্থির ও নিস্তক ভাবে থাকিবার অশক্তি ; যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় তাহাতে ঘেঁহুলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ত্রায় বেদনা ; অস্থি এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার ত্রায় বেদনা ; সমুদয় শরীরে টক গন্ধযুক্ত ঘর্ষ হয় (সাইলিসি) ; মস্তিষ্কের স্তম্ভকবাব বা মস্তিষ্কের কোমলতার দরুণ শরীরের এক অর্দ্ধাংশের পক্ষাঘাত (Hemiplegia) ;

আক্ষেপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের অভ্যস্ত দণ্ডনানি ; পায়ের পাতা শুকাইয়া যায় ; সচরাচর প্রাতঃকাল এবং সন্ধ্যার সময় এবং বর্ষা-মুত্বেই অশ্রুধের বৃদ্ধি ইত্যাদি কটিকামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

**সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ।** পক্ষাঘাতে কটিকামের কার্য অনেকটা জেলেনিমিয়ানের জায়। কণ্ঠনালীর উপর ইহার কার্য ত্রোমিন্ এবং স্পঞ্জিয়ার জায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্, ক্যালকেরিয় কার্বোনিফা, ইগ্নেনেসিয়া, ল্যাক-সিস্, নাক্স, বমিকা, কফরাস্, পান্সেটিনা, রাস্টক্স, টোনাম্, সিপিরা এবং সাল্ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** আসাকিটিডা, কণোশিছ্, কক্ষিয়া, নায়, বমিকা ইত্যাদি কটিকামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** একদিকে চিকিৎসকগণ ৬ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ব্লাক্ (Dr. Black) এই ঔষধের ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক্তার হিউজের (Dr. Hughes) মতে ১ম এবং ২য় দশমিক ডাইলুশনই পক্ষাঘাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পুরাতন আকারের বাত রোগে ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন অধিক উপকারী। পুরাতন আকারের স্বরভঙ্গ এবং স্বরশূন্যতাকে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। পক্ষাঘাত রোগে বাকরোধে এবং গিলিবির অশক্তির প্রতিকারের জন্য ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া ২৫৫ রোগীর চিকিৎসায় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে।

## চেলিডোনিয়ায় মেজাস্,—চেলিডন্ ।

(CHELIDONIUM MAJUS,—CHELIDON.)

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়ার নগর এবং পল্লির নিকটবর্তী পতিত জনীতে এই গাছ জন্মে । ফুল ফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাঁচা অবস্থায় ইহার সমুদয় অংশ দিয়া ডাইলুট্ স্পিরিটে ইহার মূল আরোহ প্রস্তুত হইয়া থাকে । ব্রিটিশ্ হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়য়ার মতে ইহার শুকনা গাছ দ্বারা যথা নিয়মে সুগার অব্ মিস্কেব সঙ্গে মিশাইয়া ইহার গুঁড়িও প্রস্তুত হইতে পারে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** যকৃতের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ, কামল রোগ এবং যকৃতের প্রবল অস্থির লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । ফুস্কুসের উপরও ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ উক্তযন্ত্রে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, প্রদাহ এবং উহার যকৃতবৎ কঠিনতার (Hepaticization) লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে । মেরুদণ্ডের দিকের ডাইন স্বকৃষ্ণির নিম্ন কোণের নিম্ন ভাগে অনবরত বেদনা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**মন ।** মনের অত্যন্ত উত্তেজ ।

**মস্তক ।** মাথাধোঁরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের কার্যের বৈলক্ষণ্য (পেডোফ্); মাথায় ভারিবোধ যাহা ঐবার ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কপালে চাপাবোধ যাহা চক্ষুর কোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং যাহা চক্ষু সঞ্চালনে অধিক হয় (ব্রাই); মাথার ডাইন পার্শ্ব চাপিয়া ধরার ক্ষম বেদনা; চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি ফিতা বাধিয়া রাখিলে বক্রপ হয়, কপালে লেঙ্গুপ কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা (অ্যাক্টি-টার্ট্, জেন্‌স্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সাল্ফ্); মাথাব পশ্চাৎভাগে ভারিবোধ (লাক্); মাথার পশ্চাৎভাগের বামদিকে চাপিয়া বাঁ কসিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা ।

**চক্ষু ।** চক্ষু এক উহাব উপরিভাগে ছিড়িয়া ফেলা বা স্নায়ুশূলের জ্বাৰ বেদনা; চক্ষুর খেতাংশ মগ্নন হরিদ্রাবর্ণ (কাস্, ক্রোটন্, অ্যামোডিন্, স্নাইম্); চক্ষুর গোলকে কনকনানি, চক্ষু সঞ্চালনে যাহা অধিক অস্থিত

হয় (বাই, সিমিসিক্); চক্ষে কম দেখা; কোন বস্তুর দিকে তাকহিলে চক্ষু দিয়া জল পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কখন কখন কম দেখা।

**কর্ণ।** কান দিয়া যেন বেগে বাতাস বাহির হইতেছে এরূপ অমুভূত হয়; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অমুভূত হয় (কার্বো-বেজ্); কান এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে স্নায়ুশুলের জ্বাশ বেদনা (বেল্, মার্ক্); কানের মধ্যে প্রবল সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া বাহা অনেক দূর হইতে যেন আইসে বলিয়া অমুভূত হয়।

**মুখমণ্ডল।** মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (অধিক্ পিয়াস্, হিপ্-সাল্ফ্, মিরিকা, নেট্রাম-নিউব, সিপিয়া), কপাল, নাক, গাল এবং চক্ষুর স্বেতাংশেই বাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; গাল মলিন বা লালিচে হরিদ্রাবর্ণ (ব্যাপ্ট্, ভেল্‌স্); ডাইন গানের হাড় বেদনা বা বাতনা, বাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উহা ফুলিয়াছে; হৃদয়স্থিত সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলাব জ্বাশ ভয়ানক বেদনা।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে।** অপবাক্তে ডাইন কান হইতে ডাইন পার্শ্বের নাড়ি পর্য্যন্ত ছিড়িয়া ফেলার জ্বাশ বেদনা; জিহ্বা শুষ্ক, এবং গাঢ় হরিদ্রা লেপযুক্ত (চাণা, আবোড্, কন্, কমেয়া), সাদা এবং চট্‌চটিয়া আঁঠু, মুখ তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট জ্বাশ সঞ্চার; খালি মুখে, মুখে তিক্ত স্বাদ (বাই, নাস্-বম, পাল্‌স্, সাগ্‌ক্)। বড় কোন কঠিন পদার্থ গিলিবার সময় যেরূপ হয়, গলার মধ্যে সেকপ আঁটা বোধ হইয়া ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হওয়া।

**পাকস্থলী এবং উদর।** উদর উঠা; দমন; পাকস্থলীর মধ্যে সূচী বিধানের জ্বাশ বেদনা বাহা প্ৰদেশে পর্য্যন্ত ও বিস্তৃত হয়। বক্রপ্ৰদেশে বেদনা বা বাতনা আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশকিঞ্চ সিপিয়া পড়ে; বক্রত প্ৰদেশে সূচী বিধানের ন্যায় বেদনা বা বাতনা (আস্, বাই, চায়না, কালী-কার্ক্, মার্ক্, নাস্-বম, সিপিয়া); বক্রত প্ৰদেশে বেদনা; চাপিলে বক্রত প্ৰদেশে বেদনা অমুভূত হয়; এক গাছ রসি দিয়া উদর কসিয়া বাধিয়া রাখিলে যেরূপ হয়, নাস্তিপ্ৰদেশের মধ্যে দিয়া যেরূপ কসিয়া ধারার জ্বাশ বেদনা প্রাথম, পডোন্, টেবেকাম্); উদর কঠিন এবং স্ফীত ও বিস্তৃত; অজ্ঞের



মধ্যে কামড়ানি বা কর্তনব্য বেদনা (ব্রাই, কলোস) ; উভয় কুঁচকিতে কসিয়া ধরার ভ্রায় বা আক্ষেপিক বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কের মধ্যে জালাযুক্ত এবং কর্তনব্য বেদনা এবং উহাতে স্ফুঁ স্ফুঁ করা বা চুল্কানি ; শুষ্ক দ্বারের সঙ্কোচন এবং উহাতে চুল্কানি (সাল্ফ) । মল তরল, কাইয়ের ভ্রায়, উজ্জল হরিদ্রাবর্ণ, (এথুজা, বোরাগ্জ) ; ফিকা ধূসর বর্ণ, চট্‌চটিয়া, শ্লেয়া ; ভেড়ার মলের ভ্রায় কঠিন মলভাগ ।

মূত্রযন্ত্র । ডাইন মূত্রকোষ এবং যকুতে আক্ষেপিক বেদনা ; মূত্রাধারে টানিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি প্রদেশে কাঁপনির সহিত আক্ষেপিক বেদনা বা যাতনা ; ঘোলাটিয়া মূত্রভাগের পূর্বে মূত্র নিঃসারক নালীর দিকে প্রবল বেদনা ; মূত্র কাল্‌চে হরিদ্রাবর্ণ ; মূত্র ভাগের পর মূত্র ঘোলাটিয়া এবং কাল্‌চে কটা বর্ণের আভাযুক্ত লালবর্ণ হয় (আণ্টি-টার্ট্) ; মূত্র লাগিলে কাপড়ে কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়ে ।

জননেদ্রিয় । জীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পর, অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া রক্ষঃশ্রাব (ফেরাম্) ; যোনিদ্বারে জালা যাহা প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে অগ্ৰভূত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । স্বরভঙ্গ (একন্, কারো বৈজ্, কঠ্) ; ঘুম ভাঙিলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা হইতে উঠিলে কাশি এবং বক্ষাশ্বির নীচের ধূলা রহিয়াছে একপ অগ্ৰভূত হয় ; বক্ষাকোশের ভ্রায় সর্বদা গলা খুণ্‌খুণ কাশি এবং গলা দিয়া প্রচুর শ্লেয়া নির্গমন ; কতকটা আক্ষেপিক আকার বিশিষ্ট কাশি যাহা ক্রমাগত বর্তমান না থাকিয়া, থাকিয়া থাকিয়া রোগীকে আক্রমণ করে (ড্রিসিয়া) ; শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন এবং কঠকর উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃকে আঁটবোধ ; বৃক এবং গৃষ্ঠদেশে বেদনা, বৃকে কষ্টানুভব, যাহার দক্ষণ মনে হয় ঘেন গায়ের কাপড় কসিয়া পরা রহিয়াছে ; বক্ষাশ্বির মধ্যভাগের পশ্চাৎদেশে আক্ষেপিক বা চাপিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা যাহা বায়ুনল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তদ্রূপ বায়ুনলের সঙ্কোচন ; বৃকে স্রুতী বিধানের ভ্রায় যাতনা (ব্রাই, ক্যালী-কার্ক) যাহা ডাইন পার্শ্বে অধিক অগ্ৰভূত হয় ; ডাইন দিকের পাঞ্জরার হাড়ের নীচে স্রুতী বিধানের ভ্রায় বেদনা ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না (রাস্-টজ, লাইকোপ) ; গ্রীবাদেশের ডাইন দিকের পেশী এবং ডাইন স্কন্ধ-প্রদেশে বেদনা ; পৃষ্ঠদেশ এবং হৃই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ও তদ-রূপ উক্ত স্থান সঞ্চালনে অশক্তি ; গ্রীবাদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; ডাইন স্কন্ধ এবং উহার নিম্নভাগে বেদনা (আবিস্-ক্যান্, পডোফ্) এবং উক্ত প্রদেশে সূচীবিধানের ভ্রায় যাতনা ; ডাইন স্কন্ধে বেদনা ; ডাইন স্কন্ধাঙ্ঘ্রির নিম্ন কোণে অনবরত বেদনা (ইক্সলান্-হিপ্) যাহা বৃক এবং পাকস্থলী পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইতে পারে ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ । অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভাবি এবং অবশবোধ বা ঝোঁড়া হওয়ার ভ্রায় অস্থত্ব হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের ভ্রায় অস্থত্ব হয় ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা ; বাত রোগ, কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলেই অত্যন্ত বেদনার উল্লেখ হয় ; বর্ষ হয় ; কিন্তু উহার দরুণ কোনও উপশম অস্থত্ব হয় না ; বাতরোগ, নিম্নাঙ্গেই যাহা অধিক অস্থত্ব হয়, প্রধানতঃ পায়ের পাতার সন্ধিতে, চলিয়া বেড়াইলে যাহার রুদ্ধি হয় ।

নিদ্রা । বারম্বার হাইতোলা ; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ এবং কিমান্নাঙ্ক-মক্) ।

জ্বর । শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা, হাত পায়ের পাতারই যাহা অধিক অস্থত্ব হয় ; সন্ধার সময় শয়ন করিলে শরীর অত্যন্ত গরম হয় ; শেষ রাত্রি বা প্রাতঃকালে বর্ষ (কাক্-কার্ক) ।

ব্যবহার । যকৃত প্রদাহ ; কামল রোগ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ; পিত্তাধিক্য ; যকৃতের অস্থ জনিত শোথ ; উদরাময় ; স্নায়ুশূল, কুক্ষ্-প্রদাহ ; হুপিং কক ; ঠাপানি কাশি ইত্যাদি অন্তর্থে চেলিডোনিয়াম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । আঁচরের পব এবং প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলে অত্যন্ত অলসবোধ এবং হর্দলতা ; শরীরের কোন কোন অংশে পক্ষাঘাতের ভ্রায় অবশবোধ এবং কসিয়া ধরার ভ্রায় বেদনা ; প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে অস্থথের রুদ্ধি ; বায়ুর পরিবর্তনে অস্থথের পুনরা-ক্রমণ ; সন্ধার সময় অস্থথের উপশম ইত্যাদি চেলিডোনিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ।** চেলিডোনিয়ামের কার্যের সঙ্গে ট্রাই-  
গুনিয়া এবং ফফরাসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বিন্ন কোন কোন  
বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে সিমিসিফিউগা, চায়না, জেল্‌সিমিয়াম, মার্কিউ-  
রিয়াম, নাক্স-বমিকা, পডোফিলাম এবং সাল্‌ফারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ।** একোনাইট, ক্যান্‌ফার, অম্লোষধ, মল্য বা  
কাকি চেলিডোনিয়ামের প্রতিষেধক মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার।** যুবা যুবতীর পক্ষে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ দশমিক  
ডাইলুশন এবং শিশু বা ছোট্ট বালক বালিকার পক্ষে ৩ হইতে ১২ ক্রম  
পর্যন্ত বিশেষ উপযোগী। কখন কখন মাতালদিগের যকৃতের অন্তর্থে মূল  
আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপ-  
কার দর্শিতে দেখা যায়। যকৃত সম্বন্ধীয় সকল প্রকারের অন্তর্থেই মূল  
আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া লেখক মিশ্র আরোক  
অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়া থাকেন।

## সিনা,—সিনা

(CINA,—CINA)

আসিয়া মাইনর, লিবাণ্ট, আফ্রিকা এবং পারস্য দেশে এই গাছ  
জন্মে। ইহার বিচি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ দ্বারা রেক্‌টিকাইড স্পিরিটে যথা  
নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আল্‌কেলয়েড্‌কে  
(Alkaloid) সান্টোনাইন্‌ (Santonine) বলে। যথা নিয়মে সুগার অব  
মিকের সঙ্গে মিশাইয়া সান্টোনাইনের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**সাধারণ ক্রিয়া।** অন্ত্রের উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা  
অন্ত্র উত্তেজিত করিয়া অন্ত্রের পুরাতন আকারের উত্তেজনা, প্রদাহ এবং  
কৃমির লক্ষণাদির দ্বারা লক্ষণগুলি উৎপাদন করে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হও-  
য়ার লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়; কিন্তু উহা অল্প আক্রান্ত হইয়া উত্তেজিত  
হওয়ার কেবল গৌণ ফল মাত্র, মুখ্য লক্ষণ নহে। সিনার কার্য অনেকটা  
সান্টোনাইনের দ্বারা বলিয়া সিনার পশ্চিমবর্তে অনেকে সান্টোনাইন্‌ ব্যবহার

করিয়া থাকেন । কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, সিনার কার্য অপেক্ষা সাটোনাইনের কার্য অধিক প্রবল এবং সর্ষপ একতাব বিশিষ্ট । সর্ষপা চিড়্‌চিড়্‌ করা সিনার একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ

মন । প্রলাপ এবং চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠা ; কোলে করিয়া বেড়াইলে বা কেহ তাহাকে ধরিলে রোগী (শিশু) করুণ স্বরে কান্দে ; শিশু সর্ষপা কান্দে এবং ক্রমাগত মায়েস স্তনের দুধ না দিলে কোন মতেই তাহার কান্না থামে না ; রোগী সর্ষপা চিড়্‌চিড়্‌ করে (ব্রাই, ক্যাম) এবং কোন মতেই তাহাকে শান্ত করা যায় না ; রোগী তুযান বুযান ভাল বাসে না এবং তাহাকে বাহাই দেওয়া বাউক না কেন সে কিছুই লইতে চাহে না (ক্যাম) ; রোগী কাহাকেও তাহার শরীর স্পর্শ করিতে দেব না (আন্টি-টার্ট, আন্টি-জুডু) ।

মস্তক । বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে অবসন্নকারক শিরঃপীড়া ঘাড়া কপালেই অধিক অল্পভূত হইয়া তৎপর মাথার পশ্চাত্তাণে অল্পভূত হয় ; কপালের বান পার্শ্বে উচ্চ স্থান হইতে নাকের গোড়া পর্যন্ত কসিয়া ধরে, বাহার দক্ষণ মাথার গোলমলে বোধ হয় ; একটী ভারি বস্ত্র চাপিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, মাথার উপরি ভাগের ঠিক মধ্যভাগে সেক্রপ চাপিয়া ধরারস্তার সবিরাম বেদনা ; শিশু সর্ষপাই মাথা পার্শ্বে দিকে হেলাইয়া রাখে ।

চক্ষু । চক্ষু তারি বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ওপিয়াম্, ষ্ট্রায়ম্) ; টেরা চক্ষু (বেল্) ; একখানি পাতলা কাপড় দ্বারা চক্ষু ঢাকা থাকিলে যেরূপ হয়, কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে সেক্রপ কান্না দেখায়, চক্ষু যুছিয়া কেলিগে বাহা সারিয়া যায় (কস্, পাল্‌স্) ; চক্ষুর কোটরের উপরিভাগ হইতে মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে স্ত্রী বিধানের স্তায় ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা বা যাতনা ; বিছানা হইতে উঠিলে চক্ষুর সম্মুখে কাল দাগ ভানে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিম্বা কিম্বা করা এবং মুচ্ছার ভাব, বারম্বার এদিকে ওদিকে টলিয়া পড়া, শরন করিলে বাহার উপশম হয় (ডাক্) ।

কর্ণ । কানের সম্মুখভাগের নিম্ন প্রদেশে স্ত্রী বিধানের স্তায় ঘৃণ্‌ঘৃণে বেদনা বা যাতনা ; কর্ণশূলে যেরূপ হয়, কানের বহির্দেশে সেক্রপ খিল ধরা বা চিড়িক মারার স্তায় বেদনা ; কানে কম শুনা ।

নাসিকা । সর্কদা অবল হাঁচি ( একন্, জেল্‌স্, সাহুনেরিয়া ) ; অনবরত নাক বোঁটা এক নাক ঘষা বা আঙ্গুল নাকের মধ্যে খুঁদিয়া রাখা (ফস্-আস্, সেগিন্, এরাম্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ( একন্, বেগ্ ) ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল শিটা এবং রুম, শোপের ভায় টল্‌টলে এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; মুখমণ্ডল শিটা, শীতল এবং শীতল বর্ণ দ্বারা আবৃত (ক্যাম্‌ফ্‌র, বিরেট্-আব্) ; মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান সাদা এবং নীলের আভাযুক্ত ; গালের মেলার নামক অস্থিতে (Malar bone) চাপিয়া ধরিলে ন্যায় বেদনা, চাপিলে ধবিলে যাচার বৃদ্ধি হয় ।

মুখগহ্বর এবং গলদ্বার মধ্য । দাঁত দ্বারা সর্কদা কড়্‌, মড়্‌, শব্দ করা, প্রধানতঃ রাত্রিতে ঘুমেরবোরে (আস্, সিকুটা, হেলিবোরাস্, পডোক্) ; মুখের মধ্যে শুকাইয়া যায় ; জিহ্বা সামান্য সাদা লেপযুক্ত এবং উহাতে ক্ষুদ্রীকৃত ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয় ও উহার পার্শ্ব লালবর্ণ, যাহা চাপিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় । গলার মধ্যে শুকাইয়া যায় ; গিলিবার সময় বেক্রপ হয়, গলার মধ্যের সেক্রপ অনবরত সঞ্চালন ; গিলিতে অশক্তি, তরল পদার্থ গিলিবার সময়ই এই অশক্তি অধিক অস্বস্তি হয় । (বেগ্) ।

পাকস্থলী এবং উদর । হয় ক্ষুধা একবারেই থাকে না, নতুবা দ্রুত ক্ষুধা ; পেট পুরিয়া খাওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই অত্যন্ত ক্ষুধা (মার্ক্, ষ্টাকিস্, লাইকোপ্) ; শিশু মাতৃস্তন দ্বারা পান করিতে চাহে না ; জলাদি পানের পর বমন এবং উদরাময় ; নানাপ্রকারের দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা ; (পিপাসা একন্, আস্, ব্রাই, রাস্টল্) ; ক্রমি, উদরস্থ আহাতি দ্রব্য, স্নেহা এবং পিত্তবমন ; ক্ষুধা লাগিলে বেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ চর্কণবৎ অল্পখ-বোধ (ইগ্‌নেস্) । ক্রমি থাকিলে বেক্রপ হয়, নাভিপ্রদেশে সেক্রপ চিন্‌চিনে বেদনা (স্পাইডেল্) ; নাভিপ্রদেশে মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা বাতনা (কলোস্) ; আহাতির পর উদরোচ্ছাদ প্রদেশের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত খিলধরার ন্যায় বা চিন্‌ চিনে বেদনা ; উদর ক্ষীণ, বিবৃত্ত এবং কঠিন (শিশুগণের) (আস্, ক্যাকেরিয়া কার্ল্, কলোস্) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কভাবে চুলকানি বা কুট্‌ কুট্‌ করা (আলান্, আস্, গ্রাফ্, সাল্ফ্) ; জলবন্তরল উদরাময় (একন্, আস্,

চারণা, পডোফ্); কৃমি সঞ্চিত সাদা জলবন্তরঙ্গ ভেল (চারণা, কস্-আস্, রাসটম্) ।

মূত্রযক্ষ্ম । বারবার মূত্র ত্যাগের চেষ্টা এবং অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (এপিস্); মূত্র ত্যাগের অনতিকাল বিলম্বই মূত্র ঘোলাটিয়া হয়; (চেলিডন্, কনোস্); মূত্র ত্যাগের পর মূত্র স্ফীকান পাত্রে ধরিয়া রাখিলে মূত্রে সাদা তুলানি পড়ে; রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে অসাড় বা অনি-  
জ্ঞাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (অল্পে কৃমি থাকিলেই একপ সচরাচর ঘটয়া থাকে) ।

শ্বাসযন্ত্র । ক্ষণস্থায়ী খুণ্ খুণে কাশি হু শুক আকেশিক কাশি, বাহার আক্রমণের পূর্বে শরীর একবারে শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না এবং জ্ঞান থাকে না; হৃৎপিংকক, প্রাতঃকালে বাহার আক্রমণ অভ্যন্ত প্রবল হয় এবং গলাদিয়া শ্লেষ্মাদি কিছুই উঠে না; সন্ধার সময় অতি কষ্টে গলা-  
দিয়া শ্লেষ্মাদি উঠে; সন্ধার সময় অতি কষ্টে গলাদিয়া সাদা, এবং কখন কখন রক্তের ছিট্‌যুক্ত শ্লেষ্মা উঠে; প্রাতঃকাল এবং সন্ধার সময় কাশির বৃদ্ধি এবং রাত্রিতে কাশির উপশম; জ্বলাদি পান, বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে এবং কঠিনানীতে চাপ পড়িলে কাশির উদ্রেক হয় (ল্যাক্); শ্বাস প্রবাহ ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রবাহে বাঁধ বাঁধ বোধ; গলার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিলে যেরূপ হয়, প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলে সেরূপ খুণ্ খুণে কাশির উদ্রেক হয়; সন্ধান সময় স্বরভঙ্গাবিশিষ্ট খুণ্ খুণে কাশি; থাকিয়া থাকিয়া হৃৎপিং কাশির প্রবল আক্রমণ (চুসিয়া), বায়ুনলের নিয়ন্ত্রণে শ্লেষ্মা জমিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অস্বভূত হইয়া বাহার উদ্রেক হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । মেরুদণ্ডের উর্দ্ধদেশ হইতে নিম্ন বেশ পর্যন্ত আগাগোড়া কসিয়া ধবা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বায় বেদনা; মেরুদণ্ডের ঠিক মধ্য ভাগে ছিড়িয়া ফেলা বা চিড়িক মারার জ্বায় বেদনা; অনেককণ দাঁড়াইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরে সেরূপ শ্রান্তি জনক বেদনা ।

নিন্দ্রা । ঘুমেরঘোরে বারবার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা এবং বারবার কানিয়া ওঠা ও ক্রমাগত করণ স্বরে কাঁদা (একন্) ।

জ্বর । শীত কক্ষ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল শীতল এবং শিটা ও হাত উষ্ণ; সন্ধার সময়ই শীত অধিক অস্বভূত হয়, বাহ্যিক উত্তাপ

প্রয়োগে বাহার কোনও হাস বা উপশম হয় না; মাথা এবং মুখদণ্ডেই অধিক উষ্ণ অনুভূত হয়; বর্ষা মচরাচর শীতল এবং কপাল, নাসিকার চতুষ্পার্শ্বভর্তী স্থান এবং হাতেই উষ্ণ অধিক হয় (বিবেট্-মার্শ); জ্বরের আক্রমণের সময় বমল এবং অত্যন্ত কুখা; কেবল শীতলাবস্থা বা উষ্ণাবস্থায়ই পিপাসা থাকে; হৃৎপিণ্ডের কম্পমান স্পন্দন; মুখদণ্ড অত্যন্ত উষ্ণ এবং গাল উজ্জল লালবর্ণ; শীতল জলদি পানের ইচ্ছা (বেল্); প্রতিদিন ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আইসে (ক্যাক্টাস)।

ব্যবহার। ক্রিমি ক্রিমি জনিত অস্থ; আক্কেণ (Convulsions), বিশেষতঃ ক্রিমি জনিত; কোরিয়া (Chorea); মূগীরোগ, ক্রিমির দরুণ বা অন্য কোন কারণে অঙ্গের উত্তেজনা জনিত হইলে, ক্রিমির দরুণ আট্‌কান সবিরাম এবং স্বল্প বিরাম জ্বর (Intermittent and Remittent Fevers), উদরাময়; ছাপংকফ বা কাশি; অসাড় হুতাগ; ক্রিমির দরুণ রাত্রিতে ঘুমেরঘোরে বা স্বপ্নে বিছানায় প্রস্রাব করা ইত্যাদি অস্থে সিনা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। যে সকল শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অন্তের মধ্যে ক্রিমি থাকে, তাহাদিগের অন্ত্রে বিশেষ উপকারী। মূগীরোগ, রাত্রিতেই বাহার আক্রমণ অধিক হয় এবং বাহার আক্রমণের সময় রোগী অত্যন্ত চীৎকার করে ও হাত পা প্রবল বেগে বারবার দাপাদাপি করে; ঘুমেরঘোরে বারবার এগাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করা; হাত পায়ে স্পন্দন (ক্যাক্-কার্ভ, ইয়েন্); হাত পায়ে বাকনি এবং উষ্ণ বিকৃত হওয়া (সিকুটা); রাত্রিতে, কোন বস্তুব দিকে এক দৃষ্টে তাকাইরা থাকিলে এবং বাহ্যিক প্রচাপনে অস্থের বৃদ্ধি ইত্যাদি দিনার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মনো পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। সিনার কার্যের সঙ্গে আদিনিক্, বেলাডোনা, ক্যাল্‌কেব্রা, ক্যামোমিলা, চায়না, কেরাম্, ইগ্‌নেসিয়া, ফফ্রাস্, স্পাইজেলিয়া এবং পাল্‌সেটিলাব কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যাম্ফার, ক্যাম্পিসিকাম্, চায়না এবং ইপি-কাকিউন সিনার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ডাইলুশনই মচরাচর

অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
সবিরাম বা স্বল্প বিরাম অবস্থায় ওলাউঠার পতনাবস্থায় উদরে কৃমি থাকার  
দ্রুত প্রতিক্রিয়া না হওয়া সন্দেহ হইলে ২০০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া  
অনেক সময় আশ্চর্যচরিত্র ফল পাওয়া যায় । সাণ্টোনাইনের ১ম দশমিক  
ক্রমের ওঁ ডাই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

### ককিউলাস্ ইণ্ডিকাস্,—ককিউল্ ।

(COCCULUS INDICUS,--C'oc'c' IND.)

এই গাছের ফল যথা নিয়মন রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার  
মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গতি উৎপাদক মায়ু মণ্ডলীর উপর ইহার  
কার্য অতি প্রবল, যাহাব দ্রুত ইহা প্রথমতঃ স্বেচ্ছাপূর্বক সঞ্চালনের  
শক্তিবিশিষ্ট পেশী আক্রমণ করিয়া পক্ষাঘাত এবং ধস্তাধস্তারের দ্বারা  
আক্ৰেপ এবং তৎপর জ্ঞান উৎপাদক মায়ু মণ্ডল আক্রমণ করিয়া মাথা  
ঘোরা এবং মাথার বিকৃতাবস্থা উৎপাদন করিয়া থাকে । স্নায়বিক উত্তে-  
জনার দ্রুত বিশেষ প্রকৃতিব বমনোদ্বেগ এবং অবসন্নতা, সার্ভিক্সিক বলক্ষণ  
এবং মাথা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে একতর হইয়া জল পথে জাতাত, নৌকাদিতে  
চাপিয়া বেড়ানোর দ্রুত অসুখের (Sea-Sickness) দ্বারা লক্ষণাদি প্রকাশ  
পায় । মাথাঘোরা থাকুক বা না থাকুক, চিষ্টিরিগ বা অস্ত্রান্ত প্রকারের  
স্নায়বিক অসুখের অনেকানেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । অনবরত জ্ঞাপন বিষয় চিন্তা; রোগী (স্ত্রীলোক) আপন  
বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করে না; গান করিবার অনিবার্য  
ইচ্ছা; অল্প মনঃকতা, যাহার দ্রুত রোগী (স্ত্রীলোক) বাহ্য এইক্ষণ চিন্তা করে  
উহার পরক্ষণই সে উহা ভুলিয়া যায়; অত্যন্ত ভয়ানক স্বপ্নের জর্জর করিলে  
বেদন হয়, মনের স্বেপন উদ্বেগ (ইগ্‌নেস); রোগী সহজে বিরক্ত হয়,



রাগান্বিত হয় এবং সহজে অবসন্ন বা ক্লান্ত হইয়া পড়ে (ক্যাপ্স, নাস্-বম্) ; সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা (সিপিরা, সাইলিসি) ।

**মস্তক ।** নেসা করিলে ঘেরূপ হয়, সেকরূপ মাথা ঘোরা (চারনা, পাল্-স্, লেডাম্, নাস্-মফ্, রাস্-টজ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শয়নাবস্থা হইতে উঠিলে বমনের ইচ্ছা (ব্রাই), যাহার দরুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয় ; মাথায় খালিবোধ ; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে বা গাড়ীতে, পাল্কিতে, নৌকা বা জাহাজে চাপিয়া বেড়াইলে মাথাঘোরা ; মাথায় অবসন্ন এবং গোলমলে বেচুঁ বাহা আহাৰ বা পানের পর সচরাচর বৃদ্ধি হয় (নাস্-বম্) ; শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা (ইপিফাক্, নাস্-বম্) ; কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বা কু আঁটির রাখিলে ঘেরূপ হয়, মাথায় সেকরূপ চাপিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা যাতনা (মার্ক্, নাইটিক্-আস্) ; চক্ষু টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিলে ঘেরূপ হয়, মাথায় সেকরূপ বেদনাশ্রুত্ব ; নিদ্রা, আহাৰ বা পানের পর শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ইগ্-নেস্) ; গাড়ীতে চাপিয়া বেড়াইলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি (ক্যানী-কার্ক্, সিটোল্) ; বহির্বাযুতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও উষ্ণ ঘরে শিরঃপীড়ার উপশম ; গ্রীবাদেশস্থ পেশীর দুৰ্জলতার দরুণ মাথার আফেলিক স্পন্দন ; শিরঃপীড়া, চীত হইয়া শয়ন করিলে বাহাৰ বৃদ্ধি হয় এবং বাহাৰ দরুণ রোগী এক পাশে শয়ন করিতে বাধ্য হয় ।

**চক্ষু ।** চক্ষে বাপ্সা দেখা ; খেঁত্ণিয়া গেলে ঘেরূপ হয়, চক্ষে সেকরূপ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাতিতে চক্ষু মেলিবার অশক্তি ; চক্ষু মুদ্রিয়া থাকা, কিন্তু এই অবস্থায়ই চক্ষুর গোলক অনবরত ঘূৰণ ।

**কর্ণ ।** ঞ্জল বেগে জল চলিলে ঘেরূপ হয়, কানে সেকরূপ নোঁ নোঁ শব্দ হয় (ক্যাম্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা ।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং গাল লালবর্ণ (ফেরাম্) ; মুখাকৃতি মেটে মেটে এবং অত্যন্ত যাতনায় চিহ্নযুক্ত ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** স্ফাতির নিরঙ্কিত গ্রন্থির ক্ষীণতা এবং কঠিনতা (ক্যাক্-কার্ক্, আয়োড্, রাস্-টজ্) ; মুখগহ্বর শুষ্ক (নাস্-মফ্) ; জিহ্বা শুষ্ক এবং সাদাটিয়া লেপযুক্ত, কিন্তু পিপাসা থাকে না (নাস্-

মক্, পাল্‌স্); মুখে ধাতুর স্বাদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাত্তা (ইক্-লাস্, মার্ক্, নেজা)। গলার মধ্যে শুকাহুত্ব; গলার মধ্যের উপরিভাগের নালী রুদ্ধ হওয়ার স্থায়ী সঙ্কুচিত হওয়ার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিয়া কাশির উদ্রেক হয়।

পাকস্থলী এবং উদর । আহার দ্রব্যে অত্যন্ত অরুচি (অ্যান্টি-ক্রুড্, ইপিগাক্), বিশেষতঃ টক দ্রব্যে, অথচ উহার সঙ্গে সঙ্গে কুখ্যাত্তা থাকে; আহারের সময় অত্যন্ত পিপাসা; ঠাণ্ডা দ্রব্য পানে ইচ্ছা; ভ্রূগন্ধযুক্ত কাঠি উল্কার (আর্থিকা, ক্যাম্, সোরিনাম্); তিক্ত উল্কার উঠা (আর্থিকা, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); বারম্বার উল্কার উঠিতে চাহে, কিন্তু একবারও উল্কার উঠে না; বারম্বার অত্যন্ত প্রবল বমনোদ্বেগের দরুণ রোগী মুচ্ছা বাওয়ার উপক্রম হয় (টেবেকাম্); রেলের গাড়ীতে চাপিয়া বেড়ানোর সময় অত্যন্ত বমনোদ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা (নাক্স-মক্, পিট্রোল্), অথবা ঠাণ্ডা লাগিয়া বমনোদ্বেগ বা বমনের ইচ্ছা; বমনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শিরঃপীড়া এবং অস্ত্রের মধ্যে মোচড়াইয়া পড়ার স্থায়ী বেদনা; পাকস্থলীতে ভয়ানক খিল ধরা এবং উহাতে কামড়ানী (নিউডানের স্থায়); ভোতা ছুরি দিয়া কাটার স্থায়ী বেদনা বা বাতনা; পাকস্থলীতে যেন একটা কুনি নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; জলপথে জাহাজাদিতে চলিবার দরুণ বমন বা বমনোদ্বেগ (Sea-Sickness); আহারের সময় এবং উহার পর পাকস্থলীতে খিল ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট (নাক্স-বম্); পাকস্থলীতে খালি খালি বোধ (ইগ্নেস, পিট্রোল্, সিলিয়া); উদর অত্যন্ত ফাঁত এবং বিস্তৃত (অলোক্, সিকুটা, ক্যাম্, চায়নু); উদরে খালিবোধ এবং উহাতে যেন কিছু নাই এরূপ অনুভূত হয়; উদরোচ্চ প্রদেশের সংকোচন, বাহ্যিক দরুণ নিশ্বাস বদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; রাত্রি দুই প্রহরের সময় উদরে দুধিত বায়ু জনিত আক্ষেপিত শূল বেদনার স্থায়ী বেদনা; শুষ্কতার দিয়া বায়ু নিঃসরণ, কিন্তু উহার দরুণ বহুখাদিগকে কোনও উপশম হয় না এবং কাশিলে বাতনার বৃদ্ধি হয়; কুঁচকি সম্বন্ধীয় অল্প বৃদ্ধি হওয়ার উপক্রম হয় (আগাম্, নাক্স-বম্, নাইট্রিক্‌ অ্যাস্)।

মল এবং মলদ্বার । অপরাহ্নে শুষ্ক সংকোচক বেদনা, বাহ্যিক দরুণ বসিয়া থাকিবার ব্যাঘাত জন্মে; মল কোমল, পাতলা এবং শাদাটিয়া,

হরিত্রাবর্ণ; মল্ অত্যন্ত কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয় (আলাম্, ব্রাই, সাগ্) ।

**জননেন্দ্রিয় ।** স্ত্রীলোকের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উনরে ঝিল ধরা এবং শূল বেদনার জ্বার বেদনা; রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক ঝিল ধরা এবং অবসরকারক বমনো-  
দেগ ও মুচ্ছার ভাব; রজঃস্রাবের সময় রোগী এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, উহার দরুন সে দাঁড়াইতে বা কথা বলিতে পারে না (আমন্-কার্ক, কার্কো-  
আনিমেল্)। কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বাধকের বেদনার (Painful Menstruation) পর প্রায়ই অর্ধ রেগণ হয়; রজঃস্রাবের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে ভাতের পাতলা কেণের জ্বাৰ ছেকড়া ছেকড়া পদার জ্বার পূর্ব সংযুক্ত  
শ্বেত প্রদর নিঃসরণ (আলাম্, আস্, ক্যাক-কার্ক, ফ্রিগজ্, হাইড্রাট্, পাট্) এবং তদরূপ রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া কথা বলিতে বা দাঁড়াইতে  
পারে না; অরামুতে কষ্টদায়ক চাপাবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক ঝিল ধরা, বমনোদেগ এবং মুচ্ছা; গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বার দিয়া রক্ত মিশ্রিত  
স্রোয়ার জ্বার পদার্থ নিঃসরণ ।

**শ্বাসযন্ত্র ।** বুক আঁটাবোধ হওয়ার দরুন অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাশি; বকের ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরার জ্বার সঙ্কোচক বেদনা, যাহার দরুন নিশ্বাস বদ্ধ হয়; বকের মধ্যের সঙ্কোচন; হিষ্টিরিয়া রোগে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সঙ্কোচন বা আঁটাবোধ (আসাকিটিডা); বকের মধ্যে জ্বালামুভব যাহা গলার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বকের মধ্যে খালি বোধ ।

**হৃৎপিণ্ড ।** ন্যায়িক হৃৎস্পন্দন (আসাকিটিডা) ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** গ্রীবা দেশস্থ পেশীর দুর্বলতার দরুন মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায় না (বিরেট্-আব্); সঞ্চালন করিবার সময় ঝড় লক্ক হয় বা উহা নোরান যায় না (চেলিডন্, রাস্ টন্); কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের জ্বার বেদনা বা যাতনা ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সযুদয় অঙ্গের কম্পন (কোল-  
রাম্, জেল্, মার্ক্); রাহি এবং পা সঞ্চালনে কষ্টকর অশক্তি; হাত পায়ে  
পর্ষায়ক্রমে অবশ বা অসাড় বোধ । হাতের সন্ধির বাতের জ্বার শীতি ;

হাত অবশ এবং অসাড় হয় এবং উহা পর্যায়ক্রমে শীতল এবং উষ্ণ হয় ;  
 বেংলিয়া গেলে বা মোচড়াইরা পড়িলে বক্রণ হয়, ক্রম এবং বাহ্যতে শেফণ  
 বেদনা ; পায়ের পক্ষাঘাতের জ্বার সকালনে অশক্তি ; কোমর হইতে শরী-  
 রের নিম্নাঙ্গের সমুদয় অংশের পক্ষাঘাত ; চলিতে চলিতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া  
 পড়ে ; চলিবার সময় পা হেলিয়া টলিয়া পড়ে ; হাঁটুর সন্ধির প্রদাহযুক্ত ক্ষতি  
 এবং উহাতে স্থচী বিধানের জ্বার কণ্ঠহারী বেদনা বা যাতনা ; চলিবার  
 সময় হাঁটুর সন্ধিতে কেড়্কেড় শব্দ হয় ; মিয়া থাকিলে পায়ের পাতার  
 তলা অসাড় হয় ।

নিদ্রা । নিদ্রাশূন্যতা ; রাত্রি জাগরণেব দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; কাঙ্-  
 কক্ষের চিত্তার দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; মনের উদ্বেগ বা চিন্তা এবং অস্থিরতার  
 দরুণ নিদ্রাশূন্যতা ; নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি সুস্থ মনে মনে  
 না (আগিকা, চায়না, ওপিডাম) ।

জ্বর । পর্যায়ক্রমে শীত এবং উষ্ণাত্তব (কাক্-কার্স, মার্ক) ;  
 গাল অত্যন্ত গরম এবং লালবর্ণ (একন্, বেল) ; অগুরুত্ব এবং সন্ধার সময়  
 শীত বোধ, পা এবং পৃষ্ঠদেশেই বাহা অধিক অশ্রুত হয় এবং উত্তাপ দিলেও  
 বাহার উপশম হয় না ; বারবার দম্কা উষ্ণাত্তব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
 গাল উষ্ণ, পায়ের পাতা শীতল ; আদ্রিক-জ্বর বা জ্বর-বিকার বাহাতে  
 রোগী কোন বিষয় সহজে বুদ্ধিতে পারে না ; কথা বলিবার সময় মনের ভাব  
 প্রকাশ করিবার তত্ত্ব উপযুক্ত শব্দ স্মরণ হয় না ; অন্নকণের ঘটনাও স্মরণ  
 থাকে না এবং বিভ্রিড়্ করিয়া বা গুন্গুন্ করিয়া কথা বলা (আগিকা) ।

বাবহার । গাড়ী, পাকী, দোলা, জাহাজ, বা নৌকার দোলন  
 জনিত অস্থখ ; স্তম্ভবাস (Melancholia) ; দারবিক দুর্লভতা ; আক্ষেপ ;  
 মুচ্ছা ; হিষ্টিরিয়া ; দারবিক জ্বর ; রক্তাভতা ; শরীর শীর্ণ হওয়া বা পেশীক্লম ;  
 পাকস্থলীর অস্থখ এবং পিত্তজনিত অস্থখ ; অজীর্ণ রোগ ; সন্ধিঘাত ; পক্ষা-  
 ঘাত (প্রধানতঃ নিম্নাঙ্গের) ; অগ্নিবৃদ্ধি ; শিরঃশীতা ; মাথাঘোরা ইত্যাদি  
 অস্থখে ককিউলাস্ বাবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । দুর্লভতার দরুণ দৃঢ় ভাবে দাঁড়াই-  
 বারে অশক্তি ; পক্ষাঘাতের জ্বার দুর্লভতার বারবার আক্রমণ ; সন্দেহা শরীর

কম্পনের স্বভাব (ইগ্‌নেস) ; দীতলই হউক, বা উকই হউক, বহির্বাধু সহ্য হয় না (আমন-কার্ক, অরাম্, নাক্স-বম্, পিট্রোল্, বাস্ টক্স, কমেস্, সিলিয়া) ; দুর্বলতার দরুন সজোরে কথা বলিতে অশক্তি (টোনাস) ; মারিলে যেক্ষণ হয়, হাড়ের মধ্যে খনন করার ভায় সেরূপ বেদনা বা যাতনা ; জীলোক এবং শিঙগণের অস্থিে বিশেষ উপযোগী ; আহার বা পানের পর, সুমাইলে, কথা বলিলে এবং গাঁড়ী, পাকীতে চাপিয়া বেড়াইলে, তামাক খাইলে, পরিশ্রমে এবং বহির্বাধুতে অস্থির হৃদ্বি ইত্যাদি ককিউলাসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ** উদরের উপর ককিউলাসের কার্য ক্যামোমিলার ভায় । এতদ্বির ইহার কার্যের সঙ্গে আন্টিমোনিয়াম্ কুডাম্, আর্নিবিক্, বেলাডোনা, ককিয়া, কুপ্রাম্, ইগ্‌নেসিয়া, ইপিকাকিউএনা, লাইকোপডিয়াম্, নাক্স, বমিকা, পিট্রোলিয়াম্, কক্ষরাম্, পাল্‌গেটলা, রাস্ টক্স, সাইলিসিয়া, বিরেটাম্ আদ্যমের কার্যের সাপৃক্ত আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ** । ক্যান্‌ফার, ক্যামোমিলা, কুপ্রাম্, ইগ্‌নেসিয়া, নাক্স, বমিকা ককিউলাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার** । ৩ এবং ১২ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন । আবার মস্তিষ্কের অস্থি জনিত বমন বা বমনোষেগ, দূষিত বায়ু-জনিত পেট ফাঁপা এবং খিল খরা বা আক্ষেপ, রক্তস্রাবের অনিয়ম হেতু বেদনা বা বাধকের বেদনায় কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন । নিম্নাঙ্গ এবং শরীরের ডাইন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাতে এই ঔষধের মূল আরোক ৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ২।৩টি রোগীর চিকিৎসায় লেখক আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছেন । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

## কফিয়া ক্রুডা,—কফিয়া

(COFFEA CRUDA,—COFF.)

আরব দেশে এই গাছ জন্মে। আমেরিকার উষ্ণ প্রধান দেশে এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার ভাল চাষ হইয়া থাকে। মোকা দেশ হইতে আনিত কুঁচা বিচি যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কসেরা/হা মৰ্জ্জা সঞ্চরীয় বায়ু যন্ত্ৰ-  
লেয় উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা স্নায়ুর যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া  
উহার কার্য বৃদ্ধি করে। অতএব স্বাভাবিক উত্তেজনা বা শরীর ও মনের  
কার্যের অতিরিক্ত চাকলা এবং তদ্রূপ বিশেষ বিশেষ ইঞ্জিয়ার অতিরিক্ত  
উত্তেজনা বা চেতনা দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক দ্রবণ বেদনাদি সজ  
করিবারে অশক্তি, মানসিক উত্তেজনায় দ্রবণ নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি কষ্টকর  
লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। সুস্থ অস্থানেই বেদনা যন্ত্রাদি সজ করিতে  
অশক্তি এই ঔষধের এক বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মনের অত্যন্ত চাকলা (অস্ট্রা/বা, ল্যাক্); মনের মধ্যে  
অনেকানেক ভাব উপস্থিত হয়; ভাড়াভাড়ি কাজ করিবার ইচ্ছা (অক্কা-  
লিক্-আস্); নিদ্রাশূন্যতা (চায়না); বেদনা যন্ত্রাদি অসজ হইয়া পড়ে;  
(অরাম্, চায়না), বাস্তব দ্রবণ রোগী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; সুস্থ  
ইঞ্জিয়ার অতিরিক্ত চেতনা, এমনকি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরও রোগী অনায়াসে  
পড়িতে পারে; প্রবণ, ভ্রাণ, স্বাদ এবং স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদির আতিশয্য এবং  
সামান্য মানসিক অবসন্নতাও রোগী অধিক বলিয়া অনুভব করে।

অস্ত্রক। মাথা ঝিম ঝিম করা এবং মাথার গো-দুপে বোধ;  
মস্তিষ্ক আচড়াইয়া বা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যেক্রপ হয়, মাথায় সেক্রপ  
বেদনা বা যাতনা (মিউর-আস্, বিরেট্-আস্); কাটা মারিরা রাখিলে যেক্রপ  
হয়, মাথার এক পার্শ্বে সেক্রপ বেদনা বা যাতনা যাহা বহিবায়ুতে বৃদ্ধি হয়  
(আপারিকান্, আনাকার্ড্, আর্বিকা); আহাতির পর মাথা বেদনার বৃদ্ধি

কেকিউল্, নান্স-বন্) এবং বহির্বিষ্মতে মাথাধরা থাকে না ও ঘরের মধ্যে গেলে মাথা বেদনা পুনরায় আরম্ভ হয় (পাল্‌স্)।

চক্ষু । দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি ।

কর্ণ । শ্রবণ শক্তির অত্যন্ত প্রগরতা (কোকা, ওপিয়াম্) ; কোন প্রকারেব শব্দ বা গোলমাল কানে লহ্য হয় না বা কানে লাগে এবং তদ্রূপ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে ।

নাসিকা । শ্রাবণ শক্তির বৃদ্ধি (একন, অ্যাগারিকাশ্, বেল্, কলচ্, হিপ্পোলাফ্, লাইকোপ)।

মুখমণ্ডল । অপরাহ্ন ১টার সময় মুখমণ্ডল শুক এবং গাল লালবর্ণ ; মুখমণ্ডল, ডাইন চক্ষুর গোলক এবং মাথাব ডাইন পার্শ্বের স্নায়ুশূল ।

মুখগহ্বর । দন্তশূল, কেবল শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল লাগিলেই যাহার উপশম হয় (বিস্মাগ্, ব্রাই, ক্রিমোটস্) ; স্বাদের আতিশয্য ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারের পূর্বে অত্যন্ত ক্ষুধা, যাহার দ্রুত রোগী অত্যন্ত ভাড়াভাড়ি ব্যগ্রতার সহিত খায় ; ক্ষুধা বা কচির হ্রাস ; হিকা । উদরে বেদনা, যাহার দ্রুত মনে হয় যেন উদর ফাটিয়া যাইবে এবং তদ্রূপ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়া ।

শ্বাসযন্ত্র । প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়াইলে কণ্ঠনালীতে ধস্‌ধসে বোধ এবং স্বরতজ (কার্‌সো-অনিমেগ্, কষ্ট, ফস) ; বৃক্কের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা ; ঘন ঘন নিশ্বাস টানা ; আক্ষেপিক শুক কাশি (আলাম্, সিমিসিক্, হায়োস্) ।

নিদ্রা । শারীরিক এবং মানসিক অত্যন্ত উত্তেজনার দ্রুত নিদ্রা-শূণ্যতা (সিমিসিক্, কোকা, হায়োস্, ওপিয়াম্) ।

জ্বর । প্রত্যেকবার নড়াচড়াতে শীতের বৃদ্ধি (আণিকা) ; আভ্যন্তরিক শীত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল এবং বাহ্যিক উষ্ণতা ।

চর্ম্ম । গায় হামের আয় কুস্কুড়ী (আন্টি-কুড, ব্যাপ্ট্, পাল্‌স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের শুক উষ্ণতা (একন) ; চর্ম্মের অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং তদ্রূপ ক্রন্দন ।

ব্যবহার । হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা জনিত অস্থখ ;

হঠাৎ কোন সম্ভাব্য জনক বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অস্থব্ধ; প্রারম্ভিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত উত্তেজনা; অত্যন্ত কষ্টদায়ক শ্বাসশূল; দস্তশূল; নিদ্রাশূন্যতা; হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি অস্থব্ধে কফিয়া ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । অনেক স্থান চুলকাইবার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যাতনামূল্য করিতে না পারিয়া চুলকানে অশক্তি; মানসিক উল্লাসের দরুন শারীরিক উত্তেজনা; স্থির ভাবে রাখিতে ইচ্ছা সত্যোত্তরোগীর হাত কাঁপে; হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতে মুচ্ছা বাওয়া; অতিরিক্ত উত্তেজনায় দরুন আক্ষেপ (Convulsions) (জেল্ম); অসহ্য বেদনা (অরাম, চারনা, কাম্), ব্রাহার দরুন কোণী একবারে হতাশ হইয়া পড়ে; বহির্বাগ্ সেবনে অনিচ্ছা, কারণ উদ্বাহতে অস্থব্ধ বুদ্ধি হয় ইত্যাদি কফিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । কফিয়ার কার্য্যের সঙ্গে ক্যানোসিস, ইগ্নেসিয়া এবং কোকার কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহাব কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, কটিকাম্, চারনা, ককিউলাস্, ভাগোসায়েরাম্, লাইকোপডিয়ারাম্, নাক্স-বমিকা, ওপিয়ারাম্, পাল্‌সেটিলার কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । একোনাইট, ক্যানোসিস, ইগ্নেসিয়া, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিলার কফিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অতিরিক্ত পরিমাণে কার্ফ থাইয়া কোন প্রকারের পুরাতন আকারের রোগ উৎপন্ন হইলে লক্ষণ বিশেষে ক্যানোসিস, ইগ্নেসিয়া, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স-বমিকা, পাল্‌সেটিলার ইত্যাদি ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে ।

ডাইলুশন বিচার । ৬ হইতে ১২ ক্রমের আরোেকই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্টার বেজেস ( Dr. Bayes ) মতে সকল প্রকার অস্থব্ধেই ১২ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । এই ঔষধের ৩০ দশমিক এবং ৩০ শতভাগিক ডাইলুশনও অনেক চিকিৎসক ব্যবহার করিয়া থাকেন ।



## কল্‌চিকাম্ অটাম্‌নেলী,—কল্‌চ্

(COLCHICUM AUTUMNALE,—COLCH.)

ইউরোপের অনেক স্থানে ভিজা মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড এবং আয়ারলণ্ডের কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বসন্ত কালে পাতা শুকাইয়া পড়িয়া গেলে ইহার গোলাকার কাঁচা মূল বা শিকড় সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রস্তুতকৃত ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**সাধারণ ক্রিয়া।** মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মজ্জা সঞ্চরীয় এবং গ্যাংলিয়োনিক্‌ স্নায়ুশুল্কীয় (Ganglionic System of nerves) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দরুণ মস্তিষ্ক এবং কসেরূকা মজ্জা উত্তেজিত হইয়া আক্কেপ (Convulsions), খিলুধরা (Cramps), স্নায়ুশূল, পক্ষাঘাত এবং দুর্বলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুশূল উপর উক্ত প্রকারের কার্যের প্রতিক্রিয়াতে ইহা অস্থির আবরক কঠিন পর্দা (Periosteum), সাইনোভিয়াল্‌ পর্দা (Synovial membranes), (বিশেষতঃ হৃদয় স্নায়ু), মূত্র এবং পরিপাক সঞ্চরীয় যন্ত্রাদি এবং কতক পরিমাণে শ্বাস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা শৈল্পিক বিস্তারিত নিঃসরণে পরিবর্তন এবং উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বাহার দরুণ সন্ধি বাতের জ্বর প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বর বেদনা বা বাতনা এবং রাত্রিযোগে বেদনাদির আক্রমণ কল্‌চিকামের এক বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**মন।** সর্বদা চিড়্‌ চিড়্‌ করা এবং কিছুতেই মন তুষ্ট না হওয়া (ক্যাল্‌ক-কন্‌, ক্যাম্‌, সিনা); উজ্জল এবং উগ্র গন্ধ সহ হয় না (নাক্স-বন্‌), গায় আঘাত লাগা বা স্পর্শ এবং অশ্রুব অজ্ঞান কার্য্য একবারে সহ হয় না; বেদনা যন্ত্রণাদি একবারেই সহ হয় না (ক্যাম্‌, কফিয়া); সকল বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া (আজেক্ট্‌-নাইট্রিক্‌, ক্যাক্‌-কার্ক্‌, ক্যাহ্‌)।

**মস্তিষ্ক।** মাথা, প্রধানতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং স্নায়ু মস্তিষ্ক (Cerebellum) মধ্যে অত্যন্ত চাপাবোধ; মাথায় ছিদ্র করার জ্বর

বেদনা, প্রধানতঃ চক্ষুর উপরিভাগে ( কালোস্ ) ; কপাল এবং মাথার উপরি ভাগে হামা দেওয়া বা হুড়্-হুড়্ করার জ্বার অনুভূত হয় ( অ্যাম্বেন্টি-নাইট্রিক্, কুশ্রাম্ ) ; চলিয়া আসিয়া বসিলে মাথাধোরা ; চক্ষুর উপরি ভাগে ফাটিয়া যাওয়ার জ্বার অনুভূত হয় ; মাথার চিড়িকমারা বা দপ-দপানি ( পাল্‌স্ ) ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষে কম বা কাপ্সা দেবা ; চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলপড়া ; চক্ষুর কর্ণিয়ারে ( Cornea ) সাদা দাগ পড়া ।

কর্ণ । কর্ণশূল এবং কানের মধ্যে ভৌজ্জু ছুঁবীদিয়া কাটার জ্বার অনুভূত হওয়া ( বেল্, পাল্‌স্ ) ; কানের মধ্যে সৌঁ সৌঁ শব্দ হওয়া ; কান যেন বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয় । "

নাসিকা । সমুদয় প্রকারের গন্ধই নাকে লাগে বা সহ হয় না । ( একন্, আগারিকান্, বেল্, কফিয়া, হিপ-সাল্‌ফ্, লাইকোপ্ ) ; দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী অস্থিতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা এবং টাটানি ; লজ্জার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল রক্ত, বিমর্ষ এবং অভ্যস্ত যাতনার চিহ্নযুক্ত ( আর্স্ ) ; মুখ মণ্ডলের পেশী এবং হাড় কসিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জ্বার প্রবল বেদনা ; নিহাব লাগিলে স্বেদ্রূপ হয়, মুখ মণ্ডলে সে রূপ হুড়্-হুড়ী বা চক্‌চকানি ( আগারিকান্ ) ; মুখমণ্ডলের শোধের জ্বার ক্ষীণ ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত ( আণ্টি-ক্রুড্, ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্‌স্, সাল্‌ফ্ ) ; জিহ্বা ভারি, শক্ত এবং উহাতে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না ( কোনারায় ) ; দন্তশূল এবং দাঁতের গোড়ায় ছিড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা বা বাতন ; দাঁতে সামান্য স্পর্শন ও সহ হয় না ; মুখ-গহ্বর এবং গলার মধ্যের স্নৈয়িক কিল্লীর প্রদাহ ; মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল টাটা, অথচ গলার মধ্যে শুকাহুতব । তালুকা এবং মুখগহ্বরের পশ্চাত্ত ভাগ প্রদাহযুক্ত এবং লাল বর্ণ ।

পাকস্থলী এবং উদর । আহারে অনিচ্ছা বা অরুচি ( ককিউল ) ; আহার দ্রব্য দেখিলেই গা বমী বমী করা ( আণ্টি-ক্রুড্, আর্স্ ) ; আহার দ্রব্যের পক্ষে আরো গা বমী বমী করে ; অভ্যস্ত পিপাসা, কিন্তু খুধা থাকে

না; মুখে তিক্তবান; বাত, ডিম, চর্কিযুক্ত মাংসের গন্ধে বমনোৎসেগ, বমন এবং কখন কখন মূর্ছাও হয়; উদগার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালাসুত্তব (আর্স্); প্রত্যেকবার নড়া চড়াতে বমন হয়, বাহার দক্ষণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না (ব্রাই); উদরস্থ আহার দ্রব্য বা পিত্ত বমন (আন্টি-ক্রুড্); পাকস্থলীর মধ্যে বরফের জায় ঠাণ্ডা বোধ (ক্যাস্ফার, লবোস্, কস্); পাকস্থলীতে স্ত্রী বিধানের জায় অস্বস্তি হয়; উদরোর্ধ্ব প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালাসুত্তব (আর্স্, বেল্, ক্যাস্, কস্, বিরেট্-আব্)। অতিরিক্ত আশ্রয় করিলে যেক্রপ হয়, উদর সেক্রপ ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয় (চায়না, লাইকোপ্); উদরে কামড়ানীর জায় বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, চেলিডন্, মার্ক্); শূল বেদনা, আহারের পর, দ্বিতি বায়ু উপশমক দ্রব্য খাওয়ার পর পেট্ কাঁপা, উদরাময় হইয়া গেলে বাহার উপশম হয়; ষাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিলে শূল বেদনার উপশম হয় (কলোস্)।

মল এবং মলদ্বার । সন্ধ্যাকালে শুষ্কহার দিয়া প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত হর্গক্ষয়ক দ্বিতি বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, প্রাক্); শুষ্কহারের লক্ষ্যেচক ঘরের আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠদেশের কাম্পন; অত্যন্ত কষ্টের সহিত অত্যন্ত অল্প পরিমাণে মলত্যাগ; বারবার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না; বায়ু নিঃসরণে বাহ্যের বেগের কতকটা উপশম হয়; প্রবল কষ্টদায়ক কৌথপাড়া (মার্ক্, ক্যাপ্); মল প্রথমত পিষ্টযুক্ত এবং তৎপন্ন পক্ষীর টুকরা, চট্ চটিয়া আঠা পদার্থ ও হরিদ্রাবর্ণের পক্ষীর জায় ছেকড়া ছেকড়া পদার্থ মিশ্রিত বল ত্যাগ; প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রার রক্ত বিশিষ্ট মল ত্যাগ; বল স্বচ্ছ ও চট্ চটিয়া আঠা পদার্থ মিশ্রিত (হেলিবোরাস্, দাস্টক্); পক্ষীযুক্ত স্নেহা নির্গত হইয়া পেটকামড়ানীর উপশম হয়; স্বচ্ছ, গদ গোলার জায় স্নেহা ভেদ (আলোজ্, হেলিবোরাস্, ক্যানী-বাই); কণা কানীর আশ্রয় এবং মল সাদা স্নেহা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কষ্টদায়ক কৌথপাড়া; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন শুষ্কহার ছিঁড়িয়া বাইবে; শুষ্কহার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani)।

মূত্রবস্ত্র । খারবার মূত্রত্যাগ; বারবার অল্প পরিমাণ কাল্টে, বোলাটিয়া মূত্র ত্যাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কৌথপাড়া

ও মূত্র নালীতে জ্বালা (কাফ, কাপস্, মাক্-কর); কালিচে, রক্ত মিশ্রিত, প্রায় কংগীর জায় মূত্রভাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূত্র কুচ্ছ (আস্, কাফ); মূত্রে সাদাটিয়া তলানি পড়ে (কাক্-কার্, কাফ) ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস প্রবাহ কষ্টকর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক অত্যন্ত কঠোরভব; রাত্রিতে কালি এবং কালিবার সময় অনিচ্ছাপূর্বক বা অসাড় মূত্র নির্গত হয় (আলাম্, কঠ, পালস্); বৃক ছিঁড়িয়া ফেলা বা ভেঁতা ছুরী দিয়া কাঁটার জায় বেদনা বা যাতনা ।

হৃৎপিণ্ড । প্রবল হৃৎস্পন্দন (একন্, ফাস্, বেল্, প্পাইজেল্); তক্ষণ বাত রোগের পর হৃৎপিণ্ডের অস্থখ; নীড়ী ক্রতগামী এবং কঠিন অথবা পূর্ণ এবং মৃদুগতি বিশিষ্ট; নীড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং হ্রস্ব; নীড়ী ক্রতগামী এবং মৃদুবৎ হ্রস্ব ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে বাতের বেদনার জায় কদিয়া ধরা বা ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা (পালস্); ওহ বাতের উপরি ভাগের কোন কোন অংশে ক্ষত হওয়ার জায় টাটানি বা চড়্-চড়ানি, স্পন্দনে যাহা অত্যন্ত বেদনাবৃত্ত হয় বা টাটায় ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পেশী এবং সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জায় বেদনা; হাত এবং পায়ের পাতার অবশবোধ এবং উহাতে কুট্-কুটানি । বাহ্যে পক্ষাঘাতের জায় বেদনা বা যাতনাদি এত প্রবল হয়, যে উহার দরুণ রোগী একটা ক্ষুদ্র বৃত্ত অঁাটিয়া বা দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে না; বাহ্যে বাতের বেদনা যাহা আত্মুল, প্রধানতঃ আত্মনের নিক্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (ত্রাই, কলোস্) । পায় বাতের বেদনা যাহা পায়ের আত্মুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পায় খিলধরা (কাক্-কার্, কাক্ফার, নাক্-বস্, সালফ্); পা এবং পায়ের পাতার গোণের জায় ক্ষীতি (আস্, এপিস্); পায় নিহারাদি লাগিলে পায়ের আত্মলে ক্ষুদ্র হাঁকা কুট্-কুটানি (আগারিকান্) ।

নিদ্রা । দিনের বেলা নিদ্রাবেশ বা স্থিমান (নাক্-মফ্) ।

চক্ষু । নিদার লাগিলে ঘেরুণ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরুণ পড়্-ফড়ী বা চড়্-চড়ানি (আগারিকান্) ।

**জ্বর ।** সমুদয় শরীরেই ঠাণ্ডা বা শীতবোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শীত কম্প এবং হামা দেওয়ার ভায় স্বচ্ছতা ; রক্তিতে শুষ্ক উষ্ণাহতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা (একন্, আস্) ; ঘর্ম্মাবরোধ ; টক গন্ধ যুক্ত প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম বাহ্য হঠাৎ চর এবং হঠাৎ শুকাইয়া যায় ; এই প্রকার ঘর্ম্ম বাত রোগেই অধিক হইয়া থাকে ।

**ব্যবহার ।** পেণী এবং সাংক্রান্ত জনিত অস্থখ ; শরীরের বহির্দেশে হইতে বাত রোগ আভ্যন্তরিক রোগের মধ্যে সরিয়া পড়া ; পক্ষাঘাত ; শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র এবং কোটনের শোণ, প্রধানতঃ হৃদাহাবরক কিল্লীর মধ্যে জলেব ভায় দূষিত পদার্থেব সঞ্চার ; বক্ষশোণ ; উদরী ; অরায়ুর শোণ ; শোণেব ভ্রাম্মাক্তি (Etema) ; সাদ্যাজিক শোণ ; উদরাময় ; বক্তামাণয় ; হাঁপানি কাশি ; হৃদাহাবরক কিল্লী প্রদাহ (Pleurisy) ; হৃদাহাবরক কিল্লী প্রদাহ (Pericarditis) ; চক্ষু প্রদাহ এবং চক্ষে ছানি পড়া (Cataract) ; সামান্য ওলাউঠা ইত্যাদি অস্থখে কল্‌চিকাম্ ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা এবং উহাতে অসাড়বোধ ; গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাতরোগ ; নিহার লাগিলে যেরূপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে সেরূপ টন্ টন্ করা ; শারীরিক পরিশ্রমের পর যেরূপ হয়, সেরূপ দুর্বলতা বা অসঙ্গতা (আস্, ব্রাই, চায়না) ; হঠাৎ অত্যন্ত বলকয় (আস্, কাম্ফাব, নিকেল) ; সমান্য স্পর্শনেও আক্রান্ত স্থানে বেদনার উদ্রেক হয় ; বেদনা এক দান হইতে অন্য স্থানে হঠাৎ সরিয়া পড়ে (পাল্) ; বলিষ্ঠ বোলীব হুদ সাংক্রান্ত বা গাউট্ (Gout) এবং বৃদ্ধবয়সের অস্থখে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ; বার্তিতে, মানাসক পরিশ্রমে, বিছানায় উঠিয়া বসিলে নড়াচড়াতে অস্থখেব রক্তি এবং নিদ্রা বা বিশ্রাম কালীন এবং বহির্বায়তে অস্থখেব উপশম ইত্যাদি কল্‌চিকামের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পবিগণিত ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** কল্‌চিকামের কার্য্যেব সঙ্গে সিবিসি-কিউনা, আর্বিকা, ব্রাইওনিয়া এবং বিরেট্রাম্ আল্‌বামের কার্য্যেব বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এত ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যেব সঙ্গে একো-

নাইট্, বেলাডোনা, কাকিউলাস্, মার্কিউরিয়াম্, নাক্স্, বমিকা, ওপিয়াম্, পাল্‌সেটিনা, রাস্ টক্স্ এবং সিপিয়ার কার্বোর সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বেলাডোনা, ক্যান্‌ফার, কাকিউলাস্, নাক্স্, বমিকা, স্পাইজেলিয়া, পাল্‌সেটিনা কল্‌চিকাম্‌এব প্রতিষেধক ঔষধ মন্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় কল্‌চিকাম্‌ খাইয়া বিষাক্ত হইলে আয়োনিয়াম্ কল্‌চিকাম্‌এর এক কোঁটা চিনির জলে মিলাইয়া সেবা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, সামান্য রকমের কুহ্ম সন্ধিবাত্তে (Gout) কল্‌চিকাম্‌এর মূল আরোক ৫ কোঁটা মাত্রার ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা সেবনে বেদনাদিবিষ অতি শীঘ্র শীঘ্র উপশম হয়, অগতঃ এত অধিক মাত্রায় ঔষধ সেবনের দরুণ অনিষ্ট হয় না । কিন্তু ডাক্তার ডান্‌হাম্ (Dr. Dunham) বলেন যে রোগ অনেক পুরাতন আকার ধারণ করিলে ১৫ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । চক্ষের ছানিতে (Cataract) ৩ষ্ঠ ডাইলুশনে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায় । চক্ষের ছানিতে অনেক চিকিৎসক ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহৃত করিয়া থাকেন ।

কলোসিস্তিস্,—কলোসিস্ত্,—কলোস্

(COLOCYNTHIS —COLOCYNTH,—COLOC.)

যাপান, ইজিপ্ট্ এবং তুরস্ক দেশে এই গাছ জন্মে । মূল সংগ্রহ করিয়া ইহার বিচিত্র শুকনা খণ্ড দিয়া তক্‌ স্পিবিটে ইহাৰ মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । যথা নিয়মে সুগাঢ় জল মিষ্টের সঙ্গে মিলাইয়া ইহার ভুঁড়াও প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাদারণ ক্রিয়া । গাংগ্লিয়োনিক্‌ স্নায়ু মণ্ডলীর (ganglionic nervous system), প্রধানতঃ সুষুমণ্ডল এবং মস্তকেব জ্ঞান উৎপাদক বৃহৎ স্নায়ু বা ট্রোগেমিনাস্ (Trogeminas), এরট্ (Aorta) নানক বৃহৎ ধমনিব চতুঃস্পার্শ্বকীয় স্নায়ু সমূহ বা সৌলার প্লেক্সাস্ (Solar Plexus), কোমর এবং উরদেশের স্নায়ু এবং উক্ত স্নায়ুগুলি শবীরেরদেব দে অংশ দিগ্‌অহিবা

বার, উহার উপর কলোসিসিস্ কার্য অতি প্রবল । উক্ত স্নায়ু ইত্যাদির উপর কার্যের দক্ষ স্নায়ুশূল এবং কখন কখন আক্রান্ত অংশে প্রকৃত প্রদাহও উপস্থিত হইয়া থাকে । সোমাল প্রেক্সাস্ দিয়া উক্ত প্রদাহ সাহায্য বহা নালীতে (Alimentary Canal) বিস্তৃত হইয়া বমন, ভেদ এবং উদরে ভয়ানক আকারের শূল বেদনার জন্ম বেদনা বা পেট কামড়ানী ইত্যাদি কষ্টকর অস্বস্তি উৎপাদন করে । ট্রিজিমিনাস্ স্নায়ুর অগ্রভাগের জ্ঞান উৎপাদক শক্তির কার্যের বৈলক্ষণ্য উপাদান করিয়া ইহা মুখমণ্ডল, চক্ষু এবং মস্তকের স্নায়ুশূল উৎপাদন করে । কোমর এবং পায়ের স্নায়ুর (Lumbar and 'rural nerves) মধ্য দিয়া ইহা কুচক্রিক সন্ধিবাহ বা সায়ে-টিক্ স্নায়ুশূল (Sciatica) এবং অন্যান্য প্রকারের স্নায়ুশূল জনিত রোগ উৎপাদন করে । উদরে শূল বেদনার জন্ম ভয়ানক প্রবল বেদনা (যাহার দক্ষণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়) উৎপাদন করা কলোসিসিস্ একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কথা বলিতে, প্রবেশ উত্তর দিতে অথবা বস্তু বাক্যবর্ণকে দেখিতে অনিচ্ছা (অভেলন্স); অত্যন্ত খিট্‌খিট্‌ করা এবং বিষমতা; অধৈর্য্য হওয়া এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়া (ক্যাপ্‌স্, নাক্স-বম্); রাগ করা এবং সন্দেহা রাগান্বিত থাকা (ব্রাই, ক্যাম্, কোনাবাম্, নাক্স-বম্); রোগী (ত্রীলোক) অল্প লোক এবং আপন দুর্ভাগ্যে অত্যন্ত ক্রিষ্ট হয়; প্রাণাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু খোলা থাকা এবং বিচানা হইতে পলায়নের ইচ্ছা ।

মস্তক । সাধারণ গোলামে বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর কোণের চাপিয়া ধরাণ জন্ম বেদনা বা যাতনা; কপালে চাপিয়া ধরাণ জন্ম বেদনা, মাথা ছেঁট করিয়া উপুড় হইলে বা চীৎকারে শয়ন করিয়া থাকিলে ব্যথার বৃদ্ধি হয়; মস্তকের সমুদয় স্থানের মধ্য দিয়া ছিড়িয়া ফেলা বা ঘনন করার জন্ম বেদনা বা যাতনা, চক্ষুর উপরে পাতা সঞ্চালনে বাঁধা অস্বস্তি হইয়া পড়ে; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার জন্ম ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে ছিদ্র করার জন্ম ভয়ানক বেদনা; কপালের ডাইন পার্শ্বে সূচী প্রবেশ বা ছিদ্র করার জন্ম বেদনা বা যাতনা, স্পর্শ করিলেই যাহা অস্বস্তি

হয় ; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরাব ভায় ঘৃণ্-ঘৃণে বেদনা যাহা ক্রমে ক্রমে কষ্টনবৎ এবং অধিক প্রবল হয় ; এক পোশে মাথা ধরা (আধ কপালিয়া মাথা ব্যাথা) এবং উর্দ্ধাব সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং বমন ।

চক্ষু । চক্ষু গোলকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চাপাবোধ, মাথা হেট করিয়া উপড় হইলে যাহা অধিক অস্বভূত হয় ; চক্ষে বেদনা ; ডাইন চক্ষুর গোলকে কষ্টনবৎ বেদনা ।

কর্ণ । দুই কানেই সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া এবং দণ্ডপানি, বাম কানেই যাহা অধিক অস্বভূত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল কালচে লালকর্ণ (বাল্‌ট্, ওপিয়াম্) ; বাম গালের মেলাব অস্থিতে (Malar bone) স্ফোর্চক এবং চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা যাহা বাম এক পর্শ্যস্ত বিস্তৃত হয় ; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিড়িয়া ফেলার ভায় বা অস্বাভূত বা ছল ফটানের ভায় বেদনা যাহা কর্ণ এবং মস্তক পর্শ্যস্ত বিস্তৃত হয় ; গালে ছিড়িয়া ফেলার ভায় বেদনা ; মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ঘাট্‌শুল্ ; বাম গালের হাড়ে খিলধরার ভায় বেদনা যাহা চক্ষু পর্শ্যস্ত বিস্তৃত হয় ; নড়া চড়া বা স্পর্শন বা সামান্ত আঘাতে বেদনাদির বৃদ্ধি (চাফনা) ।

মুগগন্ধর । মুগ ক্রমাগত তিক্ত এবং বিবক্তি জনক স্বাদ (ত্রাষ্টি, চায়না, নাস্‌ক্‌, পাল্‌, সাল্‌ক্‌ ; জিহবার অগ্রভাগের জালা (ক্যান্‌-কার্প্‌, কার্পে-অনিমেস্‌) ; ডান উঠিয়া বা হটলে হেচপ হয়, জিহ্বায় সেকপ অস্বভূত হয় (আইবিস, প্রাটিনা, মাস্কু-নরিয়া, বিরেট-আল্‌, বিরেট-বিরাইড্‌) ।

পাকস্থলী এবং উদর । বহুদন প্রকাশ্যেব আহার বা পানীয় ত্রবোই তিক্ত স্বাদ ; বাহারেব পথ মুখে তিক্ত স্বাদ (নাইটিক্‌-আস্‌) ; প্রবল পিপাসা (একন্‌, আস্‌, ত্রাষ্টি) ; আহারে অকচি এবং গলার মধ্যে চাচিয়া কেলান্ত্র ভায় অস্বভূত হয় ; কাঠ উদগার (ককিউনাস্‌) ; পাকস্থলী হইতে যেন বমনোদ্বেগ হয় একপ অস্বভূত হয় ; তিক্ত স্বাদ বাশষ্ট হরিদ্রাবর্ণের তরল পদার্থ বমন ; পাকস্থলীতে জালাযুক্ত বেদনা (আস্‌, এপিস্‌, ক্যান্‌, কল্‌, কস, বিনেট্‌-আল্‌, প্রত্যেকবার আহারের পর উদরোচ্চ প্রদেশে



কামড়ানির জ্বার বেদনা, সম্ভার সময় বাহার বৃদ্ধি হয় ; উদরোজ্জ্ব প্রদেশে পূর্ণবোধ ; রাত্রিতে পাকস্থলীতে খিলধরা, উদরার উঠিলে বাহার উপশম হয় ; পাকস্থলীতে খালিবোধ ; পাকস্থলীর মধ্য স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় বা টাটায় ; বুক এবং উদরের নানা স্থান হইতে কঠিনবৎ বা ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বার বেদনা আবন্ত হইয়া পাকস্থলীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া দ্বিত হয় ; প্রবল প্রচাপনে এবং হাঁটু গুটাইয়া জড় সড় হইয়া থাকিলে এই বেদনার উপশম হয় ও বোগী বিরক্ত বা রাগান্বিত হইলে এই বেদনার উদ্বেক হয় । উদরের জ্বাই পার্শ্বেই খিল ধরার জ্বার বেদনা, চাপ দেওয়ার পর অথবা টেবলের উপর উদর ফেলান দিয়া উপুড় হইয়া চাপ দিয়া রাখিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; উদর স্কীত ও বিস্তৃত এবং বেদনায়ুক্ত (একন্. বেল. মার্ক) ; উদরে ভয়ানক সঙ্কোচক, মোচড়াইয়া ধরার জ্বার বেদনা (সিনা). নাভির উপরিভাগেই বাহা অধিক অন্তর্ভূত হয়, এবং বাহার দক্ষণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া জড়সড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয় (আলোজ্, কষ্ট, আইবিস্, নাক্স-বম্, ক্রম্, সালফ্., বিবেট্-আল্.) এবং একভাগ ছাড়িয়া অত্র একভাবে থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় (বিপরিত অবস্থায় বেলাডোনা ব্যবস্থা) ; একভাবে পবিবর্তন করিয়া অত্র একভাবে থাকিলেই বেদনার দক্ষণ বোগী অত্যন্ত অস্থির হয় এবং ছুটফুট্ করে ও চিংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ; ৫১০ মিনিট অন্তর বেদনার বৃদ্ধি ; মল-ত্যাগ বা গুহ্বার দিয়া বায়ু (Flatus) নিঃসরণে বেদনার ক্ষণিক উপশম হয় ; উদরে শূল বেদনার জ্বার বেদনা এত কষ্টকর হইয়া পড়ে, যে উহার দক্ষণ উপশম পাওয়ার আশায় বোগী মেজ বা পাটের কাঠে উদরে প্রবল বেগে চাপ দিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ; অস্ত্র পাথরের চাপ দিয়া নিম্ভুডাইলে যেকপ হয়, উদরে সেকপ অন্তর্ভূত হয় (নাক্স-বম্) ; উদবে ছুরি দিয়া কাটার জ্বার বেদনা ; অস্ত্র বৃদ্ধি হইলে বেকপ হয়. কুচকি প্রদেশে সেকপ ঠেলিয়া বাতির হওয়ার জ্বার অন্তর্ভূত হয় এবং আক্রান্ত স্থানে চাপ দিলে বহির্গত অস্ত্র যেন স্থানে প্রবিষ্ট হয় এরূপ অন্তর্ভূত হয় ; ডিম্বকোষের প্রদাহে বেকপ হয়, স্ত্রীলোকের উদরের স্থানে স্থানের গভীর প্রদেশে স্থলী বিধানের জ্বার বেদনা বা চিড়িক মারা ; উদরে গড়্ গড়্, কল কল এবং বেজের ডাকের জ্বার শব্দ হয় (খুজা) ; কাফি বা তামাক বাইশে অশ্রুব মধ্যে বেদনার অনেক উপশম হয় ;

একবার আহারের পর বেদনার বৃদ্ধি এবং উহার পরবারের আহারের পর বেদনা থাকে না এবং তৎপর আহারের পর আবার বেদনার বৃদ্ধি হইয়া এই প্রকার ক্রমাগত হইতে থাকে (ফেরাম্) ।

**মল এবং মলদ্বার ।** বারম্বার অত্যন্ত বাহ্যের বেগ, বাহার দ্রুপ মনে হয় যেন গুহ এবং গুহদ্বার অনেক কাল ধবিয়া উদরাময়ের দ্রুপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ; আমাশয়ের লক্ষণাক্রান্ত উদবাসন, আহার বা পানীয় দ্রব্য উদরস্থ হইলেই বাহার উদ্রেক হয় (আলোজ্, ফেবায়, নাস্-বম্) ; প্রচুর পরিমাণে মলভাগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু (Flatus) নিঃসরণ (আলোজ্) ; রক্ত ভেদ ; আহারের পব তরল ভেদ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গুহদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে দূষিত বায়ু নিঃসরণ এবং উদরে বেদনা (আগাধিকাণ্) ; পাতলা, কেশাবৃত্ত, যাক্রান্তের জায় হরি-জাবর্ণের পচাছিন্নবৃত্ত মল ভেদ ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন, বাহা নির্গত হওয়ার সময় মনে হয় যেন গুহদ্বার দিয়া পাথর নির্গত হইতেছে ; বিরক্তি এবং শোণের পর সবুজবর্ণের তরল ভেদ ; আমাশয় ; মল রক্ত মিশ্রিত, চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ বা অল্প টাচিয়া ফেলিলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ কাঁচা বাছ মাংস ধোয়া জলের জার জলবৎ ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া পর্দার জায় পদার্থ বিশিষ্ট এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়বীর কঠোরক কোঁপাড়া, মল ভাগের পর বাহার উপশম হয় ; রক্তমিশ্রিত তরলমল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মধ্যে ভয়ানক প্রবল বেদনা, বাহা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; গুহদ্বারের সঙ্কোচক বস্তুর পক্ষাঘাত হেতু গুহদ্বার সর্বদা শোলা থাকে (ফস) ।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্র সঞ্চিত থাকার দ্রুপ মূত্রাধারে পূর্ণবোধ এবং গুহ দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণের সময় মূত্রাধারে চাপ পড়ার দ্রুপ ঠাণ্ড মূত্র নির্গমন ; বারম্বার মূত্রের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে অতি অল্প পরিমাণে মূত্র নির্গত হয় (ইক্সুলাস্, এপিস্, প্রীক্, তেলিবোরাস্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্) ; অত্যন্ত তর্পকগুঁড়, গাঢ়, আঁটাল, গৌদ গোলার ন্যায় অল্প পরিমাণ মূত্র ভাগ ; মূত্র মাংস ধোয়া জলের ন্যায় দিকা লালবর্ণ এবং উহাতে সাদাটিয়া কটাবর্ণ ভলানি পড়ে ; মূত্র কটাবর্ণ (ব্রাউ) বাহা মূত্র ভাগের কতকগুলি পরেই ঠাণ্ডা হইলে সোলাটিয়া হয় এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণে ভলানি পড়ে ।

**জননেদ্রিয় ।** গ্রীলোকের বাম ডিম্বকোষ প্রদেশে খিল ধরার জায়  
বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেম উক্ত স্থান আঁথের রস বাহির করার কলের  
অথবা রাখিয়া মোচড়াইতেছে ; ডিম্বকোষে কসিয়া ধরা বা ছিদ্র করার  
জ্ঞান বেদনা বা যাতনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু ওটাইয়া জড়সড় হইয়া  
থাকে এবং ছট্-ফট্ করে ।

**স্বাসযন্ত্র ।** কণ্ঠনালীতে উত্তেজনা এবং শ্বস্ শ্বসীর দরুণ রাত্রিতে  
কাশির উদ্রেক হয় ; বুকে অঁটা বা কষ্টানুভব ।

**গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ ।** ঘাড়ের পেশী শক্ত হয় বা নোয়ান যায় না,  
যাহার দরুণ ঘাড় ফিরাইতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় (চেনিডন্, রাস্ টক্স) ;  
গ্রীবার বাম পার্শ্বের পেশীতে কসিয়া ধরার জ্ঞান বেদনা, ঘাড় সঞ্চালনে  
যাহার রুদ্ধি হয় ; ঘাড়ের বাম পার্শ্ব চাপিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয়,  
ঘাড় ফিরাইলে যাহার রুদ্ধি হয় ; শ্বাস এবং রক্তবহা নালীগুলি কসিয়া  
টানিয়া রাখিলে যেদরুণ হয়, ডাইন কক্স প্রদেশের মধ্যে সেকরুণ কসিয়া টানিয়া  
ধরার ন্যায় প্রবল বেদনা ; কেবল শ্বাস টানিবার সময়ই কোমরের ডাইন  
পার্শ্বে কসিয়া বা বাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা (ব্রাই), চীৎ হইয়া শয়ন করিয়া  
থাকিলে যাহা অধিক প্রবল হয় ; সন্ধ্যার সময় কোমরের পশ্চাৎ  
দেশে এবং পার্শ্ব দুর্বল বোধ, যাহার দরুণ চলিতে বা নড়িতে ইচ্ছা  
হয় না ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বাতের  
জ্ঞান ছিঁড়িয়া ফেলা বা কসিয়া ধরার জ্ঞান প্রবল বেদনা (ব্রাই,  
লেডাম্, লাইকোপ্, মার্ক্) । জুঁ দিয়া কসিয়া অঁটিয়া রাখিলে যেদরুণ হয়,  
কুঁচকির সন্ধিতে সেকরুণ বেদনা যাহা উর্দ্ধদিকে কোমর এবং নিম্নদিকে পা  
পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; বাম কুঁচকির সন্ধিতে এবং ডাইন পার্শ্বে কসিয়া ধরা,  
স্পন্দন করার ন্যায় দপ্ দাপিয়া বেদনা ; সোয়াস মাগ্‌গ্‌নাস্ নামক পেশী  
খাট হইলে যেদরুণ হয়, চলিবার সময় ডাইন উর্দ্ধে সেকরুণ বেদনা বা  
যাতনা ; ডাইন উর্দ্ধে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত  
হয় ; বাম পায়ের ডিমে খিল ধরা ; বাম পায়ের পাতায় কসিয়া ধরার ন্যায়  
কন্‌কনানি ।

জ্বর । সমুদয় শরীরে শীত বোধ ; রাহিক শুষ্ক উষ্ণতা ; রক্তিতে মূত্রের গন্ধেব ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট বর্ণ্য হওয়া ।

ব্যবহার । রাগ জনিত অসুখ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রাগ থাকা ; উদরাময় ; রক্তামাশয় ; শূল বেদনা ; খিল ধরা ; উরুর সন্ধির অসুখ ; স্নায়ুশূল, প্রধানতঃ মুখ মণ্ডল এবং সার্বেটিক্ স্নায়ুব শূল (Sciatica) ; জীলোকের ডিম্বকোষের অসুখ (স্নায়ু শূলের ন্যায়) ; পেশী এবং সন্ধিবাত ; ওলাউঠা ইত্যাদি অসুখে কলোসিস্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শোক, এবং রাগ জনিত অসুখ ; সন্ধির কঠিনতা বা উপা সঞ্চালনে অশক্তি ; সমুদয় শরীরে দন্দপানি (পাল্‌স্, জিক্) ; হাত পা সঙ্কুচিত হয় ; শরীরের সমুদয় পেশীতেই কষ্টদায়ক খিল ধরার ন্যায় সঙ্কোচন (কুপ্রাস) ; মুচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা হয় ; সন্ধার সময়, বিশ্রামে বা শয়ন করিয়া থাকিলে, নড়াচড়াতে আহার বা পানের পর, রাগ হইলে অসুখের বৃদ্ধি এবং গুহ্ব দ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে (শূল বেদনা), কান্ধি খাইলে, তানাকু খাইলে, হাঁটু শুটাইয়া জড়সড় হইলে, প্রবল প্রচাপনে অসুখের উপশম ইত্যাদি কলোসিস্‌হের কতক গুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমুদয় বিশিষ্ট ঔষধ । কলোসিস্‌হের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাইওনিয়ার কার্য্যের নিম্নেব সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আর্সিনিক, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম্, কফিউলাস্, গ্যাংগোজিয়া, নাক্স বমিকা, টাকিসেপ্‌গ্রিবা, বেণাডোনা, কষ্টিকাম্, চেলিডোনিয়াম্, কফিয়া, লাইকেপোডিয়াম্, মার্কিউবায়স্, পাল্‌স্‌টেলা এবং টানামের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাম্‌ফার, কষ্টিকাম্, ক্যামোমিলা, কফিয়া, টাকিসেপ্‌গ্রিবা ইত্যাদি কলোসিস্‌হের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক নাত্রায় কলোসিস্‌ খাইয়া বিযাক্ত হইলে কুসুম কুসুম গরম হুদ, ক্যাম্‌ফার, ওপিয়াম্ ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । স্নায়ুশূলে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ দশমিক ক্রম ব্যবহার্য্য । শূল বেদনাতে লেপক ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহার করিয়া

থাকেন । হানিমান ২৪ এবং ৩০ ডাইলুশন ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়া-  
ছেন । ১ম, ২য় দশমিক ডাইলুশন এবং মূল আরোকও কেহ কেহ ব্যবহার  
করিয়া থাকেন ।

## কোনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্,—কোনায়াম্

(CONIUM MACULATUM,—CONI.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় স্থানের নদীর ধারে, বাগানাদির বেড়াতে এবং  
মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । সমুদয় কাঁচা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি  
এফ্‌ স্পিরিটে মিশাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । অধিক  
মাত্রায় এই ঔষধ সেবনে বিষাক্ত হইয়া জগত বিখ্যাত মহাত্মা সস্ক্রেটসের  
মৃত্যু হয় ।

সাধারণ ক্রিয়া । গতি উৎপাদন শক্তির সহায়কারী সাময়িক  
মণ্ডলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষণপক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া  
থাকে । গ্রন্থির উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষণ গ্রন্থির  
বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা উৎপন্ন হইয়া উহার নির্মাণে পরিবর্তন হইয়া থাকে ।  
এজন্যই গণ্ডমালা এবং কর্কট (Cancer) রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ  
ফল পাওয়া যায় । বৃদ্ধ বয়সের অন্তর্বে বিশেষ উপকার হওয়া এই ঔষধের  
একটা বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত । বৃদ্ধাঙ্গী অপেক্ষা বৃদ্ধ  
পুরুষের অন্তর্বে ইহা অধিক উপকারী ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা (লাইকোপ্, প্লাটিনা, পাল্‌স্) ; সর্বদা  
চিড়্‌-চিড়্‌ করা (ব্রাই, কলোস্, নাল্‌-বম্) ; আপন বিষয়ে সর্বদা ভাবিয়া  
অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হওয়া এবং সকল বিষয়ে উদাসীনতা (ফন্‌-আস্) ; কোন  
প্রকারের মানসিক পরিশ্রম করিতে অশক্তি (জেন্‌স্, নাল্‌-বম্) ; স্মরণশক্তির  
হ্রাস বা বিনাশ (আনাকার্ড্, নেট্রাম্-মিউর, ক্রিয়াজ্, নাল্‌-মফ্) ; কার্য  
করিতে অনিচ্ছা (সাইক্রেমেন্, নাল্‌-বম্, ফস্) ; অত্যন্ত স্থল বৃদ্ধি, বাহার

দ্রুণ রোগী যাহা পড়ে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না ; লোকের নিকট থাকিতে বা কাহার কথা শুনিতে অনিচ্ছা (ইগ্নেন্স্); হঠাৎ চমকিয়া উঠার স্বভাব ।

**মস্তক ।** মাথাঘোবা (আলাম্, অগ্রাফ্, বেল্, ড্রাট্, নাক্স-বম্), শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিছানায় পাশ ফিরিবাব সময় যাহাব অধিক উল্লেখ হয় (বেল্); প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই মাথা ঘোবা (ড্রাই); চলিয়া বেড়ানোর সময় মাথাঘোবা; চক্ষু বন্ধ এবং নাকের গোড়ায় অনবরত কেমন কেমন বোধ হয়; কপালে স্ফুটী বিধানের ন্যায় বেদনা যাহা কপালের মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয়; প্রাতঃকালে এবং বেলা দুই প্রহরের সময় কপালে উক্ত প্রকারের বেদনা; প্রাতঃকালে চলিয়া বেড়ানোর সময় মাথা ঘোবা, যাহাব দ্রুণ মনে হয় যেন মাথা অতিরিক্ত পূর্ণ রহিয়াছে এবং তদ্রূপ মাথা ফাটিয়া যাইবে; মাথার ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, যাহার দ্রুণ রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; এক পেশে মাথাধরা (আধ কপালিয়া মাথা ব্যাথা) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমি বমি করা; মাথার পশ্চাৎভাগে এবং ঘাড়ের ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; মাথার এক পাশে অবশ এবং ঠাণ্ডা বোধ; কোন একটা বড় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেরূপ হয়, অস্ত্রের ডাইন অর্ধাংশে সেকপ অল্পত্ব হয়; ছুঁবী বিঁধাইলে যেরূপ হয়, নাকীর প্রত্যেকবাব স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে মাথাব পশ্চাৎভাগে সেকপ বেদনা; মাথার চুল পড়িয়া যাওয়া ।

**চক্ষু ।** দৃষ্টিশক্তি হ্রাসিত বা হ্রাস; চক্ষুর হ্রাসিতা এবং চক্ষে উজ্জল আলোক অত্যন্ত লাগে এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোবা ও সার্বসঙ্গিক হ্রাসিতা যাহা চলিবার সময় বাহ্য এবং পায়ের অধিক অল্পত্ব হয়; নেদা করিলে যেরূপ হয়, চলিবার সময় সেকপ হেলিয়া চলিয়া পড়া; চক্ষে জ্বালা-ভ্রম (আস্); চক্ষুর পাতার বহির্দেশে জ্বালাভ্রম; চক্ষুর যেতাংশ হ্রাসিতাবর্ণ; একটা ভারি জ্বরের চাপ পড়িলে যেরূপ হয়, চক্ষের পাতার সেকপ ভাবিবেশ, যাহার দ্রুণ চক্ষু মেলিতে পারে যায় না (কট্, নেট্রাম্-অর্প, নেট্রাম্-কার্প, নেজা, ফাইনট্); ঘুমাইয়া পড়ার স্বভাব (নাক্স-বম্); সকল স্থানে চক্ষে এক বস্তু দেখা যায় না ।

কর্ণ । কানে টন্ টন্, শুন্ শুন্ এবং সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া (চায়না, নাক্স-বম্, সাল্‌ক্); কানের মধ্যে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে স্ফটী বিধানের ন্যায় অম্লভূত হয় (ক্যালী-কার্ব্, গ্রাফ্); কক্ষ ফেলিবার ক্ষমতা নাক কাড়িলে কনি ঘেন বন্ধ হয়; কানের মধ্যে রক্তের স্রাব লাল ঝেঁল পড়ে ।

মুখগহ্বর । ঠাণ্ডা আহার বা পানীয় দ্রব্য খাইলে দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা যাতনা (আণ্টি-ক্লড্, ক্যাক্-কার্ব্, ষ্টাফিস্, সাল্‌ক্); জিহ্বার পক্ষাঘাত হেতু ক্ৰথা বলিতে কষ্টানুবব (কষ্ট্, জেল্‌স্, হায়োস্) বা কণা বলিতে একবারে অশক্তি (কষ্ট্, জেল্‌স্, হায়োস্) ।

মুখমণ্ডল । ভাঙ্গা খাওয়ার পাইপের (Pipe) চাপ পড়িয়া ওঠের কৰ্কটরোগ (Cancer); শুষ্ঠ জালায়ুক্ত এবং শুষ্ক ও উহাতে খোঁচা বিধার স্রাব বেদনা বা যাতনা; রাত্রিতে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল যাহা ডাইন পায়েই অধিক অম্লভূত হয়; নিম্ন মাড়িস্থিত দাঁতে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা গালের হাড় পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়; গলার মধ্যে আটাবোধ; হস্তাঙ্গির নিম্নস্থিত গ্রন্থির ক্ষতি এবং কঠিনতা ।

পাকস্থালী এবং উদর । গলা দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত উদগার উঠা (আর্গিকা, আণ্টি-টার্ট্, কাকিউলাস্, সিপিরা); টক উদগার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীতে জ্বালানুবব; উদরস্থ আহার দ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদগার উঠা (আণ্টি-ক্লড্, ক্যাক্-কার্ব্, চায়না, পাল্‌স্); প্রবল বমন; কক্ষির কাঠের ন্যায় পদার্থ বমন (সিকেল্); টক স্বাদ বিশিষ্ট পরিষ্কার জল বমন; ফিকা কটাবণের উগ্র স্বাদবিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন, আহারের পর গলা দিয়া টক জল উঠা; পাকস্থলীতে প্রবল বেদনা; পাকস্থলীতে চাপিয়া ধরা, জালায়ুক্ত মোচড়ানের ন্যায় বা ছুঁয়া দিয়া কাটার স্রাব বেদনা (আস্, কাকিউলাস্); পাকস্থলীতে মধ্যে চড়্‌চড়ানি এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় টাটনি; পাকস্থলীর ডাইন অংশের ক্ষতি; পাকস্থলীতে আক্কেপিক বা চিন্‌চিন বেদনা (কলোস্, নাক্স-বম্) । যকৃত প্রদেশে স্ফটী বিধানের ন্যায় অম্লভূত হয় (আস্, ক্যাক্-কার্ব্, ব্রাই, ক্যালী কার্ব্, সিপিরা); ছুরী বিঁধাইয়া দিলে বেকপ হয়, উদরে সেকপ বেদনা (মার্ক্);

উদরে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, যাহা বুকের ডাইন পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; শুষ্কতার দ্বারা দূষিত বায়ু নির্গত হওয়ার পূর্বে উদরে কর্তনব্যং বেদনা; উদরে চিন্‌চিনে বেদনা, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন তরল ভেদ হইবে; সমুদয় যন্ত্রণাদি যেন নীচের দিকে সজোরে ঠেলিয়া নাযিতেছে তল পেটে একরূপ অজুহত হয়; সন্তান প্রসবের পর যেরূপ হয়, তলপেটে নেকরূপ সঙ্কোচক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার বেগ বা কৌথ পাড়ার ইচ্ছা; উদরে গড়্‌গড়্‌ কল কল শব্দ হওয়া।

মল এবং মলদ্বার। কোষ্ঠবদ্ধ এবং বারংবার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না (অস্থী, লাইকোপ্‌, আনাকার্ড্‌, নাক্স-বম্‌); উদরস্থ অজীর্ণ অথবা দ্রব্যের কণা শিশিষ্টে বোনাহীন উদরাময় (চায়না); কঠিন মল শিশিষ্ট তরল ভেদ (ল্যাইকোপ্‌, নাক্স-বম্‌); প্রত্যেকবার দাণ্ডের পর অত্যন্ত ছুঁলগতা এবং তদক্ষণ শরীরের কম্পন (কম্‌); শুষ্ক দ্বারে বারংবার সূচী বিঁধানের ত্রাণ বেদনা; মল ভ্যাগের সময়ে শুষ্কের মধ্যে জ্বালা এবং উকাহুতব; মলভ্যাগের পর অত্যন্ত ছুঁলগতা এবং শরীরের কম্পন (বিরেট্‌-অ'ব্‌)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র গাঢ়, সাদা এবং দোলাটিয়া (ফস-অ'স্‌); পানীয় ও পান্যের মূত্রভ্যাগ (অস্থী, বোব'স্‌, ফন্‌ অ'স্‌); মূত্র ভ্যাগের সময় ও উহার পর মূত্র নালীতে অত্যন্ত জ্বালাহুতব (একন্‌, অ'স্টি-টাট্‌); মূত্র পড়িতে পড়িতে বন্ধ হয় এবং কতককণ বন্ধ থাকিয়া আবার নির্গত হইতে আরম্ভ হয় (ক্রিমিটস্‌); মূত্র ভ্যাগের সময় মূত্র নালীতে কর্তনব্যং বেদনা; বৃদ্ধ বয়সে বা যৌবন কালে মৈথুন কার্যে অত্যাচার হেতু মূত্রক্‌ক্‌ ।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না (আগারিক'স্‌, আগ'নাশ্‌, জুক'স্‌); জ্বালোকের নিকট বসিয়া অলাপ করিলে বা তাহার গার চাত দিলেও ধাতু নির্গত হয়; কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা হইলেই, (মনে কোন প্রকারের বিকারের ভাব হউক, আর না হউক) ধাতু নির্গত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের মাংসের আবরক চর্ম চুলকার; অণুবোনের ক্ষীণতা (একন্‌, আগ'নাশ্‌)। জ্বালোকের ঘোনি দ্বারের মধ্যে অত্যন্ত চুলকানি (ক্যা'ব্‌, শাক্‌); নিরমিত



সময়ের অনেক পূর্বে এবং অতি অল্প পরিমাণ রক্তঃস্রাব ; কটীর আভ্যন্তর  
রক্তঃস্রাব ; রক্তঃস্রাবের সময় জরায়ুতে ছল ফুটানের জায় বেদনা বা যাতনা  
এবং শয়ন করিলে মাথাধোরা ; সাদা উগ্র এবং ক্ষতকারক জালা উৎপাদক  
খেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে পক্ষাঘাতের  
জায় হর্ষল এবং অবশবোধ ; গাঢ়, দুধের জায় খেতপ্রদর নিঃসরণ এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনাব জায় সঙ্কোচক বেদনা যাহা  
জরায়ু বহুই পার্শ্ব হইতেই আরম্ভ হয় ; জরায়ুর কঠিনতা (অরাম, কার্কো-  
আনিমেল) ; ডিম্বকোষের কঠিনতা ; স্তনের কঠিনতা ; জরায়ু স্থান ব্রষ্ট  
হওয়া (Prolapsus uteri) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর কঠিনতা, উহাতে  
ক্ষত এবং খেত প্রদর নিঃসরণ ; জরায়ু প্রদেশে জানা, টাটানি বা চড়্‌চড়ানি  
এবং কনকনানি ; ডিম্বকোষের প্রদাহ এবং কঠিনতা ; রক্তঃস্রাব আরম্ভ হও-  
য়ার পূর্বে শ্বসন ক্ষীণ হয় এবং টাটায় ; স্তন ছোট বা সঙ্কুচিত হয় (স্ম্যোড)  
এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা ; বাম স্তনে স্থী বিধানের  
জায় বেদনা ; গর্ভাবস্থায় ভয়ানক বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ; স্তনে কোঁড়া এবং  
উহাতে ছুরী বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ; স্তন্যে স্তন্যের স্ফীতি হয় এবং  
তদনুগ স্তন অত্যন্ত টাটায় বা বেদনামুক্ত হয় এবং উহাতে আকুলের স্পর্শ-  
নের ভারও সহ হয় না। স্তনের কৰ্কট রোগ (Cancer of the Breast)।

খাস যন্ত্র । কঠনাগীর কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে হামা দেওয়ার জায়  
স্বচ্ছন্দীর দরুণ অনবরত শুক কাশির উদ্ভব হয় ; দিনের বেলা স্নান বা রাত্রে  
শয়ন করিলেই অত্যন্ত প্রবল আক্কেপিক শুক কাশি (হারোস্, পালস্,  
সিপিয়া) ; গর্ভাবস্থায় কাশি ; চলিয়া বেড়ানোর সময় খাস প্রখাস ঘন ঘন  
হয় ; গায়ের কাপড় যেন স্বচ্ছ এবং বৃকে একটা ভারি বস্তুর চাপা পড়ার  
জায় অনুভূত হয় ; বসিয়া থাকিলে বক্ষাস্থি হইতে বৃকের নদা দিয়া মেরু  
দণ্ড পর্যন্ত হঠাৎ ধাক্কা লাগার জায় অনুভূত হয় ; প্রত্যেক বার নিশ্বাস  
টানিবার সময় বৃকের ডাইন পাশে স্তনের বোঁটার নিকট স্থী বিধানের  
জায় প্রবল বেদনা (বাই, ক্যালী-কার্ফ) ; চলিবার সময় বৃকে উত্ত প্রকারের  
বেদনা, হাত দিয়া প্রবল চাপ দিলে যাহার উপশম হয়।

হৃৎপিণ্ড । হৃৎস্পন্দন ; হৃৎপিণ্ড স্পন্দন করিতে করিতে হঠাৎ

বহু হইয়া আবার স্পন্দন করে (Intermittent Heart) (ডিম্বিট, ক্যালী-কার্ক); জলাদি পানের পর প্রবল ক্রমস্পন্দন; নাড়ী সকল সদর এক রকম থাকে না, অর্থাৎ কখন প্রবল ও ক্রমস্পন্দী, কখন বা দুর্বল ও মৃদুগতিবিশিষ্ট এবং কখন বা একবারে অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে; মাইট্রেল ক্রমকপা-টের (Mitral Valve) বোধোচিত শক্তির অভাব।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউল, জেলস্, বার্ক, ড্রামন্); অঙ্গুলীর পশ্চাদ্দেশের চুলকানি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলানে অশক্তি, বাহার দরুণ রোগী চলিয়া বেড়াইতে পারে না; চলিয়া বেড়ানোর সময় উরুদেশের দুর্বলতা এবং কখন কখন কাঁপনি; বর্ণিবদ্ধ সকলানে কেত্ কেত্ শব্দ হওয়া; চলিবার সময় হাঁটুর সন্ধিত কেত্ কেত্ শব্দ হওয়া; পায়ের পাতা শীতল।

জ্বর। নাড়ী অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে এবং সাধারণতঃ মৃদুগতি বিশিষ্ট এবং পূর্ণ; প্রাতঃকাল এবং পূর্নাক্ষে শীতবোধ ও উত্তর দরুণ বোধে থাকিবার ইচ্ছা; শরীর উষ্ণ এবং উত্তর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত প্রাবলিকতা; বর্ষ, নিদ্রাবিহীন হইয়া অধিক হয়।

চর্ম। গ্রন্থির ক্ষীতি এবং কঠিনতা ও সন্ধার সময় উত্তরে অত্যন্ত বেদনাত্তব; কাল্‌চে ক্ষত এবং উত্তর চাইতে রক্তমিশ্রিত, দুর্বলবৃদ্ধ, পচাপর্দার দ্বারা ছেঁকড়া ছেঁকড়া পর্দার বিশিষ্ট রূপ নিঃসরণ; ককট রোগের ক্ষত (Cancerous Ulcers); গায় দানের দ্বারা কলতানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (ক্যাঙ্ক-কার্ক, ডাল্ক, গ্রাক)।

ব্যবহার। স্ত্রী বা পুরুষ মহাভাগের উচ্চ চরিতার্থ না হওয়া জনিত অস্থব; অতিরিক্ত স্ত্রী বা পুরুষ মহাভাগ জনিত অস্থব; গ্রন্থির অস্থব; পেঁত-লিয়া বাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার দরুণ অস্থব; গ্রন্থির কঠিনতা, দিব্বন্ধি অথবা উত্তর কঠিনতা বা হ্রাস; হিষ্টিরিয়া; মনোরোগ (Hypochondriasis); গণ্ডালা (Scrofula); ককট রোগ (Cancer), (বিশেষতঃ অন্তর); আঘাত পাইয়া চক্‌ ছানি পড়া (Traumatic Cataract); পাথরি রোগ (Gravel); বচম্ব (Diabetes); অজীর্ণ রোগ; বায়ুনস্ প্রবাহ; হাঁপানি কানি; কনি-কক; পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে কোনায়াস্ ব্যবহার্য।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** ইহা বৃদ্ধ বয়সের অস্থখ বা হর্ষ-  
লভায় বিশেষ উপযোগী; অতিরিক্ত জী বা পুরুষ সহবাস জনিত অস্থখ  
(ফস্-আন্স) ; জীলোকের স্তনের পাথরের জায় কঠিনতা (ব্রাই, কাইটোল্) ;  
রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে স্তনে বেদনা এবং টাটানি ; চলিতে চলিতে  
শরীর হঠাৎ চর্কল এবং অবসন্ন হইয়া পড়া ; প্রাতঃকালে বিছানায় শয়ন  
করিয়া থাকিলেও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া ; মৃতিকা পাণ্ডুরোগ (Chloro-  
sis) ; শীতবোধ, অত্যন্ত মুচ্ছার ভাব, সংস্পন্দন, সুখমণ্ডল শিটা, রজঃরোধ  
এবং প্রচুর শ্বেত প্রদর ; গ্রন্থির ক্ষীতি এবং উহাতে টন্ টন্ করা বা স্ফী-  
তি বিধানের জায় বেদনা বা যাতনা ; গণ্ডমালা এবং কর্কট রোগের ধাতু ; যে  
লকল শিশু বা ছোট বালক খালিকা অতি শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় তাহাদিগের  
অস্থখ ; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন, খাওয়ার সময়, শয়ন করিয়া থাকা কালীন  
অস্থখের বৃদ্ধি ; নড়া চড়া, প্রধানতঃ চলিয়া বেড়াইলে, অস্থখের উপশম  
ইত্যাদি কোনায়ামের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

**সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ ।** গতি উৎপাদক স্নায়ুমাণ্ডলীর উপর  
কোনায়ামের কার্য কিউরেয়ার, ক্যালী ব্রোমেটাম্ (ব্রোমাইড্ অব্  
পোটাস্), জেল্‌সিমিয়ামের জায় । গ্রন্থির উপর ইহার কার্য আরোডিন্,  
হাইড্রাষ্টিন্ এবং ম্যাগ্নাইট কার্বোনিকার জায় । এতদ্ভিন্ন অস্ত্রান্ত বিষয়ে  
ইহার কার্য অ্যাসিনিক, বেলাডোনা, ক্যাকেরিয়া কার্ব, ডিজিটালিস,  
ডাল্‌কেমেরা, হায়োগাগ্নেমাস্, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউরিয়াম্, নাইট্রিক্  
অ্যাসিড্, নাক্সবমিকা, কক্ষরাস্, রাস্টক্স, পাল্‌সেটিল, পিপিয়া, সাইলি-  
সিয়া, সাল্‌কারের জায় ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** কফিয়া এবং নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ কোনায়ামের  
প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইলুশন বিচার ।** ডাক্তার আণ্ডার উড্ (Dr. Underwood)  
 বলেন, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কঠিনতা, গণ্ডমালা, কর্কট রোগ, কৃত, অনিবার্য  
চর্মরোগ, স্তনের ফোড়ার জায় ক্ষীতি এবং বেদনা ও আক্ষেপ নিবারণের  
পক্ষে, আক্ষেপিক কাশি, ছপিকক্ষ, স্নায়ুশূল, কর্কট রোগ এবং বাতের  
বেদনা, কোরিয়া, কসেজকা মর্জার উত্তেজনা এবং অজীর্ণ ইত্যাদি অস্থখে

নিয়ন্ত্রক (অর্থাৎ ৩, ৬, ১২) বিশেষ উপকারী। বৃদ্ধবয়সের অসুখ, পক্ষাঘাত সম্বলিত সংশ্রাণ রোগ, জী বা পুরুষ সহবাস জনিত অবসন্নতা, মুচ্ছা, যক্ষা কাশ এবং পক্ষাঘাতের পক্ষে ১২, ৩০ এবং ততোধিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। লেখক ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

## ড্রুসিরা রোটান্ডিফলিয়া,—ড্রুসিরা

(*DROSERA ROTUNDIFOLIA*,—*DROS.*)

ইউরোপের মধ্য এবং উত্তরাংশে ও ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের কাদাবিশিষ্ট বা চিহ্নিত স্থানে এই গাছ জন্মে। গ্রীষ্ম এবং শরতকালে ফুল-ফুটার সময় এই গাছ সংগ্রহ করিয়া কাটা অবস্থায় উহার সবুজ অংশ লইয়া প্রকম্পিরিতে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। নিউমোগাস্ট্রিক্‌ নার্ভ (Pneumogastric nerve) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষ হপিং কক বা আক্ষেপিত হাঁপানি কাশির ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। মন সর্বদাই অস্থির এবং অসুস্থ; রোগী এক বিষয় অনেক-ক্ষণ পড়িতে পারে না। অতএব সে বারম্বার এক বিষয় ছাড়িয়া অন্য বিষয় পড়ে। সর্বদা মনের উত্তেজনা এবং ভবিষ্যৎ বিপদ বিষয়ে আশঙ্কা ও মানসিক অবসন্নতা।

মস্তক। মাথায় চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, কপাল এবং গালের হাতে হাত অধিক অস্ত্রুত হয়; কপালের ডাইন পার্শ্বের চর্মে টাটানি এবং বেদনা।

নাসিকা। বারম্বার ঠাচি এবং উহার মরণ কখন নাক দিয়া তরল স্লেমা নির্গত হয়, কখন বা স্লেমা একেবারেই নির্গত হয় না।

মুখগহ্বর। মুখ দিয়া ক্ষুদ্র পরিমাণে জলবৎ তরল লাল পড়ে।

পাকস্থলী । কাবচার ঝিকা ।

হাইপোকণ্ডিয়া । উভয় হাইপোকণ্ডিয়াতেই সঙ্কোচক বেদনা, ষাটার দরুণ কাশিবার ব্যাঘাত প্রমুখ এবং কাশিবার সময় রোগী উক্ত প্রদেশে ছাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে বাধ্য হয় ।

মূত্রযন্ত্র । বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং অতি অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ, অনেক সময় মূত্র ফোঁটায ফোঁটার নির্গত হয় ।

শ্বাসযন্ত্র । শ্বাস টানবার সময় কণ্ঠনালীতে মোড়াইয়া পড়াব ছায় বেদনা ; স্বরভঙ্গ এবং অত্যন্ত মৃতস্বর (কার্কোবেজ্, কষ্ট্, ফস্) ; গলার মধ্যে অত্যন্ত কষ্টানুভব এবং প্রত্যেকবার কথা বালবাব সময় গলার মধ্য সঙ্কুচিত হয় ; চলিবাব সময় শ্বাসকষ্ট হয় না ; কথা বলিলে বুক এবং গলার মধ্যে অসুখেব লক্ষণাদিব বৃদ্ধি (কষ্ট্) ; ক্রমাগত কাশিব আক্রমণ, ষাটার দরুণ রোগী নিশ্বাস ফেলিবার সময় পায় না ; রাত্রিতে কাশি ; সন্ধ্যার সময় শয়ন করিবার পূর্বে কাশির উদ্রেক ; শেষ রাত্রি ২টার সময় জাগিলেই কাশিব উদ্রেক (আমন্-কার্ক্, ক্যালী-কার্ক্), শুষ্ক আক্লেপিক কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনের ইচ্ছা ; কাশির সময় এবং উহার পর উদরস্থ আঁহাব ভ্রবাদি বমন (আন্টি-টার্ট্, ইপিকাক্) ; কাশি এবং গলাদিয়া পূঁষ বা রক্ত মিশ্রিত পূঁষ নির্গমন (চায়না, লাইকোপ্, ফস্, প্লাস্মা, স্পিয়া, সাই-গিসি) ; মুগগন্ধবের পশ্চাৎভাগ এবং কোমল তালুকাষ ধশ্বেশে, টাচিয়া ফেলার ছায় বা শুষ্কানুভব, ষাটার দরুণ গুল্ গুল্ কাশির উদ্রেক হয় এবং গলা দিয়া হরিদ্রা বর্ণের স্লেয়া নির্গত হয় (পাল্) এবং স্বরভঙ্গ ও মোটা বা গভীর স্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুক অঁটা বোধ বা কষ্টানুভব ; কথা বলিবাব সময় মনে হয় যেন বকের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে না, ষাটার দরুণ রোগী শ্বাস ফেলিতে পারে না ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । সমুদয় অঙ্গে অবশ এবং অসাড় বোধ, মোড়াইয়া পড়া বা খেঁতগিয়া যাওয়ার ছায় অনুভূত হয় ; যে ভাবেই থাকা যাউক না কেন হাত পায়েব পেশীতে চাপিয়া বা ষাটিয়া ধরার ছায় বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয় ; লম্বা হাড়ে চর্কনবৎ বা স্থতীবিধানের ছায় বেদনা বা যাতনা, সন্ধিতেই বাহ্য অধিক অনুভূত হয় ; সন্ধিতে স্থতীবিধানের

জ্বর যাতনা যাহা নড়াচড়াতে কম অনুভূত হয় এবং বিশ্রামকালীন অধিক অনুভূত হয় । কেবল বিশ্রাম কালীনই ডাইন স্বক্বেব স্পন্দন । ডাইন উষ্ণ এবং কুঁচকির সন্ধিতে অবশ বা অসাড় কারক বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের পাতার সন্ধিতে মোচড়াইয়া পড়িব জ্বর বেদনা, চলিবার সময়ই যাহা অধিক অনুভূত হয় ; বায় উষ্ণ ঠিক অধাভাগেব সমুখের অংশে কখন কখন স্টি-বিধানের জ্বর অনুভূত হয় ; ডাচন পায়ের ডিম্ব কঠিনবৎ তীক্ষ্ণ স্টিবিধানের জ্বর প্রবল বেদনা, বসিয়া থাকিলে যাহা অনুভূত হয় এবং চলিয়া বেড়াইলেই যাহা থাকে না, মচকাইয়া গেলে বা স্থানান্তরে হটলে প্রকৃপ্ত হয়, কেবল চলিবার সময়ই পায়ের পাতার সন্ধিতে ছিড়িয়া ফেলার জ্বর সেরূপ বেদনা ; পায়ের পাতার সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ।

ব্যবহার । কেবল শ্বাস রোগে, প্রধানতঃ উহার প্রয়োজনিত অস্থানেই ডুসিরা বিশেষ উপকারী । স্বরভঙ্গ ( Hoarseness ) ; কণ্ঠনালী প্রদাহ ( Laryngitis ) ; হুপিং কফ, হাপানি কাশি ; আক্কেপিক ওফ কাশি ইত্যাদি অস্থানে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সমুদয় শরীরে চর্কণবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু এবং গাল বসিয়া যাওয়া, চর্কণ কুটকটানি এবং আলাহুতব ; সমুদয় শরীরে জ্বরেব জ্বর শীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত বরকের জ্বর শীতল, কিন্তু পিপাসা থাকে না ইত্যাদি ডুসিরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । আক্কেপিক কাশিতে ডুসিরার কার্য্য হাইড্রোপ্যাথেরিক অসিড, নাইট্রিক অসিড, বেলাডোনা, চেসিডোনিয়াম, সিনা, কোরেলিয়াম, কুপ্রাম, হাইপোপ্যাথোস, ইলিকাকিউএন, নাক্স-ব্রিও, সাবুকাশের কার্য্যের জ্বর । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্য একোনাইট, অ্যামোনিয়াম কার্ক, ক্যাডবেরিয়া কার্ক, পাল্‌মেটো, রাস্ট্র, নাইনিসিয়া, সাল্‌ফার এবং বিসেটাম্‌ আল্‌বামের জ্বর ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যান্‌ফার ডুসিরার প্রতিষেধক ঔষধ ।

ডাইলুশন বিচার । হানিমান ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেম । ডাক্তার কারি ( Dr. Curie ) মূল আরেক ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন ।

ডাক্ষার হিউজ্ (Dr. Hughes) ১ম ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। লেখক ১ম দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। হুপিং কক্ষে অনেক সময় মূল আর্বোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে অমিশ্র আর্বোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

## ডাক্ষেমেরা,—ডাক্স্

(DULCAMARA,—DULC)

ইউরোপেব প্রায় সমুদয় স্থানের ভিজা বা আর্ড জঙ্গলা ভূমি এবং বেড়া-দিতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। ফুল দুটোবাব পূর্বে ইহার পাতা এবং কচি ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে প্রক্‌ স্পিরাটে ভিজাইয়া ইহার মূল আর্বোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া । শৈথিক শিথী এবং পেলীব উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ হিম, ঠাণ্ডা বা বৃষ্টিদিনের আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া যে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হয়, ইহা দ্বাবাও সে সকল লক্ষণ বা অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চর্ম এবং লম্বিকা বা লিম্ফেটিক গ্রন্থি (Lymphatic Glands) উপরও ইহার কার্য আছে, যাহার দরুণ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি এবং কোষিক অংশে দূষিত পদার্থের সঞ্চার এবং চর্মে ফুসুডী প্রকাশ পায়। শেত্‌শেতিয়া ঠাণ্ডা বায়ুতে অসুখের বৃদ্ধি করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বস্তুর প্রকৃত নাম জ্ঞান পড়ে না (লাটেকোন্‌) ; রাগান্বিত না হইয়াও ধমকাইবার ইচ্ছা ; সর্বদা অস্থির এবং অধৈর্য্য ; সর্বদা ঝগড়া করার স্বভাব (ব্রাই, কাম্‌, নাক্স-বম্‌)।

মস্তক । প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিলেই মাথাঘোরা এবং মাথা কিম্‌ কিম্‌ করা ও চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দেখা (সাল্‌ফ্‌), শরীর কম্পন এবং জ্বৰ্ণনতা ; মাথায় চিমাঝোষ এবং মাথায় কষ্টকর অবসন্ন বোধ ; মাথায় ভারি বোধ ; কপাল এবং কপালের হই পার্শ্বে হ্রদ করার স্থান

বেদনা (কলোস্), বাত্ৰি দুই প্রহরের পূর্বে এবং নিম্নকৃত ভাবে শয়ন অবস্থা থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং কথা বলিলে যাহার উপশম হয়; কপালে খনন করার সময় বেদনা এবং মনে হয় যেন মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে; মাথাব পশ্চাৎভাগে অবসন্নকারক বেদনা যাচা বাড় হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; মাথার পশ্চাদ্দেশে ঠাণ্ডাবোধ; মাথার পৃষ্ঠ খোলা বা চুমুচী পড়ে, বাহ্যিক দক্ষণ চুল পড়িয়া যায় (গ্রাফ্, মার্ক্); মাথার দ্বারের সময় গোলাকার কুসুড়ী।

চক্ষু । চিম ঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ, চক্ষুর তারা অত্যন্ত বিস্তৃত।

কর্ণ । কানেব মধ্যে এবং কর্ণমূলস্থিত গ্রন্থিতে স্তম্ভী বিধানের সময় বেদনা, কণ্ঠশূল।

নাসিকা । নাক দিয়া বক্ত পড়া; বক্ত উচ্ছল লালবর্ণ (ইপিকাক্) ও উষ্ণ এবং নাকের উপবিভাগে চাপা বোধ (একন্, হামামেনিস্); শুষ্ক সর্দি, ঠাণ্ডা বাতাসে বাতাস বৃদ্ধি হয়।

মুখমণ্ডল । টেটাব (Tetter, কুসুড়ী বসিয়া যাওয়া মুখমণ্ডলের কনকনানি এবং হীপানি কাশ; মুখমণ্ডল, কপাল এবং টুটিতে কটার আভাবক হরিপ্রাণের খোঁসা পড়া।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । বুধে তরু বাদ; মুখগহ্বর এবং জিহ্বা শুষ্ক (এপিস্, আস্, ব্রাই, নাক্স-নক্, পলেন্স্); বুধে লাল সঞ্চিত হয় (একন্, মার্ক্, নাচটিক্-আস্); ঠাণ্ডা বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিলে জিহ্বা এবং মাড়ি অসাড় হয়, জিহ্বার পক্ষাঘ্ন, (গ্রেগ্, কপ্, হারোল্); ঠাণ্ডা লাগিয়া গলার মধ্যে বেদনা বা টাটান।

পাকস্থলী এবং উদর । আগারে অক্টি (অক্টি-কুড্, ককিউল্, ইপিকাক্); অত্যন্ত প্রবল পিপাসা এবং শীতল জলাদি পানের ইচ্ছা (একন্, আস্, ব্রাই); বমনোদ্বেগ এবং লাগা চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়া বমন (অক্টি-টাট্, ইপিকাক্, লোবিলিয়া); পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ এবং উদরে খালি বোধ; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরে শূল বেদনার সময় বেদনা (মার্ক্, নাক্স-বম্); শূল বেদনা, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন উদরাময় হইবে (আগোল্); উদর (Ascites); ঠাণ্ডা লাগিয়া কুঁচকির প্রস্থের ক্ষতি (বাসী) (মার্ক্)।



**মল এবং মলদ্বার ।** সন্ধ্যার সময় বাহ্যের ইচ্ছা এবং তলপেটে কামড়ানির জ্বার বেদনা হইয়া তৎপর প্রচুর পরিমাণে পাতলা, টকগন্ধ-যুক্ত মল ভেদ, বাহ্যের দরুণ পেটের বেদনাদির উপশমন হয় বটে, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে ; পর্যায়ক্রমে হরিজ্ঞা এবং সবুজ তরল মল ভেদ ; ঠাণ্ডা লাগিলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবার দাঁতের পূর্বে উদরে ছিঁড়িয়া ফেলার জ্বার বা কর্তনবৎ বেদনা (ক্যান্সাস) ; শেত শেতিয়া বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া উদরাময় বা আমাশয় ; ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় : মল স্লেয়া, সবুজ-বর্ণ, জলবৎ এবং সাদাটিয়া ; উদরাময় এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে শূন বেদনা ; মল জলবৎ তরল, স্রীম্বকালে এবং বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে যাতা অধিক হয় ; গায়ে কোন প্রকারের স্ফোটক রোগের কুস্কৃড়ী বসিয়া যাইয়া, ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শিশুগণের ঠাত উঠার সময় উদরাময় ।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্রাধারের স্লেয়া জনিত রোগ (একন্, ক্যান্) ; মূত্র-ত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাহুতব (একন্, অস্, ক্যান্, কোনাফাম্) ; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং সাদা ; মূত্রে কখন লাগ এবং কখন বা সাদা তলানি পড়ে ; মূত্র চূর্ণকৃষ্ণ ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (অস্, বেগ্, সিকুটা, হ্যামোন্) ; মূত্রত্যাগে অত্যন্ত কষ্টাশ্রুতব (একন্, ক্যান্) ; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বাহ্য উদরের পতীর প্রদেশেও যেন অশ্রুত হয় ।

**জননেন্দ্রিয় ।** পুরুষের শ্বস্রভঙ্গ ; পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষাদিতে দাধের জ্বার কুস্কৃড়ী । স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবের পূর্বে গায় এক প্রকারের কুস্কৃড়ী বাহির হয় ; গোলে জলবৎ তরল রজঃস্রাব, ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃস্রাব (মোর্ক্, পডোফ্, সালফ্, পান্) ; ঠাণ্ডা লাগিয়া সন্তান প্রসবের পর জরাস্থ হইতে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া ; ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃস্রাব এবং গর্ভে দুইয়ের সকার বন্ধ হওয়া (একন্, মিসিসিফ্, পান্) ।

**শ্বাসযন্ত্র ।** ঠাণ্ডা লাগিয়া শ্বাস কষ্ট এবং বুকের মধ্যে স্লেয়া সঞ্চিত হওয়া ; শ্বস্রভঙ্গ এবং কর্কশ শ্বস (কার্বো-বহ) ; বাত জনিত ফুফুসাবয়বক বিলী প্রদাহ এবং ফুফুসাবয়বক বিলী প্রদাহ সম্বলিত ফুফুস প্রদাহ (Pleuro pneumonia) এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া অতি কষ্টে

কঠিন বদরসের স্লেয়া নির্গমন ; বক্ষশোথ, ত্রিভা বা আর্জ বাতাসাদিত বাহার বৃদ্ধি হয় ; কাশি এবং কাশিতে কাশিতে গলা দিরা উচ্ছন্ন লাগ রক্ত নির্গমন ; ভরল আর্জ কাশি, 'বরের মধ্যে থাকিলে এবং বিশ্রাম কালীন বাহার বৃদ্ধি হয় ; বুকের মধ্যে প্রচুব পরিমাণে স্লেয়ার সঞ্চার (আন্টি-টার্চ, টপিকাক্, সাবু কান্) ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । ঠাণ্ডা লাগিয়া বাড় শক্ত বা উহা নোয়ান বার না, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোমর সঞ্চালনে অশক্তি (সিমিসিফ) ; কোমরের ডাটন পাখের গভীর অংশে কঠিনবৎ প্রবল বেদনা, চাপিলে বাহা কতকক্ষণের জন্ত একবারে থাকে না ; অনেকক্ষণ বাধা হেট করিয়া উপড় হঠরা থাকিলে সেরূপ হত, কোমরের পশ্চাৎ দেশে সেরূপ বেদনা (চায়না, পাল্‌স) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । পক্ষাঘাতে ঘোরণ হয়, বাহ্য হাতে সেরূপ মোচড়াইরা পড়া বা ধেঁত্‌লিয়া বাওয়ার জার বেদনা ; ডাইন পায়ের টিব্রা (Tibia) নামক হাড়ের বিবৃদ্ধি এবং পায় নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ লাগ পড়ে ও উহার স্থানে স্থানে পূঁয় সঞ্চিত হয় ; উরু দেশে হিঁড়িয়া কেলা বা কসিয়া ঘরার জার বেদনা, চলিয়া বেড়াইলে বাহা থাকে না ও বসিলে বাহার পুনরার উদ্রেক হয় ।

চর্ম্ম । গার টেটারের (Tetter) জার কুকুড়ী বাহা হঠাতে অনেক জার কলতানি পড়ে এবং চুলকাইলে বক্ত পড়ে (মার্ক্, নাইট্রিক-আন্) ; সমুদ্র শরীরে আমবাত বাতির চর (একন্) এবং উহা অত্যন্ত চুলকার এবং চুলকাইলে অত্যন্ত আলা করে ; উতাপে উহার বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডাতে উপশম হয় ; সমুদ্র শরীরে পুষ্ক, কটার আভাযুক্ত ত্রিভাবর্ণের খোলা (চুমটি) পড়ে ; শরীরের স্থানে স্থানে বাটিরা ঘরা এবং চুলকানি (শাল্ক্) ।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা এবং নিদ্রা দ্বারা রোগী আপনাকে আপনি হুহ মনে করে না (একন্) ।

জ্বর । ক্ষীত বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ঘাতনা ; শরীর সাধারণতঃ শুষ্ক এবং উষ্ণ ও উহাতে আলাহুতব (একন্, আন্, ব্রাই ; হুর্গকাক্ত বর্ণ হয় (মার্ক্, কার্বো-আনিমেল, সাইলিসি) ।

ব্যবহার । হিম ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাসাদি লাগিয়া বাত রোগ এবং স্নেহাজনিত অস্থখ ; ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গার স্কেটিক রোগের কুঁকুড়ী বদিয়া বাওয়ার নরুণ অস্থখ ; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সকল প্রকারের অস্থখ ; পক্ষাঘাত ; আমবাত ; টেটর (Tetter) ; দুগ্ধশোষা শিশুর গার কুঁকুড়ী (Milk crust) ; শূল বেধনা ; উদরাশয় ; শোথ ; স্জ কোষের ট্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ ; স্জাধারের স্নৈয়িক রোগ ; ইঁপানি কাশি ; বায়ুনলের স্নৈয়িক রোগ . হপিং কফ ; গণ্ডমালা ; অস্থির বিবৃদ্ধি ; পারার অপব্যবহার জনিত অস্থখ ইত্যাদিতে ডাল্‌কেমেরা ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । ভিজ্জা শেত্‌শেতিয়া স্থানে বাস বা হিম, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া স্নৈয়িক বা বাত রোগ ; বহির্বায়ু প্রত্যেকবার শীতল হইলেই অস্থখের বৃদ্ধি ; স্নৈয়িক ঝিল্লা এবং গ্রিহির নিঃসরণের আধিক্য ; আর্দ্র বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া বর্ষ বহু হওয়ার নরুণ শোথ ; কোন প্রকার স্কেটিক রোগের স্কেটিক বদিয়া বাইয়া পক্ষাঘাত ; হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত ; রাত্রিতে, বিশ্রাম কালীন (আমন্-কার্গ, রডোডেওন্, রাস্-টন্), ঠাণ্ডা বাতাসে, আর্দ্র বাতাসে এবং বহির্বায়ু হঠাৎ ঠাণ্ডা হইলে অস্থখের বৃদ্ধি ; বলা অবস্থা হইতে উঠিলে, নড়াচড়াতে, উচ্চতা এবং গুরু বাতাসে অস্থখের উপশম । চর্কিবৃদ্ধ চোপ্‌সা মোটা শরীর, গণ্ডমালা, খাতু, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দি লাগা ইত্যাদি ডাঙ্কেমেরার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ যথো পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ডাল্‌কেমেরা এমন একটা বিশেষ প্রকৃতির ঔষধ যে ইহার সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । তবে কোন কোন বিষয়ে ডাল্‌কেমেরার কার্য্যের সঙ্গে একোনাইট্, আসিনিক, বেলাডোনা, ট্রাইওনিয়া, সিমিসিকিউগা, লাইকোপডিয়াস্, নাইট্রিক্-আসিড্, পাল্‌সেটিলা, রাস্-টন্, সিলিরা, সাল্‌ফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে এরূপ বলা বাইতে পারে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ক্যাঙ্কার, কুপ্রাস, ইপিকাকিউএনা, মার্কি-উরিয়াস্ ইত্যাদি ডাল্‌কেমেরার প্রতিষেধক ঔষধ যথো পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । ২৪ ডাইলুশনই অধিক ব্যবহৃত হইয়া

থাকে । ডাক্তার অণ্ডারউড্ (Dr. Underwood) বলেন যে কুক্কুসের পুরাতন ত্রৈমসিক রোগ, ক্ষুদ্র সন্ধিবাত জনিত অম্বু, কোন অম্বু দ্বারা শরীর একবারে ক্লম ও দুর্বল হইয়া পড়িলে এবং নানা প্রকারের চর্ম রোগে নিম্ন ডাইলুশন ( ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পর্য্যন্ত ) দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । চক্ষু প্রদাহ, আক্কেপ (Convulsions), পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উত্তেজনা এবং শরীরের নানা অংশের পক্ষাঘাতে উচ্চ ( ৩০ ও ততোধিক ) ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । আমরা এতদ্রূপে ৬ এবং ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই বর্ণোচিত ফল পাইয়া থাকি ।

### ইউফ্রেসিয়া অফিসিনেলিস,—ইউফ্রেস্ ।

(EUPHRASIA OFFICINALIS,—EUPHR.)

চক্ষুর জ্বাতি এবং তেজ বৃদ্ধি করে বলিয়াই যৌথ হর ইংবেলী ভাষায় ইহাকে চক্ষু উজ্জলকারী ( Eye bright ) বলিয়া থাকে । ইউফ্রেসিয়া এবং আসিয়ার মাঠ ময়দানে এই গাছ জন্মে । ইংলণ্ড, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । জুলাই মাসে এই গাছের সমুদয় অংশ সংগ্রহ করিয়া মধ্যনিম্নে প্রক্ষালিত দ্বারা ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্যাংগলিয়নিক সিস্টেম (Ganglionic system of nerves) দ্বারা ইহা ত্রৈমসিক বিস্তার উপর কর্তব্য করিয়া থাকে । চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং ষাণ্ড যন্ত্রের উপর ভাগের ত্রৈমসিক বিস্তার উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাতাব লক্ষণ উপর প্রেরণা জনিত প্রদাহ হইয়া চক্ষু, নাসিকা চর্মেতে প্রচুর জল পড়ে । চক্ষু এবং নাসিকা দ্বারা প্রচুর জল পড়া সম্বন্ধিত রোগ উৎপাদন করা এই প্রবণের একটি প্রধান প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

যস্তুক । মাথায় মোচড়াইয়া পড়া বা বেঁঠলিয়া বাগড়াহ ভাব

বেদনা বা গাঠন্য (জেন্স); কপালে ঘৃণ্বশ্বে বেদনা (ভাইড্রাষ্ট্, ক্যালী-  
ট্রাইক্রম, নাক্স-ইম, পাল্‌স)।

চক্ষু। চক্ষে জ্বালা এবং চক্ষুদ্বারা জল পড়া (আস্); চক্ষে চাপা-  
যোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া জল পড়া; চক্ষে বারবার জ্বালাহৃত  
এবং কামড়ানী; চক্ষু দিয়া জ্বালা উৎপাদক জল পড়া এবং উহার দক্ষণ  
যেন চক্ষু কামড়ায় এরূপ অশ্রুত হইয়া (আস্, মার্ক্-কর); চক্ষে জ্বালা এবং  
চুলকানি, বাহার দক্ষণ রোগী বারবার চক্ষু টিপিতে (পাকলাইতে) এবং চক্ষু  
মুছিতে বাধ্য হয় (ক্লেকাশ্, পাল্‌স); চক্ষুর পাতা লালবর্ণ এবং জ্বালা-  
যুক্ত; চক্ষুর পাতার ধার (প্রান্ত) ক্ষীত (মার্ক্-কর, সাল্‌ক্); বারবার চক্ষু  
টিপনেব (পাকলাইতে) ইচ্ছা (ক্লেকাশ্); চক্ষুর পাতা ক্ষীত এবং উহাতে  
অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি; চক্ষু দিয়া অনন্তরত প্রচুর পরিমাণে ক্ষতকারক  
জল পড়া, বাহার দক্ষণ রোগী অক্ষতর দেখে বা চক্ষে দেখিতে পার না (মার্ক্-  
কর); একখানি পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে যেরূপ হয়, সন্ধ্যার  
সময় চক্ষে সেরূপ স্থাপ্‌সা দেখা (কষ্ট্, মার্ক্, পিটোল্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্);  
অধিক পরিমাণে তেজুর (স্রব্দ) সঞ্চিত হইলে যেরূপ হয়, চক্ষুর কর্ণিয়াতে  
(Cornea) সেরূপ অশ্রুত হয়, বাহার দক্ষণ রোগী চক্ষু বুজিয়া চক্ষুর পাতা  
চাপিতে বাধ্য হয় (ক্লেকাশ্, পাল্‌স); আলোক পানে তাকাইলে অত্যন্ত  
কষ্টোত্তব বা চক্ষে আলোক সহ্য হয় না (Photophobia) (একন্, বেল্,  
মার্ক্); চক্ষুর কর্ণিয়াতে (Cornea) দাগ পড়ে, ক্ষত হয় এবং ফোড়া পড়ে  
(মার্ক্, সাইলিসি); চক্ষুর উপর দিয়া যেন এক গাছি চুল বুজিয়া পড়িয়া  
রহিয়াছে এরূপ অশ্রুত হয়, বাহার দক্ষণ বারবার চক্ষু মুছিয়া কেদার  
ইচ্ছা হয়।

নাসিকা। নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে (সিপা) ক্ষতকারক স্রব্দ  
নির্গমন (আস্, মার্ক্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে  
জল পড়া এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হওয়া, সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে বাহার  
বৃদ্ধি হয়; সর্দি না লাগিলে বা কোন প্রকারের দৃষ্টঃ কারণ বাতীতক  
হাঁচি দেওয়ার ইচ্ছা (কাম্)।

শ্বাস যন্ত্র। সর্দি অন্তঃ শ্বসন (একন্, কার্কো-বেজ্, হিল্-

মাল্ফ, কস) : কঠিনালীষ উত্তেজনা, এবং উহার লক্ষণ তাহার উল্লেখ হইয়া বক্ষ্যাহব নীচে কথিয়া ধরাবজ্ঞাপ্যবোধ ; প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিলেই কানি এবং থলা দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্নেহ নির্গমন ; ইচ্ছা করিয়া গল ঘু তেজুর দিনেই গল দিয়া প্রচুর পরিমাণে স্নেহ নির্গমন ; বাসিয়া থাকিলে ও কীৰ্ণ নিষ্কাশ টানিতে অত্যন্ত কষ্ট অস্বত্ব হইয় ; বক্ষ্যাহব নীচে চাপিয়া ধরার কার বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বুকের স্থানে স্থানে ঘাটিয়া ধরাব জ্ঞার কণিক বেদনা

নিদ্রা । বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে অত্যন্ত হাঁট উঠ ; ডাঃ খাটেল সেক্ষণ তথ্য, বাহিরে নাহয় সেক্ষণ ঘুম ডাকিয়া যায়।

বাবহার । সকল প্রকারের প্রোফ্রানিউ লক্ষণ বোধ ; শিঃপীড়া ; চক্ষুর বোজক জ্বীর প্রদঃ (Conjunctivitis) ; নাসিকা এবং বায়ুনাল সম্বন্ধীয় সর্দি বা কৈশিক বোণ ; সর্দি জমিত জ্বর ; অন্ধতা এবং কর্ণির অস্বচ্ছতা (Opacity of the Cornea, ইত্যাদি অন্তঃ ইউক্লেশিয়া ব্যবহার্য। ডাক্তার আলেন্ (Dr. Allen) এবং ডাক্তার নর্টন (Dr. Norton) বলেন যে "চক্ষুর অন্তঃ, টো এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। চক্ষুর বোজক জ্বীর অন্তঃ চক্ষু দিয়া প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ এবং জ্বালা উৎপাদক জল নির্গমন এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তাহার কারণে বলেন যে তিনঠাণ্ডা লাগিয়া চক্ষু গতি উৎপাদনের সহায়-কারী বায়ুর পক্ষাঘাতের পক্ষে টো বিশেষ উপকারী। যে প্রকার অন্তঃ চক্ষু দিয়া গাঢ় জল পড়ে তাহাতে ইউক্লেশিয়া এবং বাহ্যতে উত্তাপ অপেক্ষা কম লাগে জল পড়ে তাহাতে আদিনিমিক এবং মার্কিউরিয়াম ব্যবহার্য।"

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সকল অন্তঃই চক্ষু এবং নাক দিয়া জল পড়ে ; প্রাতঃকালে, বিছানার শয়ন করিয়া থাকিলে, ঘরের মধ্যে থাকিলে এবং সন্ধ্যার সময় অন্তঃের শুষ্ক ; বিছনা হইতে উঠিলে, ঘরের বাহির হইলে এবং আহারের পর অন্তঃের উপশম ইত্যাদি ইউক্লেশিয়ার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । ইউক্লেশিয়ার কার্যের সঙ্গে এথুলা, ওলিভাম্ সপা, এপিস্ মেলিফিকা, অর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম্, আদিনিমিক,

হিপার সাল্‌ফিউরিস্‌, ক্যালী বাইক্রমিকাস্‌, ক্যালী আনোডেটাস্‌, মার্কি-  
উরিয়াস্‌ সলিউবিলিস্‌, মার্কিউরিয়াস্‌ কেরোসাইবাস্‌, পাল্‌সেউটার কাথোর  
বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে  
বেলাডোনা, ক্যাল্‌ করিয়া কার্ব, নাক্স, বমিকা, কক্ষরাস্‌, সাল্‌ফার, মিশরী  
টড্যাডির কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** ক্যান্সার এবং পাল্‌সেউটা ইউফ্রেসিয়ার  
প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

**ডাইনুশন বিচারক ।** হানিম্যান এই ঔষধের মূল আরোক ব্যব-  
হাবের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন । এই ঔষধেব ১ম, ২য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইনুশনই  
আমবা সচরাচর ব্যাধার কথিত্য থাকি । আবার কোন কোন চিকিৎসক  
ইহার ১০ এবং ২০০ ডাইনুশনও ব্যাধার কথিত্য থাকেন ।

## জেল্‌সিমিনিয়াম্‌ সেম্পারবিরেন্স্‌, - জেল্‌স্‌

( GELSEMIUM SEMPERVIRENS, - GELS. )

আমেরিকার দক্ষিণ দেশে এই লতা জন্মে । ইহার মূল বা শিকড় বহা-  
নিয়মে প্রক্‌ স্পিরিটে ডিফাইয়া ইহার মূল বা আদত আরোক প্রস্তুত হইয়া  
থাকে । অনেক গ্রন্থে এই ঔষধ জেল্‌সিমিনিয়াম্‌ (Gelsemium) নামে  
উল্লিখিত হইয়াছে ।

**সাধারণ ক্রিয়া ।** গতিশক্তি উৎসাহনের সহায়কারী হইয়া  
মস্তকীয় উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, যাহার দক্ষণ দিক্তিক এবং কলেক্‌কা  
মজ্জার রক্তাধিকা বা বক্তাবরণে হইয়া সার্বাস্থিক বনফল এবং বেজাপূরিক  
এবং অনিচ্ছা পূরিক সম্ভোগনার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হইয়া থাকে ।  
রক্তাধিকালন অধিক হয়, মানসিক শক্তি শিথিল হয়, শৈবিক ঝিলী উত্তেজিত  
এবং প্রদাহযুক্ত হয় এবং তদুপর বর বিরাম জ্বর (Remittent Fever)  
এবং স্নেহা অনিত জ্বরের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । স্নায়বিক মস্তকীয়  
অবসর হইয়া নিদ্রাঘোষ, অগ্ন্যবোধ, সর্বদা নিস্তব্ধভাবে থাকা, সমুদর

যন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত উত্তেজনা বা চেতনা উৎপাদন করা এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি যথো পরিগণিত ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । কোন বিষয়ে চিন্তা করা বা মনোযোগ দেওয়ায় অশক্তি (এথুজা, সিমিসিক্, নাক্স-বম্, কন্স-আস) ; মানসিক শক্তির স্থবর্তা (এইলাহ্, ব্যাপ্ট্) ; সর্বদা চিড়্ চিড়্ করা এবং সহজে চট্টয়া উঠাব স্বভাব ; একাকি থাকিবার ইচ্ছা (কলোস) ; অচেতনতা ; ঘুমেরষাবে প্রণাপ বলা ; অর্জ নিদ্রিতানস্থায় অসংলগ্ন কথা বলা ; ক্যাটালপ্সির (Cataplexy) দ্বারা স্পন্দহীনতা, চকর তাবা বিস্তৃত, চকু বুলিয়া থাকা, কিন্তু চেতনা বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না ; মনের গোপমান ; উল্লাস এবং উত্তার পরকণেই মানসিক অবসন্নতা (ল্যাক্) ।

মস্তক । নেসা করিলে যেরূপ হয়, সেরূপ হেলিয়া উলিয়া পড়া ; মাথা ক্রিম্ ক্রিম্ করা এবং উত্তার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে ঝাঙ্গা বা অঁধার দেখা ; মাথার খালি বোধ এবং মাথা ক্রিম্ ক্রিম্ করা, চঠাৎ নড়াচড়া বা চলিলে যাতার বৃদ্ধি হয় ; মাথার ভারিবোধ, প্রচুর মূত্রত্যাগের পর যাতাব উপশম হয় ; মাথার ভারি এবং চাপা বোধ ; মাথার পূর্ণবোধ এবং উত্তার সঙ্গে সঙ্গে সুখমুগ্ধে উচ্ছাসভব এবং নীতবোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, মস্তিকে সেরূপ অস্তবৃত্ত হয় (হেলিগেরাস্, নাক্স-বম্) ; মাথার পশ্চাৎভাগ, কর্ণের পশ্চাৎভাগ, গ্রীবার উপরিভাগে সজোরে টানিয়া দবার তাদি বেননা বাচা বন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কর্ণের উপরভাগে হঠাৎ মস্তকের উপরিভাগ যেন এক গাছি কিতা দিয়া চাপিয়া বাধা বর্তিয়াছে এরূপ ভ্রূত্বৃত্ত হয় (ক্যাটি-টার্ট্, কার্কো-আনিমেল্, চেলিডন্, কোকা, মার্ক্, নাটটিক্-হাস্) ; মাথার পূর্ণবোধ ; সুখমুগ্ধে উচ্ছাসভব ; নীতবোধ ; গ্রীবা দেশহ ধম-নির মপ্পমানি ; কথা বলিবার সময় জিহবার ভারিবোধ ; মোচড়াইয়া পড়িলে বা পৌত্পিয়া গেলে শোপ হয়, মস্তিকে সেরূপ অস্তবৃত্ত হয় ; সঞ্চালন করার সময় চক্ষুর গোলকে টাটানি ; মাস্তক এবং কদমককা মজ্জাবরক ঝিল্লী এণ্ডারের (Cerebro-spinal meningitis) রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধের অবস্থা, লতাস্ত নীতবোধ ; চকর তাবা বিস্তৃত, কদমককা এবং মস্তিকে



স্বস্তাধিক্য বা স্বস্তাবরোধ ; মাথার উপরিতাগে চাপা বোধ বাহ্য এত প্রবল হয় যে উহা স্বস্ত পৰ্য্যন্তও অল্পভূত হইয়া থাকে ; মাথার অন্তঃস্থ ভারি বোধ হয় ; মাথার আয়তনের ভার বেদনা বাহ্য প্রীবাশেষস্থ সেকবণ্ডের উপরি ভাগে আরম্ভ হয় এবং বেদনা মাথার উপরিতাগ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বাহ্যের দরুণ কপাল এবং চক্ষুর গোলাকে ফাটিয়া যাওয়ার ভার বেদনা অল্পভূত হয়, পূর্বাঙ্ক ১০ টার সময় বা শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদেগ, বমন, শীতল বস্তু এবং পারের পাতা শীতল ; প্রাতঃ-কালে আটারের পর মাথাবৃন্দাভাগে ঘূর্ণঘূর্ণ বেদনা, নড়াচড়া বা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া থাকিলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; মাথাধরা এবং উহাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরা, মুচ্চার ভাব এবং ঘাড় বেদনা ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতা পড়িয়া যায় (কষ্ট, জিজ্ঞাসা) ; চক্ষুর পাতার ভারি বোধ, বাহার দরুণ চক্ষু মেলিতে পারা যায় না বা মেলিতে পারিলেও চক্ষু আপনা আপনি ঘেঁষে বুদ্ধিমা আইসে (কোনাডাম, নেটাম্-কার্ল, নেটাম্-আর্স, নেজা) ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (বেল, হায়োস্, ওপিয়াম্, ট্রাম্) ; চক্ষে আঙ্গা দেখা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধারা ; চক্ষের সম্মুখে ঘূমের ভারি আপনা দেখা (সাইক্লোমেন্, ফন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর উপরিতাগে বেদনা ; চক্ষে গোলমলে দেখা ; অন্ধতা ; ঘাড় ফিরাওরা স্বদেশ দিকে ডাকাইলে এক বস্ত্র ছুইটীর ভার দেখায় ; কোল বস্ত্র পানে ডাকাইলে চক্ষুর গোলাক বাহ্যের চক্ষুর কোণ পানে সরিয়া পড়ে ; চক্ষে আলোক একবারেই গছ হয় না (বেল) ।

কর্ণ । হঠাৎ কান বন্ধ হইয়া কণকালের অল্প বধিরতা ; কানের মধ্যে নৌ নৌ শব্দ হওয়া (ককিউল্, কাম্, লেডাম্) ; সন্ধিবিনতি বধিরতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্য হইতে কানের মধ্য প্রদেশ পৰ্য্যন্ত বেদনা ।

নাসিকা । নাসারন্ধ্রের মধ্যে জ্বালাভূতব ; ইটি দেওয়া ; নাকের মধ্যে টন্টনানি ; সন্ধি (একন্, মার্ক-কর, মাজ্‌নেরিয়া) ; নাসিকার মূলে পূর্ণবোধ ; নাসারন্ধ্রের মধ্যে বেদনা বাহ্য প্রীবাশেষ এবং কণ্ঠস্থ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল ভারি এবং কতকগুলি কণ্ঠস্থ (ব্যাপ্টা),

লাল বর্ণ, উজ্জল এবং স্পর্শনে উষ্ণ (বাগ্‌পট্, বেল্, ওপিয়াম্); মুখমণ্ডলের পেশী শক্ত হয়; চক্ষুর কোটরের স্নায়ুশূল থাকিয়া থাকিয়া বাহ্যর উদ্বেক হয় এবং উভার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীর সংকোচন এবং স্পন্দন।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । জিহ্বা গাঢ় লেপযুক্ত, হরিদ্রার আভাষিত সাদা, জিহ্বার অবলম্বোদ্য ; জিহ্বা এত পুরুবোধ যে উহার নরম বোয়ী অতি কষ্টে কথা বলিতে পারে, অথবা একবারে কথা বলিতে পারে না ; জিহ্বার আংশিক পক্ষাঘাত (কষ্ট, কোনারাম্, হায়োস্); ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কালচে স্লেষ্মা বাবা আবৃত; মুখে দুর্ভুজ; মুখগহ্বরের জালাহুতব বাহ্য গলার মধ্য এবং পাকস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; ডেলার জ্বর কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গলার মধ্যে একরূপ অস্বভূত হয়; গলার মধ্য বেন পবিপূর্ণ রহিয়াছে একরূপ অস্বভূত হয় (ইউপেট-পাপূর, মেনমেন, সাই-লিদি)। গিলিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; গিলিবার সহায়কারী যন্ত্রের পক্ষাঘাত; গিলিবার সময় কান্নের মধ্যে খোঁচা বিধার জ্বর অস্বভূত হয়; গলনালীর মধ্যে অক্কেশ এবং খিঁচ খিঁচ জ্বর বাতনা; গলনালীর মধ্যে ডেলার জ্বর কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে একরূপ অস্বভূত হয়, বাহ্যর নরম বোয়ী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে; ডিপ্পিরিয়া; জ্বরের সময় আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত টুটনিং এবং পক্ষাঘাতের পূর্ণ লক্ষণ।

পাকস্থলী এবং উদর । পাকস্থলী এবং উদরে খালি এবং দুর্বল বোধ হাইড্রাই, সিপরা, সাঙ্ক); পাকস্থলীতে পূর্ণ এবং আঁটবোধ, কানডেব চাপা লাগিয়া বাহ্যর নরম হয়; টক উপহার উঠা (নাইট্রিক-অ্যাস, নাক্স-বম); বমনোৎপন্ন। উদরের উপরিভাগে হঠাৎ আক্কেশিক বেদনা এবং তদনুরূপ বেদনা সহিয়া স্নেহ উদরে সংকোচন বোধ, বাহ্যর নরম বোয়ী চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠে; তিভা বা আত্মবায়ুতে অস্বস্তি প্রকাশিত তরুণ প্রসার; আত্মিক জ্বর বা অস্বস্তিকারে দক্ষিণ প্রাণী প্রদেশে (Right-liae region) টাটনিং বা বেদনা; উদর প্রাণীরে (Abdominal walls) অত্যন্ত বেদনা বা টাটনিং।

মন । হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, শোক, জ্বর এবং কোন প্রকার উত্তেজনার সংবাদ পাইয়া উদরামর (ইগ্নেস্, কস্-অ্যাস্,

ওপিয়ান) : কোন প্রকার অসাধারণ চর্চটনার আশঙ্কার দরুন উদরাময় ; শুষ্কতারের সঙ্কোচকে যত্নে পক্ষাঘাত হইলে বেকরণ হয়, কোমল মলভাগ করার সময়ও সেকপ কষ্টানুভব ; মল হরিদ্রাবর্ণ, মল সংযুক্ত, পিত্তযুক্ত, হৃৎকের সর্বের রক্ত বিশিষ্ট, কানার রক্ত বিশিষ্ট ; সবুজ মলভাগ ; শুষ্কতারের সঙ্কোচকে যত্নে পক্ষাঘাত (বেল, হারোস) ।

মূত্রায়ত্ত । প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার স্বচ্ছ মূত্রভাগ (কন্-আস) বাহ্যতে মাথ ধরার উপশম হয়, মূত্রাধারের সঙ্কোচকে যত্নে পক্ষাঘাত কেতু মূত্রধারণে অশক্তি বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন (কষ্ট) ; ভাষিক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্রভাগ ; মূত্রাধারে আসানুভব এবং তরুণ বারবার মূত্রভাগের ইচ্ছা ও কৌথপাড়া বা শূণ (কাহু, ক্যাম্প, মার্ক-কর) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের অনিচ্ছা পূর্বক বা অসাড়ে বাহু নির্গমন, যাতার পূর্বে কখন পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়, কখন বা পুরুষাঙ্গ খাড়া হয় না এবং তৎপর অত্যন্ত তরুণতা এবং মানসিক অবসন্নতা (চায়না, কন্-আস) ; মলভাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক বাহু নির্গমন । স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রদেশে প্রসব বেদনার জ্ঞান প্রবল বেদনা বাহা পৃষ্টদেশ এবং উরু পর্যন্তও বিস্তৃত হয় (সিমিসিক্, সিকেল) ; জরায়ুতে ভারিবোধ (নাক্স-বম্) ; কষ্টকর সঞ্চঃপ্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে আক্ষেপিক এবং শায়ুলের জ্ঞান বেদনা (সিমিসিক্) ; রক্তঃপ্রোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ (ককিউল, নাক্স-মক্) ; গর্ভাবতার উদর এবং পায়ে খিলখরা, এক বস্ত্র হইটীর জ্ঞান দেখার ; সর্বদা ঘুমের ইচ্ছা এবং কিমান (নাক্স-মক্) ; পেটীর শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ; আক্ষেপ (বেল, হারোস) ; নির্দিষ্ট সময়ে প্রসব বেদনা ভাল-রূপ হয় না বা একবারেই হয় না ; জরায়ুর মুখ বিস্তৃতরূপে খোলা থাকে অথবা উহার কোন ক্ষমতাই থাকে না (কলোফিলাম) ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা ; জরায়ুর মুখ কঠিন হইরা থাকে বা খোলে না (বেল, সিমিসিক্, একন, কলোফিলাম) ; গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে প্রবল বেদনা, মাথা ঘরা ইত্যাদি ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনের উপরিভাগের আক্ষেপ হেতু রোগী কানক

তওয়ার উপক্রম হয়; অতঃপরে বক্রণ হয়; গলার মধ্যে সেক্রপ থগ্গ্গে  
বোধ; বৃকের নিম্ন প্রদেশে আঁটাবোধ (কাঙ্কট, কই, ইগ্গেন্স)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপিণ্ড অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে;  
হৃৎস্পন্দন; এদিক ওদিক চলিয়া না যেড়টিলে রোগী (ত্রীলোক) মনে কবে  
যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে; নাড়ী অতগামী, কোমল, চর্কল  
এবং লুপ্তপ্রায় (একন্)।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবাদেশত পেশীতে বেদনা, ষ্টার্নো ক্লাইডো  
পেশীতেই (Sternocleidomuscle) এবং কর্ণমূলের গ্রীষ্ম পশ্চাৎদেশেই বাহ্য  
অঙ্গিক অমুতৃত হয়; যেকদন্ত হইতে মাপা এবং বক্র পর্যন্ত বেদনা; কসেক-  
কার বক্রাধিক্য বা বক্রাববোধ; অত্যন্ত বলবৎ; অলসবোধ; পেশী-  
গুলিতে মোচড়াটকা পড়া বা ধঁকলিয়া যাওয়ার ভায় অমুতৃত হয় এবং উহার  
বেচ্ছা পূরক কার্যের শক্তি থাকে না; লোকোমোটোর আটাক্সি (Loco-  
motor ataxy); নিম্ন অঙ্গজের পক্ষাঘাত; কোমর এবং শুষ্কতারের ঠিক  
উপরিতাগে ঘূর্ণবৃত্ত কনকনানি বা বেদনা; রোগী চলিতে পারে না এবং  
তাহার বেচ্ছাপূরক পেশী সকলনের শক্তি থাকে না।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । শরীরের অঙ্গের কাশনি  
(কাঙ্কটল, কোনারাম); অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীর গভীরতম অংশে একা সন্ধিতে  
কনকনিয়া বেদনা; হাত পারের দ্রাবুঙ্গ এবং বাতের বেদনার ভায় বেদনা  
(ব্রাই, মিরিসিক্, রাস-টক)। সামান্য পরিপ্রঃমই পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গে  
প্রাপ্তি বোধ; পারের পেশীর শক্তির হ্রাস বা বিনাশ, বাতের দরুণ রোগী  
উক্ত অঙ্গাদি বেচ্ছা পূরক সকলন করিতে পারে না।

নিদ্রা । অস্থির নিদ্রা; মনের অশান্তিজনক স্বপ্ন দেখা (হায়োস্)।  
সাপেক্ষ উদ্বেজনর দরুণ নিদ্রালুপ্ততা (বেল, কাকরা)। অত্যন্ত অলস এবং  
নিদ্রাবেশ বা বিদ্রাব, কিন্তু কোন মতেই ঘুম হয় না।

জ্বর । প্রতিদিন অপরাক্ষ ঠটা হইতে ঠটা পর্যন্ত শীতবোধ, অলস  
বোধ, হাত পা ইত্যাদিতে কনকনানি এবং প্রাপ্তি বোধ ও কনকনানি;  
হাত দিগাশীত আরম্ভ হয়; শীত পৃষ্ঠ দেশের নিম্ন দেশ হইতে উর্দ্ধদেশে  
বিস্তৃত হয় এবং হাত পারের পাতা ঠাণ্ডা; বস্তক এবং ঘূর্ণমণ্ডল উষ্ণ;

শরীর উষ্ণ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ ; অলসবোধ, বাহার দ্রুণ হ্রস্ব ভাবে থাকিবার ইচ্ছা হয় ; প্রতি দিন এক নির্দিষ্ট সময়ে শীত বোধ, প্রাধানতঃ প্রাতঃকালে ; শীতের পর শরীর উষ্ণ এবং তৎপর বর্ণ হয় ; বরকের অলে ভিজাইয়া রাখিলে বেরূপ হয়, পায়ের পাতা সেরূপ ঠাণ্ডা ; স্বাভাবিক শীত কম্প এবং তৎকরণ দাঁতে দাঁতে খট্ খট্ শব্দ করা ; অর, কিন্তু উহাতে পিপাসা থাকেনা (পাল্‌স্) ; নাড়ী মৃদুগতিবিশিষ্ট, কিন্তু নড়িলে চড়িলেই ক্রতগামী হয় ; স্বপ্ন-বিরাম (Remittent) এবং আত্মিক অর বা অববিকার ও উহার সঙ্গে সঙ্গে দ্রাব্যিক লক্ষণের প্রাধান্য ।

ব্যবহার । কোন প্রকারের কুসংবাদ বা মনের উত্তেজনা উদ্দীপক সংবাদ পাওয়ার দ্রুণ অস্থখ ; ভর পাইয়া অস্থখ (একন্, ওপিরাম্) ; কোন প্রকারের চর্ঘটনা ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া অস্থখ ; অত্যন্ত দুর্বল কারক (Asthenic) অর ; স্বপ্ন-বিরাম অর ; সবিরাম বা পালাজর ; টাইকয়েড্ অর বা অর বিকার ; ফোটিক-অর ; যে প্রকার ফোটিক অরে আক্ষেপের ভাব থাকে, সে প্রকার অর ; যে প্রকার স্নৈমিক কিলীর অস্থখে অলবৎ তরল নিঃসরণ হয়, এবং পূর্বের ন্যায় স্নেহা নির্গত হয় না, সে প্রকার অস্থখ ; অকৃতা ; ব্রায়ুল ; শিশু বা ছোট বাগক বালিকাগণের স্বপ্ন বিরাম অর ; মৃগীরোগ ; আক্ষেপ ; পক্ষাঘাত ; হিষ্টিরিয়া ; লোকোমোটর অ্যাটাক্সী (Locomotor ataxy) ; দ্রাব্যিক শীত কম্প ; মস্তিষ্ক এবং কসেরুকা মজ্জাবয়ব কিলী প্রদাহ (Cerebro-spinal-Meningitis) ; কসেরুকা মজ্জা এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ; কোরিয়া (Chorea) ; বাতরোগ ; পেশীবাত ; কঠকর বহঃস্রাব এবং বাহকের বেদনা (Painful menstruation) ; স্রীলোকের ডিম্ব কোষের উত্তেজনা ; বিলম্বে বিলম্বে প্রসব বেদনার আক্রমণ বা যথোচিত পরিমাণে প্রসব বেদনা না হওয়া ; প্রসব বেদনা প্রবল হইলেও ভরাঘুর মুখ শক্ত থাকে বা মুখ খোলে না ; ক্রুদ্রিম প্রসব বেদনা ; গর্ভস্রাব ; সন্তান প্রসবের পর আক্ষেপ ; মূত্র ধারণে অশক্তি বা অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন ইত্যাদি অস্থখে জেল-সিমিয়াস্ ব্যবহার্য ।

( বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । মৃদুদয় পেশীর বহঃস্রাব বা শিথিলতা

(সিমিসিক) ; কসেককার অবসন্নতার দরুন সমুদয় শরীর যেন পাতলা বোধ হয়, বাহ্যি হস্ত মৈথুনকারীগণই অধিক অস্থির করে ; হস্ত মৈথুনকারীগণের অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা এবং অত্যন্ত অলসবোধ ; তামাকু বাইয়া মাথা ধরা ; ঠাণ্ড মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, উল্লাস, শোক, ভয় জনিত অস্থির ; অত্যন্ত দুর্বলতা এবং তদ্রূপ শরীর কম্পন ; স্নায়বিক ধাক্কা ; বুঝা বুঝতীর বা শিশু এবং ছোট বালক বালিকার অস্থিরে বিশেষ উপযোগী ; চলিয়া বেড়াইলে, বিছানার উপর থাকতে, তামাক বাইলে, মদ বাইলে, রাত্রি জুই প্রভেদের পর, ডিক্রা বা শেহুগেতিয়া বায়ুতে, বহির্লৌকিক পরিবর্তনে অস্থির বুদ্ধি ইত্যাদি জেলসিমিরামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

লক্ষণ বিশিষ্ট ঔষধ । জেলসিমিরামের কার্যের সঙ্গে কোন-রামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । স্বল্প বিরাম বা একজরে ইহার কার্য ঘাণ্টিসিরাম তার । এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য একোনাইট, বেলোডোনা, আইওনিয়া, কলিকাম, নিমসিকিউগা, চায়না, গুনিয়াম, রাসটেল, ট্র্যামোনিয়াম এবং বিরেট্রাম বিরাইভের ন্যায় ।

প্রতিষেধক ঔষধ । চায়না এবং ককিরা জেলসিমিরামের প্রতিষেধক ঔষধ ।

ডাইলুশন বিচার । স্বল্প বিরাম বা একজরে ১২ দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । ফিট্রিয়া, কোরিয়া, ধমুঠকার, সম্মান প্রদব উপলক্ষে আক্ষেপ, জায়ুল, বিশেষতঃ মূত্র মস্তলের জায়ুল, শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উত্তেজনা জনিত অস্থির, মস্তিক এবং কসেককা মজ্জার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ইত্যাদিতে ১২ চইতে ৬৪ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । পক্ষাঘাত (শারীরিক এবং স্থানিক) এবং তদ্ব্যনিত অস্থির ১২ এবং ৩০ ডাইলুশন বিশেষ উপকারী । পুরাতন আকারের স্নায়বিক শিরঃশীড়ার এই ঔষধের ২০০ ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া, ৩টা যুবতীর চিকিৎসায়, একদিন অন্তর একদিন ১ বাত্মা, এই প্রকারে ২০ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে ।

## হামামেলিস্ বার্জিনিকা,—হামা

(HAMAMELIS VIRGINICA,—HAM.)

আমেরিকার আর্জ' ভূমিতে এই গাছ আছে। এই গাছের বাকল বথানিয়মে প্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গুঁড়াত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আদত গুঁড়াকে হামামেলিন্ (Hamamelin) বলে।

সাধারণ ক্রিয়া। শিরার (Veins) উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, যাহার দরুণ শিরাশ ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, শরীরের নানা অংশের শিরা সহকীর (Venous) রক্তাবিক্য বা রক্তাবরোধ, রক্তস্রাব এবং শিরার ব্যক্তিক অস্থল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুহ এবং জননেন্দ্রিয়ার উপর ইহার বিশেষ কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হেল্ (Dr. Hale) বলেন যে “ধমনির উপর একোনাইট যে রূপ কার্য করে, শিরার উপর হামামেলিস্ সেরূপ কার্য করিয়া থাকে। শিরার গতি শক্তি শাসনকারি দ্রব্যের আকোপ উৎপাদন করা হামামেলিসের এক মুখ্য (Primary) কার্য মধ্যে পরিগণিত। ইহা শিরাগুলিকে উত্তেজিত করিয়া উহার আবরণকে এত অধিক আক্ৰমণ করে যে উহার দরুণ প্রকৃত প্রদাহ না হইলেও উহার এমত অস্থা আনয়ন করে যে উহা হইতে শিরা ভবিষাতে প্রদাহযুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। প্রতিক্রিয়াতে আক্রান্ত শাখাগুলির সামান্য রক্তস্রব পক্ষাঘাত হয় এবং তদরূপ শিরার আবরণের পক্ষাঘাত হইয়া শিরাশ ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি, শিরাসহকীর রক্তাবরোধ এবং শিরার ব্যক্তিক অস্থল হইতে পারে।” শিরা সহকীর রক্তস্রাব আনয়ন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মস্তক। অর্ধজ্ঞান রহিততা (Stupor); শিরঃশীড়া; মস্তক, গ্রীবা এবং কপালে পূর্ণবোধ; জু অঁটিয়া রাখিলে-যে রূপ হয়, কপালের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত সেরূপ অঁটিয়া রাখার ভায় অহুত হয়।

নাসিকা। নাক দিয়া রক্ত পড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নাকের

গোড়ায় আঁটাবোধ এবং কপালে, হৃদে চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে, চাঁপাবোধ (একন্, ডাক্) ; নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া গেলে মাথার অস্থির অনেক উপশম হয় ; নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (একন্, বেল, চারনা), রক্ত কালচে ; আপনা আপনি, বা রক্তঃরোধ হওয়ার দরুন নাক দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্‌স্, সিপিয়া) ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মাড়ি ফীত এবং উহা হইতে সহজে রক্ত পড়া (মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্) ; দাঁত তুলিয়া ফেলার পর দাঁতের গোড়া দিয়া কালচে রক্তস্রাব (আস্) । তালুকঃ হই পাখাঁহিত গ্রন্থিগণ (Tonsils) এবং মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ; শিরী গুলির বিবৃদ্ধি এবং উহার ফীতি ও বিস্তৃতি ।

পাকস্থলী । পাকস্থলী হইতে কালচে রক্ত উঠা (রক্তবমন, Hematemesis) ; শরীর কম্পমান, উৰ্দ্ধন, ঠাণ্ডা এবং নাকী ক্রতগামী ও প্রচুর ঘৰ্ম্ম (আস্) ।

মল এবং মলদ্বার । রক্তস্রাবক অর্শরোগ (Bleeding Piles) (নাইট্রিক্-আস্, কাইটোন) ; গৃহবার দিয়া অধিক পরিমাণে কালচে রক্ত নির্গমন (ইউকেলিপ্ট) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রনাগীতে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া তৎপব অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গমন এবং বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; মূত্রকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হেতু রক্ত মূত্র ত্যাগ (Haematuria) (আস্, কায়্, কল্‌চ, কন্) ।

জননেন্দ্রিয় । পুরুষের অণ্ডকোষে প্রবল বায়ুশূল ; বেদনা শুক্র নিঃসারক সূত্র বা নালী (Spermatic Cord) দিয়া (বাবেরিন্স) অণ্ডকোষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (মার্ক্) ; এক শিরার ব্যাবায় (Orchitis) (পাল্‌স্) ; অণ্ডকোষের ফীতি এবং উহাতে অত্যন্ত টাটানি ; শুক্র নিঃসারক সূত্র বা নালী বা অণ্ডকোষাধারেব শিরার ফীতি (Varicocele) ; কোরগু (Sarcocoele) । স্ত্রীর হইতে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব (একন্, ইরিজারগ, বেল্, মিলিকলিয়াম্) ; স্ত্রীর হইতে অধিক পরিমাণে কালচে রক্তস্রাব ; যোনি-ধারের আক্ষেপ (স্কাব্‌স্) এবং অত্যন্ত টাটানি ; যোনিতে চুলকানি



(কাহ্ন); রক্তস্রাবের সময় বোনিয়ার দিরা রক্তস্রাব না হইয়া নাকাদি দিরা রক্তস্রাব (Vicarious Menstruation) (ব্রাই, পাল্‌স); ডিম্বকোষে বেদনা এবং টাটানি (এপিস্, বেগ্‌, সিমিসিক্); পায়ের শিরার সাদা ক্ষীতি (Phlegmasia alba dolens)।

শ্বাস যন্ত্র । রক্তোৎকাশ (Hæmoptysis) (একন্, চারনা, ফেরাম্, মিলিকনিয়াম্, সাবাডিগা, সাল্‌ফ্-আস্); খুণ্-খুশে কাশি এবং উগার সঙ্গে সঙ্গে মুখে রক্ত বা গন্ধকের স্বাদ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হৃৎ প্রত্যঙ্গের শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (পাল্‌স্, জিক্) এবং ক্ষত ও উচ্চাতে হৃৎ কুটানের জ্বর বেদনা বা কুট-কুটানি; হাত পায়ের শিরার প্রদাহ এবং ক্ষীতি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হ্রস্বতা এবং উচ্চাতে অবলম্বন; হাত পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাগ উতির্য বাওয়ার জ্বর নীলের আভাযুক্ত ক্ষত।

বাবহার । শরীরের সমুদয় অংশ বা যন্ত্র হইতে কাল্‌চে (Venous) রক্তস্রাব; শিরার ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি; শিরার প্রদাহ এবং ক্ষীতি; পায়ের শিরার সাদা ক্ষীতি এবং বিস্তৃতি (Phlegmasia alba dolens); রক্তস্রাবক অন্তরেণ (Bleeding Piles); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব; বোনিয়ার আক্ষেপ; ডিম্বকোষ প্রদাহ; একশিরার ব্যারাম (Orchitis); অণ্ডকোষের দারুণ অস্ত্রখে হামামেলিস্ বাবহার্য্য। ডাক্তার লাড্‌ল্যাম্ (Dr. Ludlam) বলেন যে জীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ এবং পুরুষের প্রমেহ জন্মিত একশিরার ব্যারামে হামামেলিসের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। বোনিয়ার আক্ষেপে হামামেলিসের বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ডিম্বকোষের উত্তেজনা হেতু কষ্টকর রক্তস্রাব এবং বাধকের বেদনার হামামেলিস্ বিশেষ উপকারী। জীলোকের প্রমেহ রোগে হামামেলিস্ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া অনেক চিকিৎসক বিশ্বাস করেন।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । শিথিলমূত্রের অমুখ এবং কাল্‌চে রক্তস্রাব হামামেলিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হামামেলিসের কাঁঠোর সঙ্গে পাল্-

সেটিলার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিধে ইহার কার্যের সঙ্গে ইপিকাকিউএনা, মিলিকলিগাম, বেলাডোনা, চায়না, ফেরাস্, সাল্‌ফিউরিক্‌ অসিড্‌ এবং টিলিয়াসের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । পাল্‌সেটিল।

ডাইলুশন বিচার । তরুণ রক্তস্রাবে ১ম দশমিক ডাইলুশন ব্যবহার্য। অত্যন্ত অল্পে ২ হইতে ১২ ডাইলুশন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ রক্তস্রাবে অনেক চিকিৎসক মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্র ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাহ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৫ ফোঁটা মূল আরোক, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ব্যবস্থা।

## হাইড্রাস্টিস্‌ ক্যানাডেন্সিস্‌,—হাইড্রাস্টিস্‌

(HYDRASTIS CANADENSIS,—HYDR. CAN.)

ক্যানাডা, ওহিও প্রভৃতি আমেরিকার পার্শ্বতীর দ্বারা বিশিষ্ট জললাভুরিতে এই গাছ জন্মে। মূল বা শিকড় বৃথা নিরবে ঐক্‌ শ্লিপিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল বা শিকড় অত্যন্ত উষ্ণ জলে ভিজাইয়া ইহার কাত (Infusion) প্রস্তুত হয়। ইহার আরোক উজ্জল করিত্বা বর্ণ।

সাধারণ ক্রিয়া । রৈস্মিক কিলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল। চক্ষু, নাসিকা, শ্বসনস্থর, গলার মধ্য, গ্ৰন্থ, বোনিফার, কবায়ুর প্রীবা বা শ্বশ্বের চক্ষুপার্শ্ববর্তী স্থান এবং শ্বশ্বের রৈস্মিক কিলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত অংশের রৈস্মিক কিলী অপেক্ষা অধিক প্রবল, বাহার দক্ষণ উক্ত অংশের স্বাভাবিক নিঃসরণ পরিমাণে বৃদ্ধি এবং তৎপর উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিকৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ রৈস্মিক কিলীর নিঃসরণ পরিষ্কার, সাদা, চট্‌চট্‌িয়া আঠা এবং স্বচ্ছ থাকে এবং তৎপর উহা করিত্বাবর্ণ, দাঢ়, সবুজ এবং কখন কখন রক্তমিশ্রিতও হইয়া থাকে। জীবনের সাধারণ লইয়া টানিলে উহা সুতাব স্তর আকার ধারণ করে। এই

একর স্নেহের সন্ধার হইয়া আক্রান্ত কিল্লীতে ছাল উঠিয়া বাওয়ার স্কার হইয়া উঠা হইতে পূর্বসংযুক্ত স্নেহা নির্গমন এবং উহাতে কতও হইতে পারে । আক্রান্ত অংশের রক্তবহা কৈশিক নালীতে (Capillaries) রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইয়া প্রথমতঃ এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে । তৎপর এই অবস্থা রক্তের প্যাসিভ্ হৈর্য্যাবস্থার পরিণত হয় এবং স্নৈয়িক কিল্লীর গ্রন্থি উদ্বেজিত হয় । অবশেষে উহার অবসন্নতা এবং হ্রাসের দরুণ, নিঃসরণের উৎপত্তির মূল বিনষ্ট হইয়া আক্রান্ত স্নৈয়িক কিল্লী শুষ্ক, চক্চকে এবং নির্জল, কঠিন হইয়া উহার কার্য্য করার শক্তি একবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব যে প্রকার অস্থি স্নৈয়িক কিল্লীর উক্ত প্রকারের অবস্থা হেতুতে পাওয়া যায় তাহাতেই হাইড্রাটিক্স ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে । চর্ম্ম এবং গ্রন্থির উপরও এই ঔষধের উক্ত প্রকারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক দরুণ উক্ত ব্যৱের প্রথমতঃ রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, উহার কার্য্যের অতিরিক্ত চাকলা তৎপর হইয়া তৎপর উহার জড়তা বা অবসন্নতার দরুণ আক্রান্ত স্থান উক্ত প্রকারের অবস্থা প্রাপ্ত হয় । অতএব হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা প্রণালীতে চর্ম্মের বিকৃত লালবর্ণ হওয়া, কঙ্গতানি বিশিষ্ট কুসুড়ী, বিকচ (Eczema), কত এবং শরীরের নানা অংশের বা বস্ত্রের কত, ঘর্ষণতা বা জড়তাতে (স্থানিক বা সার্কাদিক) হাইড্রাটিক্স বিশেষ উপকারী ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সকল বিষয় জ্বলিয়া যাওয়া (বেল্, কাক্-কার্ক্, গ্রাক্, রাস্ টেক্স) ; যে বিষয় পড়া যায়, বা বাহার বিষয় কথা বলা যায়, তাহা স্মরণ থাকে না ; খিটখিট্ করা এবং চটিয়া যাওয়া ; সর্বদা জীবার ভাব (নাক্স-বন্) ।

মস্তক । নেমা করিলে বেঙ্গল হয়, সেঙ্গল অস্বস্ত হয় (জেল্‌স) ; সাধারণ সমুখদেশে ভারি বোধ এবং উহাতে ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ; সঙ্গীভূত উক্ত প্রকারের মাথা বেদনা (ইউক্লেস্, পাল্‌স্, সান্স্‌নেরিয়া), হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে যাহার উপশম হয় ; সাধারণ সমুখ প্রদেশে ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরোচ্চ প্রদেশে এবং কোমরের পশ্চাদ্দেশে ঘূর্ণ ঘূর্ণ বেদনা ; শাক্-

হৃদীর অল্পখ জনিত বা আৱণিক মাথা ধরা ; মাথার সম্মুখের চুলের ধারে ধারে বিকচের স্ভার (Eczematous) ফুসুড়ী এবং চুলকানি, ঠাণ্ডা ঘর হইতে সরম ঘরে গেলে ঘাটাব বৃদ্ধি হয় এবং ধুইলে ঘাটা হইতে কল্‌তানি পড়ে ।

চক্ষু । চক্ষু প্রদাহ ; স্লেয়া জনিত চক্ষু প্রদাহ ; গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ ; চক্ষু দিয়া গাঢ় স্লেয়া নির্গমন (মার্ক) । চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া ; চক্ষে জালা এবং চিড়িকমারা (আস্, ইউফ্রেস, মার্ক-কর) ।

কর্ণ । কান দিয়া পূঁষ পড়া ; কান দিয়া গাঢ় স্লেয়া নির্গমন ।

নাসিকা । নাক দিয়া অনবরত সাদা স্লেয়া নির্গমন ; মাথার সম্মুখ-ভাগে বেদনা ; নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগ হইতে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়া নির্গমন (ক্যালী-বাট, নেট্রাম্-আস্) ; সর্দি এবং নাক দিয়া ক্ষতকারক জলবৎ স্লেয়া নির্গমন ; নাকের মধ্যে উষ্ণ, জালা এবং ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্ভার অনুভূত হয় (সিপি, হায়োস্, মার্ক-কর) ; ঘরের মধ্যে থাকিলে নাক দিয়া অধিক পরিমাণে স্লেয়া নির্গত হয় না, ঘরের বাহির হইলে নাক দিয়া প্রচুর স্লেয়া নির্গত হয় ; গলায় মধ্য এবং বৃকে ছাল উঠিয়া যাওয়ার স্ভার অনুভূত হয় ; হাঁচি দেওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের উপরিভাগে পূর্ণ-বোধ (একন্, সালুনেরিয়া) ; মাথার সম্মুখভাগে গুল্‌গুণে বেদনা ; নাকের মধ্যের প্রদাহ এবং ক্ষত (Ozœna) এবং শুষ্ক নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত পূঁষ নির্গমন (মার্ক, নাইট্রিক্-আস্) ; বাতাস লাগিলে নাকের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ হয় (আণ্টি ক্রুড, সোরিনাম্, অস্‌মিয়ার) ।

মুখমণ্ডল । মুখাকৃতি শিটা, রুগ এবং ক্রান্তির চিহ্নযুক্ত ।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখগহ্বরের প্রদাহ (মিউর-আস) ; স্তন দুগ্ধ পান করানোর সময় স্ত্রীলোকের এবং ভর্তুক শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের (মার্ক্যারি এবং ক্রোয়েট্‌ অব্‌ পটাস্ বাবচারের পর) মুখের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় চট্‌চটিয়া আঠা স্লেয়ার সঞ্চার ; মুখে পোল-মরিচের স্বাদ (ল্যাঙ্ক) ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত বা হরিদ্রার রেখা বিশিষ্ট ; জিহ্বা ক্ষীত এবং দাঁত দ্বারা চাপিলে উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে (আস্, মার্ক) ; পুড়িয়া বা ছাল উঠিয়া গেলে বেৰুণ হয়, জিহ্বার সেৰুণ অনুভূত হয় । কাশিলে বা গলা সেকুর দিলে মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে এবং নাসি-

কার গোড়ার পশ্চাৎভাগে হইতে, হরিত্রাবর্ণের, চট্‌চট্টিয়া আঠা স্লেয়া নির্গমন (কালী-বাই); যুগলবর্ণের পশ্চাৎভাগে ছাল উঠিয়া বাওরার ভায় অস্বস্ত হয়; গলার মধ্যে কত, বিশেষতঃ পানীর অপব্যবহারের পর।

পাকস্থলী এবং উদর। পাকস্থলী যেন নেতা হইয়া পড়ে বা পেটে অসাড় বোধ (ব্যাপ্ট, সিমিসিক, ইগনেস, কস্, মাল্‌স্, সিমিয়া) এবং হুংস্পানন, বাহার পূর্বে পাকস্থলীতে ঘুশ্‌ঘুশে রকমের কন্‌কনিয়া বেদনার উল্লেখ হয়; পাকস্থলীর স্লেয়া জনিত পুরাতন রোগ এবং পাকস্থলীতে ক্রত; উদগারে গলা দিয়া টক জল উঠা (নাক্স-বম); জল এবং দুগ্ধ ব্যতীত বাহ্য খাওয়া বাদ উহার সমুদয়ই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে। তলপেটে কর্তনবৎ প্রবল বেদনা বাহ্য অভ্যর্থার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, মলত্যাগের পর বাহার উল্লেখ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছার ভায় শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। বৃহৎ অস্ত্রের যে অংশে ইলিয়াম্ (Ileum) শেষ হইয়াছে, সে অংশে (Caecum) প্রথম বেদনা; স্রীং প্রদেশে প্রথম বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী এবং অস্ত্রে ঘুশ্‌ঘুশে বেদনা এবং জ্বালা; মলত্যাগের সময় পেট কামড়ানী (ব্রাই, বার্ক্‌, কলোস্, চেলিডন্‌); অস্ত্রের স্লেয়া জনিত রোগ এবং তৎপর অস্ত্রে ক্রত; অস্ত্রের মধ্যে দ্রুতিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুন শূল বেদনা (Flatulent colic) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছার ভাব।

মল। ফিকা রক্তবিশিষ্ট, উগ্র, সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ (উদর-মর); কোঠবদ্ধ এবং মল স্লেয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত কঠিন লম্বা এবং মোটা নেড় (গুলিয়াম্); কোঠবদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ রোগ (নাক্স-বম্, মাল্‌স্); শুষ্ক ঘারে নানী না (Fistula in ano)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্র পচা গন্ধ; মূত্রাধারের স্নৈমিক রোগ এবং তদ্বন্ধন মূত্র গাঢ়, হ্রতার ভায় তলানি পড়ে; মূত্রকোষ প্রদেশে ঘুশ্‌ঘুশে কন্‌কনানি।

জননেত্রিয়। প্রমেহ রোগের দ্বিতীয়াবস্থা এবং তদ্বন্ধন মূত্রনালী দিয়া হরিত্রাবর্ণের গাঢ় ক্লেদ নিঃসরণ (আগ্নাশ্, পিট্রোসেল্, পাল্‌স্); পুরাতন আকারের প্রমেহ রোগ (Gleet) এবং তদ্বন্ধন কোন প্রকার বেদনা যন্ত্রণাদি থাকে না (মাল্‌স্, পিট্রোসেল্); অসাড়ো ধাতুনিঃসরণ (Spermatorrhea) হেতু দুর্বলতা; (কস্-আস্)। স্রীলোকের চট্‌চট্টিয়া আঠা হ্রতার

জায় গাঢ় এবং হরিজ্ঞা বর্ণের খেত প্রকার নিঃসরণ; অরান্দু স্থান স্রষ্ট হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অরান্দুর মুখ এবং উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানে ও যোনিদ্বারে কণ্ড (আর্জে'ক্'-নাইটিক্); যোনির অভ্যন্তর চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খেত প্রকার নিঃসরণ; শূকব সহবাসের অন্ত্যন্ত ইচ্ছা ।

শ্বাসযন্ত্র । বায়ুনের উপরিভাগে স্বচ্ছ স্বচ্ছ করার দক্ষ, শুষ্ক কর্ণ কানি; বৃক্কে ছাল উঠিয়া বাওরার জায় টাটানি এবং জ্বালাহুতব; বৃক্কে বয়সে বাহারী অভ্যন্তর হ্রস্ব হইয়া পড়ে তাহাদিগেব বায়ুনের প্রদাহ এবং তদ্রূপ গলাদিয়া গাঢ়, হরিজ্ঞাবর্ণের চট্‌চটিয়া আঠা স্বভাব জায় স্লেয়া নির্গমন (ক্যালী-বাই) ।

পৃষ্ঠদেশ । কোমরের পশ্চাৎভাগে প্রান্তিবোধ এবং কনকনানি (সিপিয়া) ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রান্তিবোধ এবং উহাতে কনকনানি বেষনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে সর্দি; পায় উত্তেজনাবিশিষ্ট, কঠে আরোপ্য হয় একপ এবং গণ্ডমালা জনিত ক্ষত ।

জ্বর । প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে শীতবোধ; পৃষ্ঠদেশ এবং উরু দেশেই শীত অধিক অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উরু প্রদেশে কনকনানি; বারম্বার দশকা উচ্ছ্বাস; আত্মিক-জ্বর, শিথিল অথবা অরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর অস্থখ; কামল রোগ এবং তৎপর অন্তর হ্রস্বলতা (চারনা) ।

চর্ম্ম । শিশুগণের শরীরের নানা স্থানে ছাল উঠিয়া যাইয়া লাল হয় (Infantile-Intertrigo) (গ্রাফ্, ইগনেস্, লাইকোপ); বসন্ত রোগের সমুদয় অবস্থা; মুছার তাব এবং বলকর (আন্টি-টার্ট) ।

ব্যবহার । স্লেয়া জনিত অস্থখ; কর্কট রোগ (Cancer); কোষ্ঠ-বদ্ধ এবং অজ্ঞাত বে প্রকার অস্থখের বিষয় প্রাকৃতিক লক্ষণে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতেই হাইড্রাষ্টিন ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বৃক্কে বয়সে অভ্যন্তর হ্রস্ব হইয়া পড়া (ওপিয়ার); বারম্বার হ্রস্ব হইয়া হঠাৎ অবসর হইয়া পড়া বা মুছার তাব এবং সমুদয় শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; পাকস্থলীতে যেন কিছুই নাই বা

উঠা যেন একবারে অসাধু হইরাছে একপ অস্বস্ত হই; বায়দিক অধিক আক্রান্ত হয়; শৈথিল্যিক কিল্লীর নিঃসরণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং উহা চট-চটিয়া আঠা এবং স্ত্যত্র জায় হয় (ক্যানী-বাই) ; শৈথিল্যিক কিল্লীতে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় হয় (ক্রিয়াজ্) ইত্যাদি হাইড্রাটিসের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । শৈথিল্যিক কিল্লীর উপর হাইড্রাটিসের কার্য্য পাল্‌সেটিল, ক্যানীবাইক্রমিকাম্, আয়োনিয়াম্ মিউরিয়টিকাম্ এবং আণ্টিমোনিয়ামের কার্য্যের জায় । অস্ত্রের নিরাস্ত্রের উপর ইহার কার্য্য কলিমোনিয়া, আলোজ্, সিপিয়া এবং সাল্‌ফারের জায় ; স্তনের উপর ইহার কার্য্য ফাইটোলাক্স এবং কোনারামের জায় । এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আদিনিিক, আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, মার্কিউরিয়াম্ সলিউবিলিস্, মার্কিউরিয়াম্ কেরোসাইবাসের কার্য্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । সাল্‌ফার ।

ডাইলুশন বিচার । কর্কট রোগ, শ্লেষ্মাজনিত রোগ এবং কোষ্ঠ-বন্ধের পক্ষে ১ম ডাইলুশন এবং মূল আরো ১ ফোঁটা মাত্রায় বিশেষ উপকারী । কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ৩, ৪, ১২ বা ৩০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন । পুরাতন আকারের প্রানেহ রোগ (Gleet) যাহাতে মূত্রনালী দিয়া স্ত্যত্র জায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়, মূল আরো ৫ ফোঁটা, ২ কান্দা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা প্রতি দিন প্রাতে ও বৈকালে মূত্রনালী দিয়া পিচ্কারি দিলে বিশেষ উপকার দর্শে । স্তনের গ্রন্থির ক্ষীণিতে উক্ত পরিমাণে গোশন প্রস্তুত করিয়া নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়ার খানি স্তনে বাধিয়া রাখিলে ক্ষীণি এবং প্রদাহ ২৩ দিনের মধ্যে মিলাইয়া যায় অনেক রোগীর চিকিৎসায় একপ দেখা গিয়াছে ।

## হায়োসায়েরমাস্ নাইজার,—হায়োস্

(HYOSCYAMUS NIGER,—HYOSC.)

মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের স্থানে স্থানে পাথর বিশিষ্ট পতিত ভূমিতে এই গাছ জন্মে। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারলণ্ডের পল্লিগ্রামাদির যে স্থানে ময়লাদি ফেলান হয়, সে সকল স্থানে এই গাছ জন্মে। যে প্রকার গাছ বৎসরের মধ্যে দুইবার জন্মে, সে গাছের কাঁচা পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি মধ্য নিরমে ডাইলুট্-স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক এবং কপেফিকা মজ্জার উপর, প্রধানতঃ জ্ঞান উৎপাদনের সহায়কারী স্নায়ু এবং পেশীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল, বাহ্যিক দৃশ্য উক্ত স্নায়ুর জ্ঞান উৎপাদন শক্তি এবং মানসিক বৃত্তি বিকৃত হইয়া যোগী ভ্রম এবং নানা প্রকার কাল্পনিক বিকট মূর্ত্তি বা আকারাদি দেখে, সে পাগলের ভাৱ বসড়া করে ও সকলকে নানা প্রকারের বিশিষ্ট গাণি দেয়। মস্তিষ্কের উপর যদিও ইহার কার্য অনেকটা বেলাডোনা এবং ট্রামোনিরামের ভাৱ, তথাপি উক্ত দুই ঔষধের কার্যের সঙ্গে ইহার কার্যের অনেক প্রভেদ আছে। বেলাডোনা মস্তিষ্কে ঐ প্রকার বক্তাবিকা বা বক্তাবরোধ উৎপাদন করে, হায়োসায়েরমাস্ সেরূপ করে না। আবার ট্রামোনিরামে মস্তিষ্ক বেরূপ উত্তেজিত করিয়া ঐ প্রকার উত্তেজনার অবস্থা উৎপাদন করে, হায়োসায়েরমাস্ সেরূপ করে না। হায়োসায়েরমাস্ মস্তিষ্কের কার্য সামান্য পরিমাণে উত্তেজিত করে এবং উহা বক্তাবিকা প্রদায়ী উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব হায়োসায়েরমাস্ মস্তিষ্কের উত্তেজনার একরূপ স্থানিক লক্ষণাদি উৎপাদন করে বাগা বিকার, মৌহক (Typhus) জ্বর এবং মদনোন্মত্ততাতে (Delirium Tremens) দেখিতে পাওয়া যায়। গতি উৎপাদন কার্যের সহায়কারী স্নায়ুগুণ দিয়া ইহা পেশীর উপর প্রবল ভাবে কার্য করিয়া পক্ষাঘাত, কোন কোন অংগের আকস্মিক অস্থিরতা, আকস্মিক (Convulsions), বিশেষতঃ যে সকল পেশী শোঙ্খা



পূর্বক সঞ্চালন করা যায় না (Involuntary muscles) সে সকল পেশীর পক্ষাঘাত উৎপাদন করে। যত্নবিরহে জ্ঞান উৎপাদন শক্তির অতিরিক্ত চেতনা এবং স্বাধিক উত্তেজনা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি মধ্যে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সম্পূর্ণ অচেতনতা (এইলাছ্, বেল্); কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে রোগী তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দেয় এবং উহার পরক্ষণেই আবার অচেতন হইয়া পড়ে ও প্রলাপ বলে (আর্গিকা, ব্যাপ্ট্); প্রলাপ এবং অস্থিরতা; রোগী বিছানায় থাকিতে চাহে না (আগারিকান্, এইলাছ্, বেল্); সর্বদা ভ্রম এবং কাল্পনিক মূর্তি দেখা (আনাকার্ড্, ককিউন্, ট্রায়মন্); প্রলাপ উক্তি বাহাতে রোগী তাহার কাজ কর্ত্তের বিষয় বলে (ব্রাট্); রোগী তাহার কাল্পনিক অনিষ্টের বিষয় বলে; রোগী মনে করে বেন অল্প লোকে তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বা তাহাকে হিংসী করিবে; সর্বদা অস্পষ্ট ভাবে বিভ্ বিভ্ করিয়া প্রলাপ বলা বা কথা বলা (ট্রায়মন্), অথবা হাতে হাতে রগড়াণ; প্রলাপ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দৃষ্টতঃ উষ্ণ; মুখমণ্ডল শিটা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল, যদিচ শরীর অভ্যন্ত উষ্ণ; বিছানায় কাপড় বারবার খোঁটা (ভোকান) (বেল্, ট্রায়মন্); মদোন্মত্ততা (Delirium Tremens) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী পর্যায়ক্রমে তড়িত-তড়ি সঙ্কোচন এবং প্রসারণ (Clonic spasms); আলোক এবং মনুষ্যের নিকট থাকিতে অনিচ্ছা (কার্কো-আনিমেল্, ইগ্নেনস্, নেট্টায়্-কার্ক্, ট্রায়মন্); মৈথুনের অতিরিক্ত ইচ্ছা এবং সমুদয় শরীর অনাচ্ছাদিত রাখিবার ইচ্ছা, বিশেষতঃ পুরুষাঙ্গ এবং যোনি ইত্যাদি গোপনীয় স্থান; নানা প্রকারের রক্তি বিষয়ক, অপ্রাচ্য গান করা; উন্মত্ততা এবং উহার সঙ্গে শরীর নানা-প্রকারের বিশ্রি ভাবে সঞ্চালন এবং হাসি উৎপাদক কার্য্য করা; উন্মত্ততা; রাগ; রোগকে ধমকান, সপত করা বা অস্ত্রের অনিষ্ট করা, মারা, কামড়াণ এবং অল্প লোককে কষ্ট দেওয়া, লোককে মারা, কামড়াণ এবং হত্যা করার ইচ্ছা (ট্রায়মন্); অর্ধশূন্য হাসি, অভ্যন্ত উত্তেজিত হওয়া এবং তড়ি-

ভাঙি-কথা বলা (লাক্, মাক্, ট্রামন্); ভয় বাওয়া মাজ্ই আক্ষেপ বা কন্-বান্‌সন্, (Convulsions) এবং বারবার চমকিয়া উঠা (জেল্‌স্, ওপিয়াম্, ট্রামন্); অভ্যন্তর উত্তেজিত হিংসা বা ভীষার ভাব (লাক্); প্রেমে নৈরাশ হওয়া (আরাম্, ইগ্‌নেস্, ফস্-মাস্); ভীষা, রাগ, অসংলগ্ন কথা বলা এবং আক্ষেপ; স্বয়ং শক্তির হ্রাস বা বিনাশ ।

মস্তক । নেসা করিলে বেরূপ হয়, মাথার সেরূপ গোলামেলে বোধ এবং মাথাঘোরা (ককিউলাস্, নাক্স-মক্, নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, লেডাম্); কপালে চাপিয়া ধবার জ্বার অবলম্ব্য কারক বেদনা চল্‌চলে হইলে যেরূপ হয়, মস্তিকে সেরূপ অহতুত হয় (নাক্স-মক্); মস্তিকে আলোড়নের জ্বার অহতুত হয় (চায়না, মোনয়েন্; মাথা এপাশ ওপাশ করিয়া বারবার নাড়া; নিখাস প্রেয়াসে গৌ গৌ, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া এবং হিকা; আঘাত লাগিয়া মস্তিকের কার্যাবরোধ (Concussion of the brain); মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ, অচেতনতা, অথচ রোগী প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেয়; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু লালবর্ণ এবং উজ্জল ও মুগমণ্ডল লালের আভাযুক্ত বেঙণী রঙ্গ বিশিষ্ট; প্রেয়াহ এবং তৎকরণ মস্তিকের নদীর চেউয়ের জ্বার আলোড়ন এবং টন্ টন্ করা; মস্তিকের শোথ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার আলোড়ন, হাত মুট করা এবং বৃদ্ধাঙ্গুণী হাতের পাতার তালু পানে লুড় ভাবে আকৃষ্ট হওয়া ।

চক্ষু । চক্ষু লালবর্ণ, উজ্জল এবং পানলের জ্বার স্থির ভাব বিশিষ্ট (বেল্, ক্যাছ্, ট্রামন্); টেরা চক্ষু (এপিস্); চক্ষু নিরীকোন্দের জ্বার স্থিরভাব বিশিষ্ট; চক্ষুর তারা বিস্তৃত (এইলাছ্, বেল্) এবং উহাতে স্পর্শ বা আলোক জ্ঞান থাকে না (সিকুটা, ওপিয়াম্, ট্রামন্, হেলিবোয়াস্); চক্ষে অন্ধকার দেখা; দূরের বস্তু দেখিবারে অশক্তি; দৃষ্টিহীনতা, যাহার দৃষ্টি মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানি পাটলা কাপড় দেওয়া রহিয়াছে (কটিকাম্, সাই-ক্রেমেন্, ক্রিমাছ্, ফস্, পাল্‌স্, সাল্‌ক্); চক্ষে কোন বস্তু আভাবিক আকারে দেখা যায় না, সমুদয় বস্তু যেন আগুনের জ্বার লাগ এবং আভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (নাক্স-মক্); চক্ষে যেন সকল বস্তুই আভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায় (পাটিনা); চক্ষু যেন আক্ষেপিক রূপে বুঝিয়া আইসে

বাহা কোন মতেই খোলা রাখা যায় না (জেল্‌স্) ; এক বস্ত্র ছুট্টা বলিয়া অনুভূত হয় ।

নাসিকা । ‘শ্বাস শক্তির বিনাশ (গোরিনাম্) ; নাকের মূলে হঠাৎ শ্বাস লাগার জ্বাৰ অনুভূত হয় ; নাসিকার মূলে এবং গিলার হাফে চাপিয়া ধরার জ্বাৰ চিন্‌চিনে বেদনা ।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল আরক্ত, কাল্‌টে লালবর্ণ এবং শোথের জ্বাৰ টল্‌টলে বা ক্ষীত (ব্যাণ্ট্) ; মুখমণ্ডল ফিকা বা শিটা, লালবর্ণ এবং উষ্ণ ও বিকৃত (বেল্) ; দাঁত লাগে (Lock-jaw), কিন্তু রোগী অচেতন হইয়া থাকে না (আবিদিস্, সিকুটা, ইগ্‌নেস্) ; মুখে ফোঁটা উঠা (সিকুটা) ।

মুখগহ্বর এবং গলাব মধ্য । আয়বিক ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দন্তশূল ; প্রাতঃকালে দাঁতে দগ্ধপানি, কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া কেনার জ্বাৰ বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে বাহার বৃদ্ধি হয় (সাল্‌ফ্) ; জিহ্বার পক্ষা-শ্বাত (ডাল্‌ক্, কষ্ট্, জেল্‌স্) ; কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্টানুব, অথবা গোল-মেলে রকমের কথা বলা (কষ্ট্, কোনারাম্, জেল্‌স্) ; মুখগহ্বর, জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং মুখগহ্বরের পশ্চাত্তাগে গুরু বোধ (একন্, আস্, এইলাহাস্, আই, নাক্স-মক্, পাল্‌স্) ; মুখে ফোঁটা উঠা ; জিহ্বা পরিষ্কার, গরম এবং শুষ্ক । গলার মধোর সঙ্কোচন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গিলিতে, বিশেষতঃ তরল পদার্থ গিলিতে, অশক্তি (বেল্, প্রাষাম্, ট্রান্) ; কোন দ্রব্য গিলিতে চেষ্টা করিলেই আক্ষেপের পুনরাক্রমণ হয় ।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অসিক্ত জল পান করিতে পারে না (আস্) ; জল বা জলীয় পদার্থ গিলিতে অত্যন্ত ভয় (বেল্) ; আহারের পর হিকা (বাই, ইগ্‌নেস্) ; কাঠবম্বী বা বমন (আস্, অ্যান্টি-টার্ট্, ইলিকাক্) ; স্পর্শ করিলে পাকস্থলীর মধ্যে অত্যন্ত টাটানি (ক্যালী-কার্ক্, নেট্রাম্-কার্ক্) ; হৃৎ খাইতে ভয় (বেল্, ক্যাছ্) ; আহাৰ করিলে বমন ; রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত স্নেহা বমন । নিশ্বাস টানিবার সময় নাভি প্রদেশে বাট্টিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা বা বাতনা, বমন করিলে বাহার উপশম হয় ; উদর প্রাচীরে বেদনা এবং টাটানি (ব্রাই) ; উদর ক্ষীত এবং বিকৃত এবং স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনান্বিত হয় বা টাটার (একন্, বেল্) ; ভলপেটে কর্তনবৎ বেদনা ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্ক পক্ষাঘাত ; গৃহধারের সঙ্কোচক  
বস্ত্রের পক্ষাঘাত ; রাত্রিতে অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মলত্যাগ (আর্গিকা,  
আর্স্, কার্বো-বেল্, ফস্, রাস্টক্স) ; মূত্র ত্যাগের সময় অসাড়ে বা অনিচ্ছা  
পূর্বক মল নির্গমন (এইলাছ্, মিউর-আস্) ; জলবৎ তরল, বেদনা বা বাতনা-  
হীন উদরাময় (আর্স্, চারনা, পডোক্) ; বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু  
বেগ দিলে সামান্য পরিমাণ মল নির্গত হয় ; হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ;  
আন্ত্রিক-অন্ন বা অরবিকারের ত্যাগ সময়ে এবং জ্বীলোকের স্মৃতিকাপ্তারে  
উদরাময় ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (আর্গিকা, বেল্, কঠ্, কুগ্রাশ্) ;  
বারম্বার অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ (একন্, এপিস্, ডিজিট্, হেলিবোরাস্),  
অতি কঠে, অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র ত্যাগ (আর্স্, বেল্, সিকুটা,  
ট্রাইন্) ; মূত্র ত্যাগের কোনও ইচ্ছা থাকে না ; মূত্রাবরোধ (একন্, বেল্,  
ক্যাছ্, নাক্স-বস্) ।

জননেন্দ্রিয় । পূর্বের জী সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; সর্বদা  
জীসহবাস বিষয়ে চিন্তা ; সর্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার  
ইচ্ছা । জ্বীলোকের সর্বদা পুরুষ সহবাসের ইচ্ছা এবং পুরুষ সহবাস বিষয়ে  
চিন্তা ও সর্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা ; অরাসূতে  
প্রসব বেদনার স্তায় বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরে এবং কোমরের  
শুষ্ঠাংশে বেদনা ; হিষ্টেরিয়া রোগে যেরূপ হয়, রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার  
পূর্বে সেরূপ বাতনা বা আক্ষেপ ; রজঃস্রাবের সময় হাত পায়ের পাতার  
আক্ষেপিক কম্পন ; শিরঃস্রীড়া, বমনোদ্যোগ, এবং প্রচুর ঘর্ম ; প্রচুর রজঃ-  
স্রাব ; পর্জাবহার আক্ষেপ ; সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ (Puerperal  
Convulsions) (বেল্) ; সন্তান প্রসবের পর অরাসূ হইতে রুদ্ধ (Lochia)  
নিঃসরণ বন্ধ হওয়া (একন্, সিমিসিক্) ; স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া বাওয়া (একন্,  
আগারিকান্, পাল্‌স্, রাস্টক্স) ; দুগ্ধপোষা শিশুর হিকা ।

শ্বাসযন্ত্র । রাত্রিতে শুক আক্ষেপিক কাশি, শয়ন করিলে বাহ্যিক  
রুদ্ধি হয় (কোনায়াম্, সিলিরা, সাইলিসি, সাল্‌ফ্) এবং বাহ্যিক রুদ্ধি রোগী  
উত্তীর্ণা বসিতে বাধ্য হয় এবং বসিলেই বাহ্যিক দূরীভূত হয় (পাল্‌স্) ; শুক, দুগ্ধ

খুশে কাশি, ঘাটা বায়ুনল হইতে উৎক হর বলিয়া অল্পত হর ; বায়ুনলের উপরিভাগ এবং বায়ুনলে প্রচুর প্রেয়ার সকার, ঘাহার দরুণ স্বরভঙ্গ বা স্বর মুহু হর ; বুকে আক্ষেপ এবং তন্দরুণ নিশ্বাস বহু হইয়া আইসে ও বাহার দরুণ রোগী সমুখ পানে হেলিয়া পড়িতে বাধ্য হর ; বুকের পার্শ্বে হুচী বিধানের ভাষ বেদনা ; আক্ষেপিক প্রবল কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দিনের বেলা গলা দিয়া লোন্তা স্বাদ বিশিষ্ট প্রেয়া বা থানা থানা উচ্চল লালবর্ণ রক্ত পড়া ; খাস প্রেয়াস মুহু এবং বড় বড় শব্দবৃত্ত ।

নাড়ী । নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ, কঠিন এবং প্রবল ; নাড়ী দ্রুতগামী, অসম (Intermittent), মুহুগতি বিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র, দুর্বল এবং অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট ; নাড়ী দুর্বল এবং অনিয়মিত রূপে স্পন্দন করে ; নাড়ী এত দুর্বল হর যে উহা প্রায়ই অল্পত হর না ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । কসেদকা মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Spinal Meningitis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ এবং পেশীর আক্ষেপিক কাকনি ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । হাত পায়ের কাঁশনি (ককিউল, কোনার্দ, জেলস) ; হাত এবং পায়ের পাতার বারবার স্পন্দন (বেল) ; চলিবার সময় বা উচ্চ স্থানে উঠিবার সময় পায়ের আঙ্গুল আক্ষেপিক রূপে সঙ্কচিত হর ।

নিদ্রা । অতিরিক্ত দ্রাবিক উদ্বেজনার দরুণ নিদ্রাপ্রভুতা (সিমিলিফ, ককিয়া, ওপিয়ার) ; অস্থির নিদ্রা ; তর খাইয়া বারবার চমকিয়া উঠা (আগারিকান, আন্, বেল, ব্রাই, ট্রায়ন্) ; ঘোর নিদ্রা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ ; ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা ; রাত্রিতে নিদ্রাপ্রভুতা ।

জ্বর । নাড়ী দ্রুতগামী, পূর্ণ এবং কঠিন ; সমুদ্র শরীরে শীতবোধ এবং মুখমণ্ডল উষ্ণ এবং হাত ঠাণ্ডা ; সমুদ্রার সময় সমুদ্র শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ; আঙ্গিক জ্বর বা জ্বরবিকার এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চুপে চুপে বীড় বীড় করিয়া প্রলাপ বলা ; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন ; বিছানার কাপড় তোকান (খোঁটা) ; অসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্বক মল মূত্র নির্গমন এবং পলায়ন করার ইচ্ছা (ওপিয়ার) ; কোন প্রব্রের প্রকৃত উত্তর দিয়া রোগী পুনরায় প্রলাপ

বলে এবং অচেতন হইয়া পড়ে (আর্শিকা); নিদ্রাবস্থায় হৃৎস্পন্দারক বর্ধ (চারনা, মার্ক)।

ব্যবহার । ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অস্থখ; বেলাডোনার অপব্যবহার জনিত অস্থখ; ঈর্ষা এবং অস্ত্রের প্রেমে অস্থখী হওয়ার দৰুণ অস্থখ; আক্কেপ (Convulsions), খেঁচনী, খিলখরা, মূগীরোগ, কোরিয়া (Chorea) এবং অত্যন্ত প্রকারের আক্কেপিক অস্থখ, বিশেষতঃ গর্ভবস্থায় এবং স্ততিকাগারে (আঁতুড়ে) এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের; অত্যন্ত দায়বিক উত্তেজনা; উদ্ভততা; মদনোদ্ভততা (Delirium Tremens); মোহক জ্বর, টাইফয়েড-জ্বর বা জ্বর-বিকার, সংক্রামণ রোগ; বস্তিকের শোধ; দাঁত লাগা (Lock-jaw); পক্ষাঘাত; শুষ্কহার এবং মূত্রাধারের সঙ্কোচক বস্ত্রের পক্ষাঘাত; মূত্রাবরোধ; রাত্রিতে আক্কেপিক কাশি; জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); হিকা; জীলোকের স্ততিকাগারে (আঁতুড়ে) উদরাময় ইত্যাদি রোগে হায়োনারেমাঙ্গ ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগী এবং স্তানালদিগের অস্থখে বিশেষ উপকারী (নাক্স-বম্, ট্রামন্); বস্তগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা স্তানত বড় দেখায়; আক্কেপ বা খেঁচনী এবং তদ্রূপ পরীরের সমূহর পেশী, চক্ষু, চক্ষুর পাতা এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন; মূগীর আক্রমণের পর ঘোর নিদ্রা; আক্কেপিক শুষ্ক কাশি, শয়ন করিলে বাহার উল্লেখ বা বৃদ্ধি হয় এবং বসিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয় (পাল্‌স্); সর্বদা উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ হইয়া থাকার ইচ্ছা; পেশীর অগ্রভাগের স্পন্দন (Sub sultus tendinum); ঈর্ষা এবং প্রেমে অস্থখী হওয়ার দৰুণ অস্থখ; আক্কেপের পর পক্ষাঘাত; সন্ধ্যার সময়, আহার বা পানের পর, উষ্ণ বসে, রক্তস্রাবের সময় অস্থখের বৃদ্ধি এবং মাথা চেঁচ করিয়া উপড় হইয়া থাকিলে, তামাকু পাইলে, বা কাকি পাইলে অস্থখের উপশম ইত্যাদি হায়োনারেমাঙ্গের কণ্ডকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । হায়োনারেমাঙ্গের কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা এবং ট্রামোনিয়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ বস্তিক সম্বন্ধে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে আইওনিয়া,

কুপ্রাস, ইগ্নেসিয়া, জেল্‌সিয়ারাম্, লাইকোপডিয়াম্ এবং ওপিয়ামের কার্যের সাপ্ত আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । বিনিগার (Vinegar), বেলাডোনা, ক্যান্‌ফার, নাইট্রিক অসিড্, চায়না এবং ট্রাঘোনিয়াম্ হায়োসায়েরাসের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত ।

ডাইলুশন বিচার । অত্যন্ত নারবিক উত্তেজনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ উক্তি, নিদ্রানুভূতা এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত চেতনা, দ্রাবুশূল বা দ্রাবুশূলের ভ্রাস বোধনা, বাতরোগ, আক্কেপিক হাঁপানিকাশি, শরীরের নানা অংশের আক্কেপিক সঙ্কোচন, মস্তিষ্কাবরকবিরী প্রদাহ, ধনুষ্ঠকার এবং আক্কেপিক নারবিক কাশিতে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার্য । ঘোর অচেতনতা (Coma), সংজ্ঞাশ যোগ, আক্কেপ, পক্ষাঘাত এবং উদরাময়ের পক্ষে ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন উপকারী । মহাত্মা হানিমান এই ঔষধের ১২ ডাইলুশন ব্যবহার করিতেন । তৎপর উহার শিষ্যবর্গ ১ম হইতে চতুর্থ দশমিক ডাইলুশন পর্য্যন্ত সচরাচর ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন । ৩য়, ৬ষ্ঠ এবং ৩০ ডাইলুশনই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যথোচিত ফল পাইয়া থাকি ।

## আইরিস্ বাসিকালার,—আইরিস্

(IRIS VERSICOLOR, -- IRIS VERS).

আমেরিকার ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের কান্নাল ভোবদার ধারে এই পাছ জন্মে । ইউরোপের অনেক স্থানে বাগানাদিতে ইহা আপনা আপনিও জন্মিয়া থাকে । ইহার মূল বা শিকড় ডাইলুট্ স্পিরিটে ভিজাইয়া যথা নিয়মে ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার গুঁড়োও প্রস্তুত হইয়া থাকে । গুঁড়াকে আইরিসিন্ (Irisin) বলে ।

সাধারণ ক্রিয়া । গ্রহি, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শৈল্পিক কিল্লীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল । ইহা উহার অতিরিক্ত সাকল্য উৎপাদন

করিয়া উহার নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং উহাকে উগ্র করিয়া থাকে। প্যানক্রিয়াসের (Pancreas) উপর ইহার বিশেষ প্রভাব নির্দিষ্ট কার্য আছে বলিয়া অনুমিত। ইহা ত্রণ বা কোকার ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কড়ী উৎপাদন করে। পাকস্থলী এবং বকৃতের অম্লত্ব হেতু বমন সম্বলিত শিরঃস্রোতা উৎপাদন করা এই ঔষধের একটি বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি বোধে পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । নিরাশার ভাব, মানসিক অবসন্নতা এবং সামান্য কারণেই বিরক্ত হওয়ার স্বভাব (পাল্‌স)।

মস্তক । কপালের ডাইন পার্শ্ব দণ্ডপানি বা পোঁচা বিধার ভ্রায় অম্লভূত হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ; মাথার সমুখ ভাগে ভারি বোধ এবং ঘৃণা, ঘৃণে বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেষণ (বিরেট-বিরাইড); কপালের দুই পার্শ্ব, বিশেষতঃ ডাইন পার্শ্ব, পোঁচা বিধার ভ্রায় বেদনা এবং উহাও সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরে বাটিয়া ধরার ভ্রায় অম্লভূত হওয়া; মাথার উপর কোকার ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুস্কড়ী (গ্রাক্, মালক্)।

নাসিকা । অনবরত হাঁচি দেওয়া (একন্, ক্লেপ্‌স্, নাসুনেরিয়া)।

মুখমণ্ডল । চক্ষুর কোটরের উপরি এবং নিম্নভাগ স্থিত এবং হরাস্থির উপরিভাগের ত্রায়শূল (চায়না, স্পাইজেল্); দাঁতের নিম্নভাগস্থিত ত্রায়শূল বাহা প্রতি দিন প্রাতঃকালে প্রথম আহারের পর আরম্ভ ॥ এবং বাহা অনেককণ ব্যাপিয়া থাকে ও যাহার সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন বা বধিরকারক শিরঃস্রোতা বর্তমান থাকে; মুখমণ্ডল, নাকের চতুর্দিক, ওষ্ঠ এবং গালে কোকার ভ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রণ এবং উহা হইতে রক্ত মিশ্রিত তরল জালা উৎপাদক কল্তানি নির্গত হওয়া (গ্রাক্)।

মুখগহ্বর । পুষ্টিয়া গেলে বা ছাল উঠিয়া গেলে বেঙ্গন হয়, মুখগহ্বর এবং লিহবার লেবণ বাতনা অম্লভূত হয় (ইঙ্গুগাস্, এপিগ্‌স্, প্রাটিনা, পাল্‌স্, সিপিয়া, কাইসট্); গালের দৈর্ঘ্যিক বিন্দীতে কত (নাইট্রিক্-অ্যাস্); মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া (চায়না, আয়োড্, ক্যালী-আয়োড্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্)।



পাকস্থলী এবং উদর । ক্ষুধা বা কচি থাকে না (আস্, চরনা, নেট্রাম-মিউর) ; উদরারে গলা দিরা স্বাদশূন্য দূষিত বায়ু নিঃসরণ ; বমনো-বেগ এবং অত্যন্ত টক স্বাদ বিশিষ্ট তরল পদার্থ বমন ; উদরস্থ আহার প্রবাদি বমন ; পিত্ত বমন (গ্রাটিওলা, নাজ্-বন্, পজোক্) ; শিশুগণের উদরস্থ টক দুগ্ধ বমন (এথুগা) ; উদরোচ্চ প্রদেশে অত্যন্ত জ্বালা এবং তরুণ অত্যন্ত বাতনা (ইক্সোস্, আস্, ক্যাস্, কস্, বিরেট-আব্) । জ্বরের মধ্যে কামড়ানীর জ্বায় বেদনা বা বাতনা (ব্রাই, মার্ক্, চেলিডন্, হাইড্রাট্) ; উদরে বেদনা, দূষিত বায়ু নিঃসরণে বাহার উপশম হয় (কলোস্) ; উদরে শূল বেদনার জ্বায় বেদনা, বাহার নরুণ উপশম পাওয়ার আশায় রোগী সমুখ পানে বাকিয়া পড়িতে বাধা হয় (আলোজ্, কষ্ট্, কলোস্) ।

মল এবং মলদ্বার । মল অলবৎ তরল, নরম ; হরিজাবর্ণের মল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হয়, কিন্তু উদরে বেদনা থাকে না ; বেদনা বা বাতনাত্মক মল ভেদ ; আমরস্ক ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোঁথপাড়া ; আগুনে পুড়িলে বেরুণ হয়, মল ত্যাগের পর শুষ্কভাবে সেরূপ জ্বালাহুতব (আস্, ক্যাস্) ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । ডাইন বন্ধে কসিরা ধরার জ্বায় প্রবল বেদনা, নড়াচড়াতে, বিশেষতঃ বাহু উর্দ্ধমিকে উঠাইলে বাহার বৃদ্ধি হয় ; হাতের পাতার অস্থির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে খোঁচা বিঁধার জ্বায় প্রবল বেদনা । কুঁচ্কি বাত ; কুঁচ্কি হইতে নিম্ন দিকে উরুদেশের সমুদয় স্থানে বেদনা বাহা হাঁটুর পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

চর্ম্ম । গায় কোষ্ঠার জ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লণ, মাথার উপর এবং মুখমণ্ডলে বাহা অধিক হয় (ক্রেটন্, ক্রিমাজ্ গ্রাফ্) ।

জ্বর । শরীর উষ্ণ হইয়া শীত অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হাত পায়ের পাতা শীতল হয় ; সমুদয় শরীরে ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ কুঁচ্কি প্রদেশে ।

ব্যবহার । পাকস্থলী এবং বহুতের কার্যের বৈলক্ষণ্য হেতু অল্প ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ওলাউঠা, উদরাময় ; রক্তামাশয় ; বমন সবলিত শিরঃপীড়া ; শ্বাস্-শূল ; সর্দি ; পিত্তজ্বর ; বিকট (Eczema) ; হৃৎ শোথ্য শিতর দুগ্ধাদিতে দুগ্ধজী (Milk-Crust) ইত্যাদি অল্পে আইরিস্ বার্নিকালার ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । সন্ধ্যার সময় এবং রাত্রিতে ; বিশ্রামে এবং নড়াচড়াতে অস্থখাদির বৃদ্ধি ; ক্রমাগত নড়াচড়াতে রোগের উপশম ইত্যাদি আইরিসের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগ্ৰণ বিশিষ্ট ঔষধ । আইরিসের কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ টাৰ্টারিকাম্, কল্‌চিকাম্, আয়োডিয়াম্, ইপিকাকিউএনা, মার্কিউ-রিয়াম্ এবং পডোফিলামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্, আর্সিনিক, পাল্‌মেটিকা এবং বিরেটাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । নাক্‌ বমিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্যারিস নগরস্থ ডাক্তার ক্লড্ (Dr. Claude) ১২ হইতে ৩০ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ বদ্ধে বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন । তিনি বলেন যে উহা অপেক্ষা নিম্ন ক্রম ব্যবহারে কোষ্ঠ বদ্ধে কোনও ফল পাওয়া যায় না ।

## মেজিরিয়াম্,—মেজির

(MEZEREUM,—MEZ.)

ইউরোপের প্রায় সমুদয় পার্শ্বাঙ্গীৰ জঙ্গলা জমীতে এই গাছ জন্মিয়া থাকে । ইহার বাকল যথা নিম্নে প্রক্‌ স্পিরিটে ডিজাইয়া ইহার মূল আয়োক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । চৰ্ম এবং আত্মার বহা নালী (Alimentary (anal), জননেত্রিক ও মূত্রবহের নৈস্মিক কিলীর উপর ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার দক্ষণ চৰ্ম এবং উক্ত নৈস্মিক কিলীগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হয় এবং গায় কুকড়ী বাহির হয় । পারার (Mercury) অপব্যবহার, পরমীর ব্যারামের দক্ষণ বেক্ষণ হয়, অস্থি এবং উহার আবরণ কণ্টিন পর্দার (Periostem) উপর এই ঔষধ সেরূপ কার্য করিয়া পারার অপব্যবহার এবং পরমীর ব্যারামের জায় অন্তঃস্থ লক্ষণাদি উৎপাদন করে ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । সর্বদা আপন রোগ বিষয়ে ছদ্ম্ভিতা এবং নিরাশার ভাব (নেট্রাম্-কার্ক, নার্স-বন্) ; সর্বদা কীটবীর ইচ্ছা (নেট্রাম্-মিউর, পাল্‌স্, ইগ্নেস) ; সামাজ্য কারণেই বিরক্ত এবং রাগাধিত হওয়া (বাই, ক্যাম্) ; মানসিক চিমাবোধ এবং উন্নততা ; চিন্তা করিতে অত্যন্ত কষ্টান্বিত ; কোন বিষয় স্মরণ করিতে অশক্তি (নেট্রাম্-মিউর) ।

মস্তক । নেসা করিলে বেক্রপ হয়, মাথার সেরূপ চিমাবোধ (ককি-উল্, নার্স-মন্, পাল্‌স্) ; মাথার হাড়ে বেদনা, স্পর্শনে বাহার বৃদ্ধি হয় ; পার্শ্বীয়ক পরিশ্রম বা অনেক কথা বলিলে মাথা এবং কপালের চুই পার্শ্বে কন্কনানি ; প্রবল শিবঃপীড়া ; সামাজ্য স্পর্শনে বা বিরক্ত হইলে মাথা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় ; নাকের গোড়া হইতে কপাল পর্যন্ত চাপিয়া ধরার ভায় প্রবল বেদনা (ক্যালী-বাই) ; কপালের বাম পার্শ্বে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা বাহা মধ্যদেশ হইতে বহির্দেশে বিস্তৃত হয় ; মাথার পশ্চাত্তাগের হাড়ে ছিন্ন করার ভায় বেদনা ; মাথা চামড়ার ভায় চুম্বিত (খোসা) দ্বারা আবৃত, বাহার নীচে পূঁথ সঞ্চিত হইয়া চুল জড়াইয়া বার (জাক্, সোরিনাশ) ; আধার উঁচু, চাখড়ির ভায় দানী, ছানার জলের ভায় ছেকড়া ছেকড়া পর্দার ভায় পদার্থ ও পূঁথযুক্ত পাতড়া, বাহার মধ্যে কীটের ভিম দেখিতে পাওয়া যায় ; মাথার মরা চর্ম এবং খুস্কি (ব্যভারাগা, ক্যাহ্) ।

চক্ষু । চক্ষু গরম এবং প্রদাহযুক্ত ; চক্ষুর বোলক কিল্লী মলিন লাল বর্ণ ; চক্ষে চাপিয়া ধরার ভায় বেদনা এবং শুকাহুত্ব ; বাম চক্ষুর উপরের পাতার পেশীর অনিবার্য স্পন্দন ; চক্ষু দ্বারা জল পড়া এবং চক্ষে জ্বালা এবং চিড়িকমারী (অস্, ইউক্রেস) ; সর্বদা চক্ষু টিপনের ইচ্ছা (জোকাশ্, ইউ. ফ্রেস) এবং চক্ষু বুজিয়া থাকার ইচ্ছা (কট্, জেল্‌স্) ; চক্ষুর পাতার প্রান্ত এবং নাকের নিকটবর্তী চক্ষুর পাতার চর্ম চুলকাই ।

কর্ণ । ডাইন কানের বহির্দেশ যেন ফাঁত এবং বিস্তৃত হইতেছে এক্রূপ অস্থিত হয় এবং তৎপর বাম কানে এক্রূপ অস্থিত হয় ।

নাসিকা । নাক দ্বারা হরিজ্রা বর্ণের পাতলা এবং কখন কখন রক্ত-মিশ্রিত স্লেমা নির্গত হয়, বাহার স্রবণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হয় এবং উহা টাটায় ;

নাকের পাতায় আলাহুতব এবং কত হওয়ার জার টাটানি; নাকের মধ্যে শুকানুতব এবং ঝাণ শক্তির হ্রাস; বারবার ইঁচি দেওয়া এবং নাক দ্বারা প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্রোতা নির্গমন।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডলে ছিঁড়িয়া ফেলার জার প্রবল বেদনা; বিশেষতঃ বাম পাশে; কর্ণের সম্মুখভাগে অবসর বা ত্তকিত্তকারী ঝিল ধরার জার বেদনা; ডাইন গালের পেশীতে বারবার ধাক্কা লাগার জার অমুক্ত হওয়া এবং উহার স্পন্দন; ওষ্ঠ শুক এবং ক্ষীণ; ওষ্ঠের বহির্দেহ আইসের জার অমুক্ত হয়; ওষ্ঠ বেদনায়ুক্ত এবং উহাতে কত হওয়ার জার আলা এবং টাটানি (আর্স); মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত এবং লালবর্ণ ও উহাতে কলতানি-বিশিষ্ট কুহুড়ী; রোগী (শিশু) চুলকাইতে চুলকাইতে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে; রক্তিতে চুলকানির বৃদ্ধি (মার্ক); চুমটী (খোশা) ছিঁড়িয়া কেলিলে উহার নীচে চর্কির জার পদার্থ বিশিষ্ট কুহুড়ী দেখিতে পাওয়া যায়; কুহুড়ীর কলতানি মুহু স্থানে লাগিলে কত হয়।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । পোকা থেকো (Carious) দাঁতে বেদনা (মার্ক); দাঁতের গোড়ায় ছিদ্র করার জার বেদনা বাহা বাড়ির হাড়, গালের মেলার অস্থি (Malar-bone) এবং কপালের হুই পাশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; দাঁত ভোঁতা এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা বলিয়া অমুক্ত হয়; জিহ্বা এবং মুখগহ্বরে প্রবল আলাহুতব বাহা শাকহলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় (আর্স, ক্যাছ, ক্যান্স)। গলার মধ্য, আহািবহা গলনালী এবং উহার উপরিভাগের হুই পাশে আলাহুতব (আর্স, ক্যাছ, ক্যান্স, মার্ক-কর); মনে হয় যেন গলার মধ্য স্রোতা দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে শুকানুতব, উক এবং টাটিয়া ফেলা বা ভাল উঠিয়া যাওয়ার জার অমুক্ত হয় (আর্জেন্ট-নাইট্রিক, আর্জেন্ট-মেট, এরাম, নাক্স-বক)।

পাকস্থলী এবং উদর । অত্যন্ত ক্ষুধা, অথবা ক্ষুধা একবারেই না থাকে; বারবার শ্বাসশূন্য কাঠ উদগার উঠা; গলার মধ্য হইতে যেন বমনোবেগ হয়; তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট পদার্থ বমন; পাকস্থলীতে আলাহুতব (আর্স, ক্যান্সার, ক্যাছ, লোবিলিয়া)। স্রীধা প্রদেশে বৃণবৃশ্বে বেদনা; তলপেটের বাম পাশে সচী বিধানের জার অমুক্ত হয়; উদরে অন্তরিক্ত

পরিমাণে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হইয়া গড়্‌গড়, কলকল শব্দ হওয়া; শুষ্কতার দিয়া প্রচুর দূষিত বায়ু নিঃসরণ (আলোজ্, ব্রাই, গ্রাক্); উদরে আলা এবং উকাহুতব (একন্, আস্, ক্যাহ্) ।

মল এবং মলদ্বার । শুষ্কতার মধ্যে স্থী বিধানের জ্বা অম্লভূত হয়; চলিবার সময় শুষ্কভাবে কামড়ানীর জ্বা আলা এবং শুষ্কতার মধ্যে আলাহুতব; শুষ্কতারে চুলকানি (আগাম্, ক্যাক্-কার্, ব্রাই, নাক্স-বন্, ওপিয়াম্, সাল্‌ফ্); মল নরম, কটাবর্ণ, পচা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দানার জ্বা পদার্থ মিশ্রিত থাকে ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রভ্যাগের সময় মূত্র নির্গত না হইয়া রক্ত নির্গত হয় (আস্, ক্যাহ্, হামামেলিস্); মূত্র উষ্ণ এবং উহাতে লালচে ভগ্নানি পড়ে (বেল্, জিরাঙ্ক) ।

জননেদ্রিয় । পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাধার চুলকানি (সাল্‌ফ্); পুরুষাঙ্গে উকাহুতব এবং উহার ক্ষীতি; পুরুষাঙ্গ এবং পুরুষাঙ্গের মাধার আগাতে তীক্ষ্ণ কাঁটা বিধানের জ্বা অম্লভূত হওয়া; অণ্ডকোষ এবং অণ্ডকোষাধারের ক্ষীতি । জ্বীলোকের নিরমিত সময়ের অনেক পূর্বে, প্রচুর পরিমাণে এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া রক্তঃপ্রাব; ডিম্বের লালের জ্বা বেত প্রদর নিঃসরণ (আমন্-মিউর, ক্যাক্-ফন্, বোরাক্স্, বোবিষ্টা) ।

শ্বাস যন্ত্র । স্বরভঙ্গ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও বুকের মধ্যে ছাল উঠিয়া যাওয়ার জ্বা অম্লভূত হয় (কট্, নাক্স-মফ্, কন্); আহ্বারের পর কাশিতে কাশিতে বমন এবং যে পর্য্যন্ত বমন না হয় সে পর্য্যন্ত কাশি থামে না; বমন করিয়া থাকিলে প্রবল কাশি (কোনারাম্, পাল্‌স্); বায়ুনলের নিরভাগে হৃৎস্পন্দী বা খুশ্‌খুশির রক্তঃপ্রাব কাশির প্রবল ইচ্ছা; কাশিলে গলা দিয়া কোন পদার্থই নির্গত হয় না । বুকের মধ্য দিয়া আড়াআড়ি আঁটাবোধ এবং সঙ্কোচন; বুকের মধ্যে স্থী বিধানের জ্বা অম্লভূত হয় (ব্রাই, ক্যানী-কার্) ।

নাড়ী । নাড়ীভঙ্গ (Intermittent) (কোনারাম্, ডিজিট্, নেট্রাম্-মিউর), পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন বা য ১ এবং কঠিন ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার বহির্দেশের পেণী শক্ত হওয়ার

দক্ষণ ঘাড় সকালনে অভ্যন্ত বেদনানুভব; স্বক্কের পেশীতে বাতের স্তায় বেদনা; উরু পেশীগুলি ক্ষীত এবং বিস্তৃত বা কসিয়া ধরায় স্তায় অচ্ছভূত হওয়ার দরুণ উহা সকালনে অশক্তি ।

**অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি ।** অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন (ককিউল, কোনায়াম্, জেলুম্) ; নখা অস্থি, বিশেষতঃ পারের টিবিয়া (Tibia) নামক অস্থির আবরক পর্দার (Periosteum) বেদনা, রাত্রিতে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; উহাতে সামান্য চাপ বা স্পর্শও সহ হয় না; আর্জ বা শেথশেথিয়া বায়ুতে বেদনামির বৃদ্ধি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গরমীর ব্যাধির জনিত বেদনা (মার্ক্); ডাইন স্বক্কের সন্ধিতে বেদনা; আঙ্গুলের অগ্রভাগে যেন কোন শক্তি থাকে না, যাহার দরুণ কোন বস্তু ধরিতে পারা যায় না। কুঁচকি বা উরু এবং হাঁটুর সন্ধিতে ঝাকনির স্তায় যাতনা; উরু এবং পারের হাঁড়ে বেদনা; পারের পাতার হাঁড়ে প্রবল বেদনা ।

**চর্ম্ম ।** বহুতের অস্থখ জনিত বৃক এবং বাহুতে দাগ গুলি কাল হয় এবং উহা হইতে ছাল উঠে; গায় লাল কুসুড়ী যাহা অত্যন্ত চুলকাই, বিছানার এবং স্পর্শনে যাহার বৃদ্ধি হয়; কুসুড়ীতে জ্বালা এবং চুলকাইলে কুসুড়ী অভ্যাহানে সরিয়া পড়ে (আলাম্, মার্ক্, সাল্ফ্); শরীরের যে যে স্থান হাড়ের দরুণ উঁচু চইয়া থাকে, সে সকল স্থানে ক্ষত হয়; ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে (আলাকিউতা, হিপ্-সাল্ফ্), রাত্রিতে অত্যন্ত বেদনানুভব হয় এবং টাটার (মার্ক্); পুরু লামার আভ্যন্তরীণ হরিদ্রাবর্ণের পাঁচড়া, লামার নীচে গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের পূর্ব জন্মায়; ক্ষতের চতুর্দিকে জাগানুভব চুলকানি বিশিষ্ট কোম্বার স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুড়ী (হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্); গায়ের স্থানে স্থানে উঁচু সাদা পাঁচড়া ।

**নিদ্রা ।** নিদ্রার অনিবার্ণ ইচ্ছা (অস্টি-টার্ট্, এলিস্, নাক্স-মফ্) ।

**স্বপ্ন ।** সমুদয় শরীরেই অনবরত নীতবোধ; নীতবোধ, অথচ কোন প্রকারের উত্তাপ গায় লাগানের ইচ্ছা থাকে না, অথবা বহির্বাযু গায় লাগারও ভয় থাকে না; অত্যন্ত পিপাসা; অর এবং শরীর অত্যন্ত উষ্ণ ।

**ব্যবহার ।** পারার (Mercury) ব্যবহার জনিত অস্থখ; অস্থি এবং উহার আবরক পর্দার (Periosteum) অস্থখ; গড়মালা জনিত অস্থখ;

গরমীর ব্যারাম জনিত অম্বুধ; শ্বেত প্রদর; প্রমেহ রোগ, ফোঁকাব ভায় এবং হামের ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুড়ী; ক্ষত; মায়ুল্ল; বিসর্প (Erysipelas); বাতরোগ; দন্তশূল; পারার অপব্যবহার বা গরমীর ব্যারাম জনিত অম্বি-পোকায় ধম্মা (Caries) ইত্যাদি অম্বুধে মেজিরিয়াম্ ব্যবহার্য্য।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** শরীরে অত্যন্ত পাতলা বোধ হয় (আসেরাম্); শরীরের স্থানে স্থানে উষ্ণ বোধ এবং ঝাঁকনী ও স্থলী বিধানের ভায় গাভনা; সমুদয় সন্ধিতে খেঁতলিয়া যাওয়ার ভায় বেদনা এবং শ্রান্তি বা অবশ বোধ; সমুদয় শরীরে অনবরত শীতবোধ; ঠাণ্ডা বাতাস একবারেই সহ্য হয় না; শরীরের এক পার্শ্বই সচরাচর অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে; সন্ধ্যার সময়, রাত্রিতে, স্পর্শনে বা আঘাত লাগিলে, নড়া চড়াতে, শেত্শেতিয়া বাতাসে অম্বুধের বৃদ্ধি এবং বহির্বাযুতে চলিয়া বেড়াইলে, মাথা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে এবং অন্ধকাব ঘরে অম্বুধের উপশম ইত্যাদি মেজিরিয়ামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

**সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ ।** আনাকাডিভাম্, গোয়েকাম্, ফাইটোলাকা এবং রাস্টুল্লের কার্য্যের সঙ্গে মেজিরিয়ামের কার্য্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্য্যের সঙ্গে বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাকেরিয়া-কার্ক, ইগ্নেসিয়া, লাইকোপডিয়াম্, মার্কিউ-রিয়াম্, নাইট্রিক্ আসিড্, নাক্স-বমিকা, কক্ষরাস্, পাল্‌মেটোলা, সিপিরা এবং সালফারের কার্য্যের সাদৃশ্য আছে।

**প্রতিষেধক ঔষধ ।** আসিটিক্ আসিড্, ব্রাইওনিয়া, ক্যাকেরিয়া কার্ক, ক্যান্ফার, নাক্স-বমিকা, মার্কিউরিয়াম্, রাস্টুল্ল্ ইত্যাদি মেজিরি-য়ামের প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

**ডাইলুশন বিচার ।** ১ম, ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চিকিৎসক ১০০ এবং ২০০ ডাইলুশনও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

## (নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্,—নেট্রাম্-মিউর) ।

(NATRUM MURIATICUM,—NATR. MUR.)

কোন এক বিশ্বস্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে পরিকৃত আদৃত নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ (পরিকৃত লবণ) ক্রয় করিয়া যথা নিয়মে উহাতে অঙ্গার অব্ মিঙ্ মিশাইয়া ১ম হইতে ৩য় শতভাগিক ক্রম পর্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ৩য় শতভাগিক ক্রমের গুঁড়া হইতে যথা নিয়মে ৪র্থ শতভাগিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। চূয়ান জলে যথা নিয়মে ইহার প্রথম দশমিক ক্রমের আরোকও প্রস্তুত হইতে পারে। ২০° ডিগ্রী ওয়ার এক্ স্পিরিটে যথা নিয়মে ইহার ১ম শতভাগিক বা ২য় দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৩য় এবং ততোধিক দশমিক ক্রমের আরোক যথা নিয়মে রেক্টিফাইড্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। রক্ত, লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি (Lymphatic glands) পরিণাক কার্য সম্বন্ধীয় বস্তুর যোজক শৈল্পিক বিস্তী এবং যুক্ত ও সীহার উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। ইহা রক্তকে বিকৃত করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যদি উত্তেজনা অধিক হয়, তবে উক্ত উত্তেজনা প্রবাহে পরিণত হইয়া ফার্কির ভায় (Scorbutic) আকার ধারণ করে এবং তদরূপ চর্মে অনেক প্রকারের ক্ষত এবং ফুস্ফুড়ী প্রকাশ পায়, শৈল্পিক বিস্তী এবং গ্রন্থিতে ধ্বংস-কারক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া ফার্কির ভায় রোগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেক কাল ব্যাপিয়া সবিরাম বা পালাজর থাকিলে বেতন হয়, শরীরের সেকশন অবস্থা উৎপাদন করা লবণের এক বিশেষ প্রাকৃতিক গুণ বা শক্তি বোধে পরিগণিত। এই জন্তই পুরাতন আকারের সবিরাম বা পালাজরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। সর্পনা বিষণ্ণ এবং নিস্তব্ধতা; দুঃখিত থাকা এবং কান্না (নাক্-ধক্, পাল্-স্, ইগ্-নেস্, রাস্-টক্), সাধনা বা প্রবোধ বাক্যে বাহ্যিক হইয়া; অত্যন্ত খিট্-খিট্ বা চিড়্-চিড়্ করা এবং সামান্য কারণেই রাগাধিত হওয়া (রাট্, কাম্, নাক্-বম্); কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে



কষ্টানুভব ; অন্তমনকতা ; সরণ শক্তির দুর্বলতা বা হ্রাস (আগ্‌নান্, আদ্রা-  
আনাকার্ড্, ক্রিফাজ্, ল্যাক্, মার্ক্, নাক্স-মক্, কস্-আস্) ; সহজেই বারবার  
চমকিয়া উঠার স্বভাব (কোনারাম্, ইপ্‌নেস্) ।

মস্তক । বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথাঘোরা (ক্যালী-ব্রাই) ;  
মাথার খালি বোধ (ককিউল্, কোরেলিয়াম্, সিপিরা) ; মাথাঘোরা এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চিমাবোধ এবং চক্ষুর সম্মুখে পানীর ডানা কাড়ার  
জ্ঞান ধড়্‌কড়্‌ করা (বেল্) ; মাথার ভারি এবং চিমাবোধ (ক্যাপ্স্, চারনা) ;  
মাথা ধরা, বাহার নরুণ বস্তু হইয়া যেন মাথা কাটিয়া যাইবে (ব্রাই, মার্ক্,  
পাল্‌স্) ; প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই মাথা ধরে (ক্যালী-ব্রাই, নাইট্রিক্-  
আস্, নাক্স-বম্) বাহা বেলা হুই প্রহর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে ; হাঁচিলে বা  
কাশিলে মাথা ধরা, চাপিলে বাহা থাকে না ; মাথার চাপিয়া ধরার জ্ঞান  
অবসরকারক মুগ্ধবশে বেদনা ; মাথার দপ্‌দপানি বা স্ফুটী বিধানের জ্ঞান  
অনুভূত হয় বাহা ঐীবা বা বুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; মাথার উষ্ণানুভব এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল লালবর্ণ, বমনোদ্বগ এবং বমন ; কপালে উজ্জ্বল  
চক্ষের উপরিভাগে চাপিয়া ধরার জ্ঞান প্রবল বেদনা ; মাথার চুল পড়িয়া  
যায় (গ্রাক্, মার্ক্, নাইট্রিক্-আস্, পিট্রোল্, কস্, সিপিরা, সাল্‌ক্) ;  
মাথা অভ্যন্ত টাটায় (চায়না, নাইট্রিক্-আস্, মার্ক্, মেজিরিয়াম্) ; ঘাড়ের  
যে অংশ পর্য্যন্ত চুল থাকে, সে অংশ পর্য্যন্ত চুলকানি বিশিষ্ট ক্ষুদ্রী ; কপালে  
দপ্‌দপিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বগ বা বমন, বাহা প্রাতঃ-  
কালে বৃদ্ধি হয় এবং শয়ন করিয়া থাকিলে বাহার উপশম হয় ; মাথার ঠিক  
উপরিভাগে জ্বালানুভব (সাল্‌ক্) ; জ্বীলোকের রজঃস্রাবের সময় কোন এক  
নির্দিষ্ট সময়ে (Periodical) মাথা ধরা ।

চক্ষু । কুয়াশা বা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া তাকাইলে ক্ষেপ  
হয়, চক্ষে সেরূপ কাপা দেখা (কষ্ট্, ক্রোকাশ্, পিট্রোল্, কস্, সাল্‌ক্,  
সাইলিসি) ; বস্তুগুলি কাপা দেখায় ; পুস্তকের অক্ষর গুলি অভ্যন্ত কাপা  
দেখায় (সাইলিসি) ; সর্বদা যেন চক্ষুর সম্মুখে আঙুরের কণা ভাসে (সাই-  
ক্রেমেন্, মার্ক্, সাল্‌ক্) ; দেখিতে দেখিতে চক্ষু যেন অন্ধকার হইয়া আইসে  
(কস্, রুটা, সিপিরা) ; চক্ষু প্রদাহযুক্ত, লালবর্ণ এবং চক্ষু দিয়া জল পড়া

(একন্, বেল); কোন বস্তুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইলে চক্ষে চাপাবোধ; বাণি প্রবেশ করিলে ঘেৰুণ হয়, চক্ষে সেক্ষণ অস্থিত হয় (আর্স, কষ্ট, ইণ্‌নেস্, সাল্‌ক); চক্ষে অলান্‌ভব এবং চিড়িক মারা (নার্‌-বম); চক্ষে আলোক সহ হয় না; চক্ষুর পাতার প্রান্ত লালবর্ণ, প্রদাহযুক্ত এবং অগায়ুক্ত; প্রাতঃ-কালে চক্ষুর পাতার পাতার লাগিয়া থাকে (আলাম্, গ্রীক্, লাইকোপ্, পালম্, সাল্‌ক); চক্ষুর মধ্যে বেদনা এবং অলা; চক্ষুর সকালনের সময় চক্ষুর পাতার পেশীর কঠিনতা বাহা অনেক সময় সার্কাস্টিক পেশীর দুর্বলতা বা কমেস্‌কার উত্তেজনার দৰুণ বটিয়া থাকে; দৃষ্টিহীনতা এবং অন্ধতা (Amblyopia and Amaurosis); বৃত্তিকাপা তুরাগাজাত ক্রীলোকের রজঃপ্রাবেশ-বৈলক্ষ্য হেতু চক্ষুর ভাবা সমুচিত হওয়া; চক্ষুর পাতার প্রদাহ (Blepharitis); কর্ণিয়ার ক্ষত (Ulceration of the Cornea); চক্ষে অলা এবং চিড়িক মারা; চক্ষু দিয়া উগ্র ক্ষতকারক জল পড়া; চক্ষে আলোক সহ না হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর পাতা আক্ষেপিকপে বদ্ধ হইয়া আইনা; চক্ষুর পাতার দ্রাবুশূল, স্থবী উদয়ে বাহার উদ্বেক হয় এবং স্থবীতে বাহা দ্রবীভূত হয়; চক্ষুর অলোংপাদক বা জল নিঃসারক নালীর সঙ্কোচন; নেত্র-নালী এবং চক্ষু দিয়া প্রচুর স্রোতা বা পুঁথের ন্যায় রোদ (কেতুর) নিঃসরণ; লুনার কষ্টিক (Lunar Caustic) দ্বারা কুচিকিৎসা জনিত চক্ষু দিয়া অলা উৎপাদক, ক্ষতকারক জল নিঃসরণ।

**কর্ণ ।** কর্ণ শূল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানের মধ্যে স্থচী বিধানের ন্যায় অস্থিত হয় (ক্যাস্, চারনা); কানের মধ্যে গানেক ন্যায় শব্দ হওয়া এবং টন্টনানি; কানের মধ্যে টন্টন্, গুন্‌গুন্, অথবা বজ্‌বজ্ শব্দ হওয়া (চারনা); কানে কম শুনা; কান দিয়া পুঁথ পড়া (গ্রীক্, হিপ্-সাল্‌ক্, মাক্)।

**নাসিকা ।** নাকের বায়ু অংশের প্রদাহ এবং ক্ষীতি, স্পর্শনে বাহা অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয়; সাধাজ কারণেই সর্দি লাগে; নাকের হাতে ছিঁড় করার দ্বায় বেদনা; তরল সর্দি এবং নাক দিয়া প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল স্রোতা নির্গমন অথবা নাক শুক এবং বদ্ধ হইয়া থাকে; বায়বীয় হাঁচি হওয়া; তরল সর্দি এবং তদ্রূপ ঘ্রাণ শক্তি বা হানি থাকে না।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ (চেমিডন্, হিপ্পালক্, সিপিরা) ; ঐতল মাথাইলে যেক্রপ হয়, মুখমণ্ডল সেক্রপ টল্‌টলে বা চক্‌চকে হয় ; বাম গাল আলবর্ণ ; ওষ্ঠ-উক ও তর্ক, বা কণ্টাবুক্ষ ; উপরের ওষ্ঠ ক্ষীত (ক্যাক্-কার্ক) ; গোঁপ (মোছ) পড়িয়া যায় ; ওষ্ঠের চতুর্দিকে টেটোরের (Tetter) ভায় কুক্কড়ী বাহির হয় (আণ্টি-কুড, লাইকোপ্) ; কোন নির্দিষ্ট সময়ে মুখমণ্ডলে বেদনা বা স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ সবিরাম বা পালাজ্বর বন্ধ হওয়ার পর ; মুখমণ্ডল রক্তশূল ; অত্যন্ত পিপাসা ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** মাড়ি ক্ষীত হয় এবং উহা হঠাৎ সহজে রক্ত পড়ে (কার্কো বেজ, মার্ক, কস, নাইট্‌ক্-আস) ; মুখগহ্বরের মধ্য ও ওষ্ঠে লাগু দানায় ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকা, সবিরাম বা পালাজ্বরেই বাহ্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; জিহ্বা অধিক শুক হয় না, অথচ রোগী জিহ্বার অত্যন্ত শুকাইত্ব করে ; এক গ্রাহি তুল লাসিরা থাকিলে যেক্রপ হয়, জিহ্বার সেক্রপ অশুকৃত হওরা (সাইলিসি) ; দন্তনালী ; জিহ্বা শুষ্ক এবং দৃঢ় হয় কা উহা নোদান যায় না ; মুখের মধ্যে এবং জিহ্বার ফোকা এবং দৃঢ় হয় (লাইকোপ, মিউর-আস) ; মুখে আহার্য দ্রব্যাদি লাগিলেই অত্যন্ত জ্বালা করে এবং চিড়িক মায়ে ; মুখে তিক্ত স্বাদ, (ব্রাই, নাক্স-বন্, পাল্‌স, গাল্‌ক্) ; মুখে লোন্তা স্বাদ (মার্ক) ; মুখে একবারেই স্বাদ থাকে না (পাল্‌স) ; জিহ্বার ভারিবোধ, বাহার দরুণ কথা বলিতে অত্যন্ত কষ্ট অশুকৃত হয় (মিউর-আস, নাক্স-বন্) ; জিহ্বার কোষার ভায় কুক্কড়ী (মিউর-আস) ; জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত ( আণ্টি-কুড ) । গলার মধ্যে বেদনা বা টাটানি ; ডেলার ভায় কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, গলার মধ্যে সেক্রপ অশুকৃত হয় (হিপ্পালক্, বেল, নাক্স-বন্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে জ্বালা উঠিয়া বাপদায় ভায় জ্বালাশুকৃত ; গলা থেকুর দিলেই লোন্তা স্বাদের স্লেয়া নির্গমন ; কোন দ্রব্য গিলিবার সময় যেন গলনালী বন্ধ হয় ; গ্রীবার গ্রন্থির ক্ষীতি ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** অতিরিক্ত ক্ষুধা ; আহারের পর অত্যন্ত প্রাতিবোধ এবং ঘুমাইবার ইচ্ছা ; আহারের পর উদগার উঠা ; ক্ষুধা শূন্যতা (আন্, ক্যাক-কার্ক, চায়না, গাল্‌ক্) ; অত্যন্ত শ্রবণ হিকা ; কটিতে অরুচি,

বমিট রোগীর পূর্বে কট খাইতে অভ্যস্ত ভাল লাগিত (লাইকোপ্, সাই-  
ক্রেমেন, নাস্-বম্); কাকিতে অরুচি (লাইকোপ্, কন্-আস্); ভাবাকু  
খাওয়ার অভ্যাস থাকা সত্যও তামাকে অরুচি; অনিবার্য অভ্যস্ত প্রবল  
পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, রাস্-টর); বমনোবেগ এবং বুক জালা (লাই-  
কোপ্, নাস্-বম্); পাকস্থলীতে খিল ঘরার জ্বর সঙ্কোচক বেদনা; পাক-  
স্থলীতে পূর্ণ এবং জ্বালাহুতব; পাকস্থলীর মধ্যে অভ্যস্ত চাপা বোধ বাহ্য  
স্পর্শনেও অভ্যস্ত বেদনামুক্ত হয়; আহারের পর পাকস্থলীতে বদ্বন্দপানি;  
পাকস্থলীর হৃৎপ্রদেশের নিকটবর্তী মুখে এবং বক্ষস্থির পশ্চাত্তাগে ডেলার  
জ্বর কোন পর্যায় লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; মুখে টক স্বাদ; তিক্ত  
ত্রব্য খাওয়ার স্পৃহা (হিপ্-সাল্‌ক্); উদরস্থ আহার ত্রব্যাদি টক হইয়া গলা  
নিয়া উঠিয়া পড়ে (ল্যাক্, কন্); লবণ খাওয়ার ইচ্ছা (ক্যাক্-কার্ক্); আহা-  
রের পর (ক্লীলোকের) বুক জালা (ক্যাক্-কার্ক্, ক্রোকোশ্); প্রথমতঃ উদরস্থ  
আহার ত্রব্য এবং তৎপর পিত্তবমন। বক্রত প্রদেশে স্থচী বিধানের জ্বর  
বেদনা বা কসিয়া ধরা (আস্, ব্রাই, ক্যাক্-কার্ক্, ক্যানী-কার্ক্, মাক্,  
নাস্-বম্, শিগিয়া); গ্রীহা প্রদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা (নেট্রাম্-কার্ক্,  
সাল্‌ক্); উদরের ডাইন পার্শ্বে চিন্তিনে বেদনা; উদর স্তীত এবং বিস্তৃত;  
উদরে গড়গড়, কলকল শব্দ হওয়া এবং উহার মধ্যে স্থবিত বায়ুর সঞ্চার  
(লাইকোপ্, চারনা)।

মল এবং মলস্থার। কোষ্ঠ বদ্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্কভাবে  
সঙ্কোচনের জ্বর অনুভূত হয়; মল কঠিন, শুষ্ক এবং টুকরা টুকরা নেড় বাহ্য  
অতি কষ্টে নির্গত হয় (আসিন্-নিউর) এবং বাহ্য নির্গত হওয়ার সময় শুষ্ক-  
জ্বর কাটিয়া যায় (নাইটিক্-আস্) এবং তৎকরণ রক্ত পড়ে ও শুষ্কভাবে কত  
হওয়ার জ্বর জ্বালকরে এবং বেদনামুক্ত হয়; শুষ্কের মধ্যে চুলকানি এবং  
স্থচী বিধানের জ্বর অনুভূত হয়; কঠিন মলত্যাগের পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালাহু-  
তব; পর্যায়ক্রমে উদরাময় এবং কোষ্ঠবদ্ধ (আস্টি-ক্লুড্, শিবিনিক্, নাস্-  
বম্, পডোক্); বেদনাহীন জলবন্তরল ডেল (আস্, চারনা, পডোক্);  
কেবল দিনের বেলা জলবৎ কতকায়ক উদরাময় (পিট্টোন্); মলত্যাগের  
সময় এবং উহার পর শুষ্ক দ্বারে জ্বালাহুতব (আস্, ক্যাক্, আইরিস্)।

**মূত্রযন্ত্র ।** মূত্রত্যাগের সময় এবং উহার পর মূত্রনাশী দিয়া দেহের  
মায় পদার্থ নির্গমন (মাক্-কর) ; মূত্রত্যাগের পর মূত্রনাশীতে আলা এবং  
কর্জনবৎ বেদনা (ক্যাঙ্ক) ; চাশিলে মূত্রনাশীতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক টাটানি ;  
বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং প্রচুর পরিমাণে কিকা রক্তবিশিষ্ট জলবৎ মূত্র-  
ত্যাগ ; মূত্র মলিন এবং ঘোলাটেয়া ; চলিবার সময়, কাশিবার সময়, অথবা  
হাসিবার সময় অসাড়ো বা অনিচ্ছাপূর্বক মূত্র নির্গমন (কই, পাল্‌স্‌, স্কিক্‌) ;  
মূত্রে ইটের শুঁড়ার ন্যায় তলানি পড়ে (আর্গিকা, চারনা, লাইকোপ্‌, কস্‌) ;  
মূত্রে লাল বাণির কণার মায় তলানি পড়ে (লাইকোপ্‌) ।

**জননেন্দ্রিয় ।** পুরুষের পুরুষাঙ্গের মাধার আবরণক চর্কের প্রস্ফা  
এবং নদীতি (Phimosis) ; স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু স্ত্রীসহবাসের  
সময় পুরুষাঙ্গে শক্তি থাকেনা ; অগুরুষাধার এবং উহার নীচে অত্যন্ত  
চুলকানি । প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকের বোনিবার দিয়া যেন জরায়ু  
ঠেলিয়া বাহির হওয়ার উপক্রম হয়, বাহার দরুণ রোগী বোনি বার চাশিরা  
বসিতে বাধ্য হয় (বেল্‌, প্রাটিনা, লিলিরাম্‌, সিমিয়া) ; নিরবিত সন্ধ্যের  
অনেক পূর্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেকদিন ব্যাপিয়া রক্তঃস্রাব ;  
রক্তঃরোধ (একন্‌, সিমিসিক্‌, পাল্‌স্‌) ; যোনি ইত্যাদিতে চুলকানি (ক্যাঙ্ক্‌,  
কোনারাম্‌, মাক্‌) ; গোণে রক্তঃস্রাব এবং রক্তঃস্রাব বত গোণে হয় ততই  
পরিমাণে অল্প হয় (পাল্‌স্‌) ; রক্তঃস্রাবের সময় রোগী অত্যন্ত বিষম্ব এবং  
দুঃখিত থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বৎস্পন্দন এবং প্রাতঃকালে মাথা ধরা ;  
কতকারক, সবুজ বর্ণের দোতপ্রদর নিঃসরণ, চলিয়া বেড়াইবার সময় বাহা  
অগিক নির্গত হয় (বোবিটী) ।

**শ্বাস যন্ত্র ।** প্রাতঃকালে শ্বরভঙ্গ ; বায়ুনের উপরিভাগে মেঘা  
সঞ্চিত হওয়া ; প্রাতঃকালে কাশি ; সন্ধ্যার সময় বিছানায় শয়ন করিলে  
কাশি ; চোক গিলিলে কাশি ; গলার মধ্যে স্ফুঁহুড়ীর দরুণ কাশি ; কাশি  
সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফাটিয়া বাওয়ার ন্যায় বেদনা (ব্রাই, নাল্‌-বন্‌) এবং  
হাঁপানির ন্যায় শ্বাসকষ্ট ; কাশিতে কাশিতে উদরস্থ আহার জ্বায়াি বমন ;  
কাশির সঙ্গে সঙ্গে শুক্ৰ নিঃসারক মূত্রে বেদনা ; বুকে হঠা বিধানের ন্যায়  
(ব্রাই, ক্যালী-কার্ক্‌) বা টন্টনিয়া বেদনা (আর্গিকা, ব্যারাইটা-কার্ক্‌, কস্‌,

নাক্স-বম্ব, টানাস্); বৃক্কের ডাইন পার্শ্বের পেশীতে বাটরা ধরার ন্যায় বেদনা; নিশ্বাস টানিবার সময় বা কাশিবার সময় বৃক্কের হুচী বিধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, লাইকোপ্, পাল্‌স)।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী। হৃৎপিণ্ড যেন ঝড়ফড় করে (লিলিয়াম টাইগ্রি); নীচের দর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের দরে উঠার কালীন হৃৎস্পন্দন; বাম পার্শ্ব শরন করিলে হৃৎস্পন্দন (নেট্রাস্-কার্ক, কদ); হৃৎ-প্রদেশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হুচী বিধানের ন্যায় বেদনা (ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যালী-কার্ক); হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর কার্যঃঅসম (Intermittent) (কোনারাস্, ডিলিট্, ক্যালী-কার্ক), সামান্য নড়াচড়াতেই হৃৎস্পন্দন (ডিলিট্, আরোড্)।

শ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ। ভাবিলে যেকণ হয়, কোমরের পশ্চাৎ-দেশে সেরূপ বেদনা (আলোক্, বেণ্, মিথিসিক্, নাক্স-বম্ব); পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোন কঠিন তৌষকাদির উপর শরন করিয়া থাকিলে গাভীর উপশম হয় (রাস্-টজ্); শ্রীবা গঠন হয় বা উঠা নোরান যায় না; শ্রীবা এবং শাখার পশ্চাৎভাগে হুচী বিধানের জ্বাৰ অশুভূত হয়; প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিলেই কোমর সকালন করিবাবে অশক্তি; কোমরের পশ্চাৎদেশে লপ্পলপ্পনি।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি। বাহ্যতে চর্কলবোধ এবং উহাতে পক্ষাঘাতের জ্বাৰ তারিবোধ; লিখিবার সময় হাত কাঁপে (জিক্); হাতের চর্ক, বিশেষতঃ নখের চক্ঃপার্শ্ববর্তী স্থান, শুষ্ক এবং কাটাশূন্য; নখ বীকা হয় বা চমড়িয়া পড়ে (সাল্‌ক্, থুজা); মোচড়াইয়া পড়িলে বা খেঁত্-লিয়া গেলে বেক্রপ হয়, বাহির উর্দ্ধাংশে সেক্রপ বেদনা; হাত পা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের চর্কলতা এবং কাঁপনি; কুঁচ্কির সন্ধিতে হুচী বিধানের জ্বাৰ বেদনা; উরুদেশ, হাঁটু এবং পায়ের কলিয়া ধরার জ্বাৰ বেদনা; পা এবং পায়ের পাতার অত্যন্ত ভারিবোধ; চলিবার সময় পায়ের ত্বিহের পেশীতে বাটরা ধরা; হাঁটুর পশ্চাৎদেশে বাটরা ধরার জ্বাৰ অশুভূত হয় (অমিন্-মিউর); চলিয়া থাকিলে বা চলিয়া বেড়ানোর সময় পায়ের পাতার সন্ধি সকালনের সন্ধি থাকে না; পা এবং পায়ের পাতার অস্থিরতা, বাহ্যিক লক্ষণ

রোগী অনবরত পা নাড়িতে বাধ্য হয় (জিক্) ; বাহ পায়ের পাতার খিল-  
ধরা বা স্ফীতি বিধানের জ্ঞান বেদনা বা যাতনা ; পা এবং পায়ের পাতার  
অত্যন্ত ভারিবোধ ; পায়ের পাতা ক্ষীত (আস্, চায়না) ।

চর্ম্ম । চর্ম্মে চুলকানি এবং কুট্ কুটানি ; শরীরের স্থানে স্থানে আঘ-  
বাতের জ্বর লাল কুক্ষী বাহা অত্যন্ত চুলকার ; শারীরিক পরিশ্রমের পর  
গায় আমবাত বাহির হয় ; গায় দাঁদের জ্বর গোলাকার কুক্ষী (সিপিরা) ;  
গায় টেটারের (Totter) জ্বর কুক্ষী এবং উহা হইতে ক্ষতকারক কল্‌জানি  
পড়ে ও উহাতে পুরু চুমটী পড়িয়া কাটিয়া যায় ।

নিদ্রা । মনের বেলা নিদ্রাবেশ বা ঝিমান এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
বারবার হাঁট তোলা (নেট্রাক্‌কার্ক্) ; রাত্রিতে নিদ্রা শূন্যতা ; ঘুম ভাল হয়  
না এবং শয়ন করিলেই নানা প্রকারের চিন্তাব উদ্বেক হয় ; ঘুমের ঘোরে  
কীলা (নাইটিক্‌আস্) ; ঘুমের ঘোরে চিন্তা উৎপাদক স্পষ্ট বস্তু দেখা ;  
ঘুমের ঘোরে কথা বলা এবং অত্যন্ত অস্থিরতা (সিপিয়, সান্‌ফ্) ।

জ্বর । শীতলাবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল (ব্রাই) ; আভ্যন্তরিক অধিক  
শীতবোধ ; হাত এবং পায়ের পাতা বরফের জ্বাশ শীতল (জেল্‌স্) ; সমুদয়  
শরীরে এবং কপালে উষ্ণাভাব, নাকের গোড়ায় চাপাবোধ এবং প্রবল  
পিপাসা ; পূর্বাঙ্ক ১১ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত শীতবোধ ; পায়ের পাতা বা  
কোমরের পশ্চাৎভাগে শীত আরম্ভ হয় ; নখ নীল বর্ণ ; পিপাসা ; মাথা ধরা,  
বাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে ; বমনোদ্বেগ এবং বমন ।  
উষ্ণাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া এবং পিপাসা, পৃষ্ঠদেশে শীতবোধ এবং বোগল  
ও পায়ের পাতার তলায় ঘর্ম্ম ; প্রচুর ঘর্ম্ম, সামান্য নড়াচড়াতেই বাহ্যিক  
উদ্বেক ■■■ (ক্যাঙ্ক-কার্ক্, হিপ্-সাল্‌ফ্, ফস্) ; রাত্রিতে ঘর্ম্ম । জ্বরের বিরাম  
কালীন বস্তুত প্রদেশে স্ফীতি বিধানের জ্ঞান বেদনা, অলসবোধ বা পা ছাতি  
নাটি করা, শীর্ণ বা ক্লম হওয়া, স্খাঙ্কতি ফিকা বা শিটা ; কৃদা শূন্যতা ; ওষ্ঠে  
জ্বর-কোকা পড়ে । নাড়ী অননিবর্তিতরূপে স্পন্দন করে, বিশেষতঃ বাহ  
পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে ; সর্ব্বদা শীতবোধ এবং শরীরের স্বাভাবিক  
সম্ভাপের অভাব (গেডাম্) । পাণাজর, শীতবোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
পিপাসা, তৎপর জ্বর এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পিপাসা এবং প্রবল

করিতে হয় (আম্বা, কন্-আল, শিখিরা); পড়িতে পড়িতে, বাহা পড়া যায়, ভাহার ভাব ভুলিয়া যাওয়া এবং ঘুম পাওয়া; মনের মধ্যে ভাবের গোল-মাল হয়; কখন বলিবার সময় বা লিখিবার সময় অসংলগ্ন কথা বা শব্দ ব্যবহার করা (কাম, লাইকোপ); মরণ শক্তির হ্রাস বা বিনাশ (আম্বা, আনাকাড, লাক, মার্ক); নেসা হইলে বেক্রপ হয়, সর্বদা সেক্রপ ঘূমের ভাব (ওশিরাহ)।

**মস্তক ।** নেসা করিলে বেক্রপ হয়, সেক্রপ মাথা ঘোরা (ককিউলাস, লেডাম, মেক্সিরিয়াম); বসিয়া থাকা কালীন মাথা সমুখ দিকে হেলিয়া পড়ে; মাথার পূর্ণবোধ এবং বিস্তৃত হওয়ার ভ্রাস অমুভূত হয়, কিন্তু উহার দক্ষণ কোন প্রকারের বাতনা অমুভূত হয় না; মাথা বেন অভ্যস্ত বড় বলিয়া অমুভূত হয় এবং অনিচ্ছা পূর্বক বেন চতুর্দিকে ঘোরে, যাহার দক্ষণ রোগী হাত দিয়া ভাহার মাথা ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; মাথার বেদনা বা বাতনা হীন মণ্-দপানি (মোনবেন, পাল্-স্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইতে ভয়ের উল্লেখ হওয়া; কপালের দুই পার্শ্বে বেদনা, যাহার দক্ষণ মনে হয় বেন মস্তক চল্-লে হইয়া চলিবার সময় মাথার ছাড়ের মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগে (চায়না, হারোল, রাস্ট্রা); কপালের বাম দিকের উচ্চ স্থানের কোন এক নির্দিষ্ট অংশে চাপিয়া ধরার ভ্রাস বেদনা, অধিক থাকিলে বেক্রপ হয়, যাওয়ার পর সেক্রপ মাথা ঘরা (নিজ্-বম)।

**চক্ষু ।** চক্ষে শুকাহুত্ব, যাহার দক্ষণ অতি কষ্টে রোগী চক্ষুর পাতা সকালন করিতে পারে; অন্ধতা এবং তৎপব মূর্ছা; বস্ত্তগুলি স্বভাবিক অপেক্ষা অনেক বড় দেখায় (হায়েল) বা অনেক দূর দেখায়, অথবা স্বভাবিক অপেক্ষা অনেক ছোট দেখায় (প্রাটিনা)।

**মুখমণ্ডল ।** মুখমণ্ডল শিটা বা কিকা; চক্ষু নীল রেশা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য ।** মুখে চা খড়ির ভ্রাস বাহ; আহা-য়ের সময় গীতে বেদনা (কার্কো-আনিবেল, মার্ক); দন্ত শূল; গর্ভাবস্থার দন্তশূল; চিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা গন্ধা কালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দন্ত শূল; দুধ গহবর, দিহরা এবং গুট শুষ্ক (আস্, আই), কিন্তু শিশুরা থাকে



না (এপিস্, পাল্‌স্); কুখে লাল এবং গাঢ় রক্তাক্ত দৃশ্য; জিহবার পক্ষা-  
ঘাত; কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোরত্ব (কেই. ডাক্, জেল্‌স্, হারোস্)। গলায়  
মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কত্ব, কিন্তু পিপাসা থাকে না (এপিস্, ল্যাক্, পাল্‌স্);  
গিলিবার সহায়কারী পেশীর পক্ষাঘাত হেতু গিলিতে কঠোরত্ব (ওপিরাম্)।

পাকস্থলী এবং উদর। অত্যন্ত কুখা, কিন্তু পিপাসা একবারেই  
থাকে না (এপিস্, পাল্‌স্); বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে  
খুঁমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা (আক্টি-টার্ট্); গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বেষ্ট বা বমন  
(ক্যানী-কার্ক্, পাল্‌স্, সিপিরা); গাড়ীতে চাপিরা বেড়াইবার সময় বমন  
বমনোদ্বেষ্ট (ককিউল্); জরায়ুতে পেসারি (Pessaries) দিয়া জরায়ু  
স্বস্থানে রাখার দক্ষণ বমন বা বমনোদ্বেষ্ট; পাকস্থলীতে পূর্ণবোধ, যাহার  
দক্ষণ খাস প্রস্থানের ব্যাঘাত জন্মে; অভিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দক্ষণ  
পাকস্থলীর উত্তেজনা। কোন প্রকারের খারাল বস্ত থাকিলে, অথবা  
খারাল পাথর সজোরে বাহির হইলে যেকোন হয়, দ্রুততঃ সেক্ষণ চাপা বোধ;  
যকৃত প্রদেশে ভারি বোধ; উদর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং নিম্নত্ব হয়; আহা-  
রের পর উদরের ক্ষীণতা এবং বিস্তৃতি (চায়না, নেট্রাঙ্ক-কার্ক্, নাক্ষ-বম্);  
উদরে গড়্ গড়্, কল কল শব্দ হওয়া, যাহার দক্ষণ মনে হয় যেন শূল বেদনা  
ধরিবে।

মল। মল নরম বটে, কিন্তু উহা নির্গত হইতে অত্যন্ত কঠোরত্ব  
হয় (কার্কী-বেজ্, চায়না); শুষ্কের জটতা (আলান্, ক্যান্কার); উদরস্থ  
অক্লীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট, অথবা ডিমের ঘোঁটা কুসুমের স্তার  
স্তরল ভেদ বা উদরাময় এবং উহার উহার সঙ্গে সঙ্গে কুখা শূন্যতা এবং অত্যন্ত  
খুঁমের ইচ্ছা বা জিহান; গ্রীষ্মকালে শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের  
উক্ত প্রকারের উদরাময়।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের জীৱনবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু পুরুষকে  
ভালরূপে খাড়া হয় না, অথবা খাড়া হইলেও অনেকরূপে খাড়া থাকে না এবং  
পুরুষকে জীৱনবাসের শক্তি থাকে না। জীৱনোক্তের রক্তস্রাব নিরমিত  
সময়ে হয় না, অথবা সকল ব্যয়ে রক্তস্রাবের পরিমাণ এক প্রকার থাকে  
না; রক্ত প্রায়ই কাল্পে এবং গাঢ়; দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দক্ষণ জরায়ু

ক্ষীত এবং বিস্তৃত হয়; রক্তঃস্রাবের সময় রক্তস্রাব না হইয়া উহার পরিবর্তে  
বেতঃপ্রস্র নিঃসরণ; রক্তঃস্রাবের সময় পৃষ্ঠদেশে বেদনা বাহা মধ্য হইতে  
আরম্ভ হইয়া বহির্দেশে বিস্তৃত হয়; উদরের মধ্য দিয়া নিয়মিত কোন পথার্থ  
যেন তৈলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে  
অন্য প্রত্যঙ্গে কসিয়া ধরার জ্বর বেদনা; অস্বাভূতে প্রসব বেদনার জ্বর  
আকস্মিক বেদনা ।

শ্বাসবস্ত্র । বরভঙ্গ; বেদিক হইতে শীতল বাতাস বহে, সে দিকে  
বাওয়ার দ্রুপ গায় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবা হঠাৎ বরভঙ্গ; শুক কাশি এবং  
উহার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হওয়া; শয়ন করিলে বিছানার উচ্চতাতে  
শরীর উত্তপ্ত হইয়া কাশির উদ্রেক, বুকে অঁচাটা বোধ বা খাতনা; আহায়ে  
পর শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় ।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী । হৃৎপ্রদেশে রক্তাধিক্য হওয়ার জ্বর  
অনুভূত হয় এবং তৎপর মাথা এবং সমুদয় শরীরে রক্তাধিকার জ্বর অনুভূত  
হয়; হৃৎস্পন্দন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছার পর নিদ্রা; নাড়ী ক্ষুদ্র, মৃদু  
গতিবিশিষ্ট এবং চর্কল (ডিলিট) ।

পৃষ্ঠদেশ । তাকিলে যেরূপ হয়, কোমরের পশ্চাৎ বেগে সেরূপ  
বেদনা (আলোজ, বেল, সিমিসিক, নেটাম্-মিটর, কালী কার্ক, নাল্-  
বন্), বোড়ার চাপিয়া বেড়াইবার সময় কোমরের পশ্চাৎদেশে উক্ত  
প্রকারের বেদনা ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবশবোধ; ঠাণ্ডা বা আর্দ্র  
বাতাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সজ্জিত বেদনা (রডোডেগুন); নিহারাক্রান্ত হইলে  
বা বরফে পাকিলে যেরূপ হয়, অনুভূতে সেরূপ টনটনানি (আপারিকান) ।

নিদ্রা । সমুদয় অনুবেই নিদ্রাপ্রবেশ বা নিদ্রার ইচ্ছা বাহা বেদনা-  
দির আক্রমণের সময় অধিক হয়; অজ্ঞানবৎ নিদ্রা; নিদ্রার অনিবার্য  
ইচ্ছা (আন্টি-টার্ট, এপিস) ।

ব্যবহার । হিষ্টেরিয়া রোগের মূর্ছার আক্রমণ; মূর্ছার আক্রমণ;  
আবেগ; মূর্ছারোগ; দিহিয়া, আহািবহা গলনাগী এবং চক্ষুর পাতার  
লক্ষ্যমাত; মৃতবৎ মূর্ছা, অথচ শ্বাস প্রশ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের কার্যের কোন

ব্যাপ্ত জন্মে না (Cataplexy); গ্রীষ্মকালীর উদরাময়; কৃমি; বকুতের বিবৃদ্ধি; অজীর্ণ রোগ; গর্ভাবস্থায় বমনোদ্বগ বা বমন; দন্তশূল; অতিরিক্ত রক্তস্রাব ইত্যাদি অস্থখে নাক্স মস্কাটা ব্যবহার্য্য।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ। সকল প্রকার অস্থখেই নিদ্রার ইচ্ছা বা নিদ্রাবেশ; অত্যন্ত দুঃখতা এবং ক্রান্তিবোধ; সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাবেশ; সর্কদা মুচ্ছা বা ওয়ার ধাতু; সামান্য বেদনা যন্ত্রণাতেও মুচ্ছা বা ওয়া (হিপ্পোসাল্ফ); আক্কেপ; হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত হওয়ার ধাতু; মূত্ররোগের আক্কেপ এবং আক্কেপের সময় চেতনাবস্থার থাকি; সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা এবং গায় ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য না হওয়া (ককিউল, হিপ্পোসাল্ফ); রক্তাক্রান্ততা; শিশুগণের পেশী ক্লয় বা শীর্ণ হওয়া (Marasmus of children); শীত এবং আর্দ্র বাতাসে ভ্রান করিলে, গাড়ীতে চাপিল, আহার বা পানের পর, বদ্যাদি পানে অস্থখের বৃদ্ধি; ঘরের মধ্যে, অথবা উষ্ণ বাতাসে অস্থখের উপশম ইত্যাদি নাক্স মস্কাটার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। নাক্স মস্কাটার কার্যের সঙ্গে মছাশ, আমাকিউডা এবং আস্থার কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলাডোনি, ককিউলাস, কোনায়াম, ইয়েসিয়া, লাইকোপডিয়াম, নাক্স বমিকা, ওপিগাম, ফক্ষরাস, পাল্-সেটিলারাস্টেক্স, সিপিগা, সাইনিসিয়া, সাল্ফার, ট্রিমোনিয়ারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ। ক্যান্ফার, জেলসিমিয়াম, নাক্স বমিকা।

ডাইলুশন বিচার। ১ম, ২য় এবং ৩য় ডাইলুশনই সচরাচর অবিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া, মূত্ররোগ, মুচ্ছা ইত্যাদি স্বাভাবিক রোগে ১ম দশমিক ডাইলুশন বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিয়া রোগের মুচ্ছা বা আক্রমণের (Fits) সময় ইহার মূল আরোক ১০।১৫ ফোঁটা একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় ঢালিয়া রোগীকে সোঁকাইলে মুচ্ছার আক্রমণের স্থায়ীত্ব অনেক কমিতে দেখা যায়।

## ফাইটোলাকা ডিকাণ্ড ১,—ফাইটোল

(PHYTOLACCA DECANDRA,—PHYTOL)

উত্তর আমেরিকা এবং পর্তুগাল হইতে গ্রিনদেশ পর্যন্ত ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত প্রায় সমুদয় দেশেই এই গাছ জন্মে। আফ্রিকা এবং বার্কেরি ট্রেটসেও ইহা জন্মিয়া থাকে। মূল বা শিকড় এবং কল দিয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিকড় বা মূলের মূল আরোক ডাইলুট স্পিরিটে এবং কলের মূল আরোক বদা নিয়মে প্রফ্ স্পিরিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া। গ্রহি, প্রধানতঃ গলার মধ্য এবং স্তনের গ্রহি, বাহ্যিক কিল্লী (Serous membranes), শরীরের আঁশাল অংশ এবং স্নায়িক কিল্লীর উপর ইহার কার্য অতি প্রবল। অস্থির আবরণ কঠিন পর্দা (Periosteum) এবং চর্মের উপর ইহার কার্য অনেকটা পারা (Mercury), আরোডাইড্ অফ্ পটাস্, অথবা গরমীর ব্যারামের বিধের ভায়। ইহা সাধারণতঃ প্রদাহ উৎপাদন করে। শরীরের আঁশাল অংশে (Fibrous Tissues) এই প্রদাহ ব্যতীতবোধের প্রবাহের ভায় আকার ধারণ করে; স্নায়িক কিল্লী এবং গ্রহি গুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া উঠাতে পূর্ব এবং কত হয়। শাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপরও ইহার কার্য অত্যন্ত প্রবল, বাহার লক্ষণ বমন এবং ভেদ হইয়া থাকে।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

মন। আপন জীবনে বৈরাগ্য বা একবারে অমনোযোগ (চায়না, মার্ক্, কন্-আস্); শুষ্ক বায়ু বা সর্দিকা নিস্তক ভাবে থাকা (Melancholia) এবং রোগী মনে করে যেন সে নিস্তর মরিবে (একন্); সম্পূর্ণ লজ্জাহীনতা (হারোস্)।

মস্তক। মাথা ঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে কম বা বাপ্পা দেবা ও তন্দ্রাকণ টলিয়া পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা; মাথার পশ্চাৎ ভাগ এবং ঘেঁড় বেদনা; মাথার উপরিভাগে বেদনা এবং টাটানি, ডাইন পার্কেই বাহা অধিক অগ্রভূত হয়; মস্তকের পতীরতম অংশে টাটানি; মাথা ঘরা এবং

উহার সঙ্গে সঙ্গে গা বমী বমী করা (আইরিস্, নাক্স-বম্, পডোক্, বাক্স-নেরিয়া); কপালে, চক্ষুর দ্বারা উপরিভাগেই বেদনা অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; বেদনা প্রতি সম্ভ্রাহেই রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে (সাল্ফ্.); মাথা ধরা মাথার সমুখ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত হয়; কপালে বা মাথার উপরিভাগে চাপিয়া ধরার দ্বারা বেদনা বা ব্যতনা; কপালে ভারি বোধ এবং ঘুশ্-ঘুশ্ বেদনা; একপেশে মাথা ধরা (আধকপালীয়া মাথা ব্যাথা) (পাল্‌স্.); বামচক্ষু হইতে মাথার উপরিভাগে খোঁচা বিধার দ্বারা ব্যতনা; মাথার ঘটনিয়া ক্যাপিটিগের দ্বারা কুতুড়ী (Tinea Capitis) (প্রাক্, হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, নাইট্রিক্-অ্যাস্, সিপিরা)।

চক্ষু । চক্ষে চিড়িকমুরা এবং আলানুতব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া প্রচুর জল পড়া (ইউকেস্.); চক্ষে একটা বস্তু হইবার দ্বারা দেখার (অরাস্, বেল্, সিকুটা, ট্রায়ম্); বাগি প্রবেশ করিলে ঘেঁষা হয়, চক্ষে সেক্ষণ জ্বালা এবং চিড়িক মারা (অ্যাস্, কট্, ইগ্নেস্, নেট্রাম্ দিউর, সাল্ফ্.)।

নাসিকা । এক নাসার দ্বারা স্রোতা নির্গমন এবং অপর নাসার দ্বারা বন্ধ হইয়া থাকা; নাকের গোড়ার কদিয়া দ্বারা দ্বারা অনুভূত হয় (এক্‌ন); নাক দিয়া জলবৎ তরল স্রোতা নির্গমন এবং মধো মধো নাক বন্ধ হইয়া থাকা। সন্ধি লাগার উপক্রম হইলে ঘেঁষা হয়, নাক এবং চক্ষে সেক্ষণ ব্যতনা অনুভূত হয় (সিপা; ইউকেস্.); নাক দিয়া উগ্র বা ক্ষতকারক স্রোতা নির্গমন।

মুখমণ্ডল । মুখমণ্ডল মৃতবৎ মলিন (অ্যাস্, কার্বো-বেজ্, বিরেট্-আব্); মুখমণ্ডল শিঙা বা ফিকা; রাত্রিতে মুখমণ্ডল এবং মাথার হাত্তে বেদনা; ঐষা এবং মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন হেতু চুইটি (Chin) বক্ষাহার নিকট আকৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ উপরের দিকে উল্টান এবং দৃঢ়; বহুইচ্ছার; ঐষাদেশহ প্রদ্বির ক্ষীতি।

মুখগহ্বর এবং গলার মধ্য । মুখে ধাতুর স্বাদের দ্বারা স্বাদ (আর্জেন্ট্-নাইট্রিক্, মার্ক্, প্রাধাম্); পুড়িলে ঘেঁষা হয়, জিহবার পশ্চাৎ ভাগে সেক্ষণ অনুভূত হয় (বিরেট্-আব্); জিহবার পশ্চাৎ অনুভূত হয়;

জিহ্বায় উত্তর পাৰ্শ্বে দাঁদা লেপযুক্ত কোষা পড়ে এবং উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত লালবর্ণ হয় (আল্, রাস্ টঙ্ক্) ; গিলিবীর সময় জিহ্বার গোড়ার অত্যন্ত বেদনাত্ত্ব, মুখে প্রচুব পরিমাণে স্লেষ্মার সঞ্চায় ; স্লেষ্মা অত্যন্ত চট্‌চট্টিয়া আঠা, হরিত্রার আভাবুক্ত এবং স্বতীর জ্বাৰ ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে ধাতুর স্বাদ (কাম্) । গলার মধ্যে ডাটন অংশে বেদনা বা টাটানি ; মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে রক্তাধিক্য বা রক্তাববোধ এবং কাণ্‌চে লালবর্ণ, গিলিবীর সময় বাহার বৃদ্ধি হয় (বেল্, এইলাঙ্ক্, আন্‌জেন্‌ট্‌নাইট্রিক্, ব্যাপ্ট্, নেফা) ; গলার মধ্যে শুকাহুভব ; টন্‌সিল্‌ (Tonsils) ক্ষাত (বেল্) ; প্রান্ত-কালে গলার মধ্যে বেদনা এবং কোমল তালুকার (Soft Palate) ক্ষীতি ও মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে গাঢ়, দাঁদা এবং হরিত্রাবর্ণেব স্লেষ্মার সঞ্চায় ; ডেলাব জ্বার কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে গিলিবীর সময় গলার মধ্যে একপ অম্লভূত হয় (বেল্, ল্যাক্) ; ছাল উঠিয়া খেলেন বা চাটিয়া ফেলিলে বেক্রপ হয়, গলার মধ্য এবং টন্‌সিলে সেক্রপ অম্লভূত হয় (কার্কো, বেজ্, কষ্ট্, ফস্, পাল্‌স্, ক্রমেজ্) ; গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ, জ্বালা এবং টাটানি, চিড়িকমারী ও খশ্‌খশে বোধ ; গলার মধ্যে শুকাহুভব, বাহার দরুণ কাশির উদ্রেক হয় এবং বায়হার গলা খেকুর দিয়া গলার মধ্য পথিকাব ক্রিয়াব ইচ্ছা বা স্বভাব ; গিলিবীর সময় অত্যন্ত কষ্টাত্ত্ব ; প্রত্যেকবার গিলিতে চেষ্টা করার সময় ছুই কানের মধ্য দিয়া পোঁতা বিধাব স্ত্রীয়া যাতনা অম্লভূত হয়, গলার মধ্য এবং মুখগহ্বরের পশ্চাৎভাগে অপরিষ্কার, কাণ্‌চে ক্রম বন পদ্য বারো আবৃত (মার্ক্-আন্‌জেন্‌ট্‌নাইট্রিক্, আল্) ; উরু পদ্যটী বেন পোয়া চামড়ার জ্বার দেখায় ; গলার মধ্যের পশ্চাৎ ভাগ হইতে অতি কষ্টে পক্ পক্ কণিয়া স্লেষ্মা তোলা ; স্লেষ্মা বেন স্বতীর জ্বার ক্রিয়া পড়ে ; মাপা, ঘাড় এবং পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত শ্রবণ বেদনা ; অত্যন্ত বলকর ; দশা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মুচ্ছা বাওয়া ; ডিপ্পিরিয়া, উষ্ণ তপন দ্রব্য গিলিতে অশক্তি ; গলার মধ্যে আঁটবোধ, বাহার দরুণ বেগী কাঁপড় তওয়া উপক্রম হয় ; টন্‌সিলে ক্ষত ; গরমীর ব্যায়াম অনিত গলার মধ্যের অস্থাব ।

পাকস্থলী । উদ্যারে গলা দিয়া দৃশিত বায়ু এবং টক জল নির্গমন ; উদরত আহার দ্রব্য, পিত্ত, রক্ত এবং চট্‌চট্টিয়া আঠা লাল বমন এবং উহার

সঙ্গে সঙ্গে কাঠবর্মী বা উকি উঠা ও উহার দরুণ অত্যন্ত বাতনা, বাহার উপশমের আশায় রোগী মরিতে ইচ্ছা করে; খেতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, পাকস্থলীর মধ্যে সেরূপ বেদনা বা টাটানি; উদরের ডাইন পার্শ্বে বেদনা এবং টাটানি।

মল এবং মলদ্বার। অত্যন্ত প্রবল ভেদ এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে পেট কামড়ানী এবং উদরে খিল খরা; শ্লেষ্মা এবং রক্ত, অথবা অল্প টাঁচিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, সেরূপ কাঁচা মাছ মাংস ধোয়া জলের জায় ছেক্কা ছেক্কা পর্দার স্থায়ী পদার্থযুক্ত তরল ভেদ; রক্তস্রাবক অর্শ রোগ (Bleeding-piles) (হামায়েলিস্, নাইটিক্-অ্যাস্); শুষ্ক ক্ষত এবং ফাটাবৃত্ত (নেট্রাম্-নিউর, নাইটিক্-অ্যাস্)।

মূত্রযন্ত্র। মূত্রকোষ প্রদেশে ঘূর্ণঘূর্ণে বেদনা এবং টাটানি; মূত্র নিঃসারক নালীতে অত্যন্ত অস্থির বোধ; মূত্র আলবুমেনযুক্ত (Albuminous) (এপিস্, বাবেরিস্, হেলোনিয়াস্, টিরিবিঙ্ক্); মূত্র ইউরিক্ অ্যাসিড্ (Uric acid) এবং আলবুমেন্ (Albumen) মিশ্রিত (অস্মিয়ারা, ফস্, প্লাস্মা); মূত্রে চা খড়ি গোলায় জায় তলানি পড়ে।

জননেন্দ্রিয়। পুরুষের মুখ্য এবং গৌণ উপদংশ বা গরমীর ব্যারাম (Primary and Secondary Syphilis) (মার্ক্); পুরুষাঙ্গে গরমীর ঘা (Chancre) (মার্ক্, নাইটিক্-অ্যাস্); তরুণ এবং পুরাতন আঁকারের প্রমেহ রোগ (Gonorrhoea & Gleet)। স্ত্রীলোকের বায়বান এবং অতিরিক্ত বজ্রস্রাব (পাল্, আনোনিয়াম্-কার্ক্, অ্যাস্, গোবাল্, ক্যাক্-কার্ক্, বেল্, নাক্স-বম্); জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia) (একন্, বেল্, হামায়েলিস্, ফেরান্, ইপিকাক্, সাবাইন!) ; শুনের প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পুঁয় হওয়া (হিপ্-সাল্ফ্, মার্ক্, সাইলিনিস্, সাল্ফ্); শুনে ফোড়ার জায় ক্ষীতি বা ফোড়া এবং উহাতে নালী বা (সাইলিনিস্); শুনের বোঁটার ছাল উঠিয়া যাওয়ার জায় ক্ষত, ফাটাবৃত্ত এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি (গ্রাফ্); শুনের স্থানে স্থানে গ্রন্থির জায় ক্ষীতি, বাহার দরুণ শুনে অত্যন্ত বেদনার উত্থেক হয়।

শ্বাসযন্ত্র। শ্বরভঙ্গ এবং শ্বরশূন্যতা (ফস্); বায়ুনল এবং বায়ু

নগের উপরিভাগে শুষ্ক এবং আলানুভব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্যে অত্যন্ত আঁটবোধ ; শুষ্ক খুশ্ খুশে কাশি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মধ্যে খুশ্ খুশি ; বায়নলের উপরিভাগে হৃৎ হৃদী বা আঁটার বহা গলনালীর উপরিভাগের হই পাখের শুষ্কতার দ্রুণ কাশি, রাত্রিতে শয়ন করিলেই বাহার বৃদ্ধি হয় (পাল্‌স) ; আত্ম বাতাস বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পাঁজরার হাড়ের নধাবর্তী পেশীর বাত রোগ ; বুক এবং উহার পাখে কন্‌কনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ; বন্ধন্থির মধ্য দিয়া বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ; হৃৎপ্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া বেদনার হঠাৎ আক্রমণ ; হৃৎস্নায়ুশূল (Angina pectoris), বাহার বেদনা ডাইন বাহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

গ্রীবা এবং পৃষ্ঠদেশ । গ্রীবার ডাইন পাখের গ্রন্থির কঠিনতা ; গ্রীবা শক্ত বা উহা নোহান যায় না, বাহা ডাইন পাখে এবং বিভ্রান্ত শয়ন করিলে, অথবা রাত্রি দুই প্রহরের পর বৃদ্ধি হয় ; টন্‌সিল্‌ ক্ষীত ; প্রভি-কিন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠদেশ শক্ত হয় বা উহা নোহান যায় না ; কোমর এবং উহার নিম্ন প্রদেশে অনবরত খুশ্ খুশে বেদনা ; কোমরের পেশী বাত, বাটার দ্রুণ উক্ত প্রদেশে অনবরত কন্‌কনিয়া বেদনা বর্তমান থাকে ; কোমরের নিম্ন প্রদেশ হইতে উরু বা কুঁচ্কির সন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা ।

অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, হাত, পা ইত্যাদি । উত্তর কক্ষই অনবরত কন্‌কন্‌ করে ; ডাইন হৃৎকের সন্ধিতে খোঁচা বিহার জ্বর বেদনা, বাহার দ্রুণ রোগী বাহ উপর দিকে উঠাইতে পারে না ; হাতের আঙ্গুলের সন্ধি ক্ষীত, কঠিন এবং চক্‌চকে ; বাহতে অসাড়বোধ বা উহার সকালনে অশক্তি ; বাহ এবং হাতে বাতের বেদনার জ্বর বেদনা । কুঁচ্কির সন্ধিতে কনিয়া ধরার জ্বর বা কঠনবৎ বেদনা, বাহার দ্রুণ পা সোজা বা প্রসারণ করিয়া শয়ন করিতে না পারিয়া রোগী পা শুটাইয়া থাকে ; বাম হাঁটুর সন্ধিতে বাত রোগ এবং উহার দ্রুণ হাঁটুর পশ্চাৎভাগে কনিয়া থরা বা খাট হওয়ার জ্বর অস্বস্তি হয় ; বাম কুঁচ্কির সন্ধির পুরাতন আকারের বাত রোগ ; পায় শক্ত এবং গ্রন্থির জ্বর ক্ষীতি (Nodes) ; রাত্রিতে পায়ের টিব্বা (Tibia) নামক নখির আবরক কঠিন পর্কার (Periosteum) বেদনা (বাক্) ।

চর্ম্ম । পায় পরবীর ব্যাধির অন্তত হৃৎদী এবং বা ; সৌণ উপদেশ



এবং উপদংশের তৃতীয়াবস্থা (Secondary and Tertiary Syphilis) (মার্ক, নাইট্রিক-আস); গায় আঁইসের দ্বার মরা চর্ম বিশিষ্ট ফুসুড়ী; টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea capitis); লুপাস (Lupus); ক্ষত; দাক্তি ধোঁগাদি কামানের দক্ষণ ফুসুড়ী (Barber's itch), অথবা কোন প্রকারের ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ হেতু ক্ষত; দাঁদের দ্বার গোলাকার ফুসুড়ী; গায় পূর্ব লবণিত ফুসুড়ী ।

ব্যবহার । গরমীর ব্যারাম জনিত অস্থখ; অস্থির আবরণক কঠিন পর্দার প্রদাহ (Periostitis); বাতরোগ; দািমূল; চক্ষুর বোজক বিরী প্রদাহ (Conjunctivitis); গ্রন্থির প্রদাহ, ক্ষীতি এবং উহাতে পূর্ব হওয়া, বিশেষতঃ স্তনের; ডিপ্তিথিয়া; গলার মধ্যে ক্ষত হওয়ার দক্ষণ বেদনা; সূত্রকোষের ব্রাইটস্ ডিজিজ (Bright's disease); অর্শরোগ; অরাসু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব (Metrorrhagia); গরমীর বা; টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea capitis) এবং মরা চর্মের দ্বার খোলা বিশিষ্ট ফুসুড়ী; টুন্সিল্ প্রদাহ এবং উহাতে ক্ষত ইত্যাদি রোগে কাইটোলাকা ব্যবহার্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । বাত রোগের দাক্ত (ব্রাই, সিনিটিক, রাস-টজ); গরমীর ব্যারাম জনিত বাত রোগ; অত্যন্ত বলকর এবং অব-সন্নতা; সমুদ্র পেশীতে টাটানি (একন্, ব্রাই); গ্রন্থি এবং অস্থির প্রদাহ ও ক্ষীতি (আসফিটিডা, হিপ-সাল্, মার্ক, নাইট্রিক-আস); আক্রান্ত স্থানে চাপিয়া ধরা বা খোঁচা বিধার দ্বার বেদনা এবং টাটানি; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়ে (পাল্‌স); কোড়া হইলে এই ঔষধ লেবনে কোড়ার পূর্ব শীত শীত উৎপন্ন হয় (ল্যাক্, মার্ক, নাইলিসি); আত্ম বায়ুতে এবং রাত্রিতে অস্থখের বৃদ্ধি এবং শমন করিয়া থাকিলে প্রায় সমুদ্র উপক্ৰবের দ্বার বা উপশন ইত্যাদি কাইটোলাকার কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত ।

সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ । কাইটোলাকার কার্যের সঙ্গে মেজি-রিয়াস, গোরেকাম্, ক্যালী আরোডাইড্, ক্যালী বাইক্রমিকাম্, মার্কিউরি-রাস্, নাইট্রিক আসিড্ এবং রাস্ টক্সের বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিবেদক ঔষধ । হৃৎ এবং লবণ; ইগ্নেসিয়া এবং সাল্‌ফার

কাইটোলাকার প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত । অধিক মাত্রায় খাইয়া অসুস্থ হইলে ওপিয়াম্ এবং ফাফি ব্যবস্থা ।

ডাইলুশন বিচার । ১ম এবং ৩য় দশমিক ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে ইহার মূল আরোক ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । স্তনের প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে মূল আরোক ২।১ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । স্তনের গ্রন্থিবৎ প্রদাহ এবং ক্ষীতিতে ইহার মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ২ কাঁচা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া নেকড়া খানি আঁকান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে প্রদাহ এবং যন্ত্রণাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায় । অনেক সময় কেবল এই প্রকারে বাহ্য প্রয়োগেই প্রদাহ এবং ক্ষীতি ২৩ দিনের মধ্যে মিলাইয়া বাইতে দেখা যায় । গর্ভমীত ব্যারান জনিত অসুখেও মূল আরোক ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় ।

## প্লাটিনাম্ মেটেলিকাম্,—প্লাটিনা,—প্লাটিন।

(PLATINUM METALLICUM,—PLATINA,—PLAT.)

কোন এক বিশ্বস্থ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে আদিত প্লাটিনাম্ (Platinum) ক্রয় করিয়া উহাতে যথা নিয়মে স্থগার অব মিক্ মিশ্রিত করিয়া ইহার ৩য় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত গুঁড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে । ৩য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া হইতে ৪র্থ দশমিক ক্রমের আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । আরবিব যণ্ডীর উপর কার্য করার শক্তি থাকার বরূপ ইহা স্নায়ু স্পর্শ জ্ঞান শক্তিকে অবসন্ন করিয়া উহার স্পর্শ জ্ঞান রহিততা (Anæsthesia), জড়তা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি উৎপাদন করে । জীলোকের জননোগ্রহের কার্যের বৈলক্ষণ্য বা অসুস্থ, চিষ্ট্রিন্না জনিত রোগ এবং শুকবাণ্ড (Melancholia) উক্ত প্রকার কাণ্ডে ফল মাত্র ।

## সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । ব্রহ্ম; রোগীর (জীলোক) নিকট তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট বলিয়া অনুভূত হয় এবং সে মনে করে যেন সকলের মন এবং শরীর তাহার মন ও শরীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট; চপলতা, অহঙ্কার এবং উগ্র স্বভাব (ল্যাক্, ট্রামন্); রোগী সকলকেই ঘৃণা করে; সর্বদা মানসিক অবসন্নতা, দুঃখের ভাব, ভয় এবং কাদিবার ইচ্ছা (ইয়েন্স, নেটাম্-মিউর, পাল্‌স্, নাক্স-মক্), সন্ধ্যার সময় এবং ঘরের মধ্যে থাকিলে যাহার বৃদ্ধি হয় এবং বহির্লীয়াতে যাহার উপশম হয়; একবার বিমর্ষতাব, আবার উহার পরক্ষণেই উল্লাস (ক্রোকাশ্, ইগ্নেন্‌স্, নাক্স-মক্, ট্রামন্); রোগী মনে করে যেন একগতে তাহার আর কেহ নাই এবং তদরূপ তাহার নিকট তাহার জীবন যেন শান্ত বলিয়া অনুভূত হয়; রোগী মনে করে যেন তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, অথচ তাহার মরিবার ইচ্ছা থাকে না বা মৃত্যু ভয়; সর্বদা বিড়্ বিড়্ করা, খিট্ খিট্ করা এবং বক্ বক্ করার স্বভাব; সকল কথা বা কার্কেই রোগী চটিয়া উঠে (ক্যাপ্‌স্, নাক্স-বন্‌, ট্রাক্স); পর্যায় ক্রমে শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

মস্তক । মাথার আঁটিয়া বা ঘাটিয়া ধরার ভার অবশবোধ, যাহা কপালেই অধিক অনুভূত হয়; দুই আঁটিয়া রাখিলে বা কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যে রূপ হয়, কপালের ছুই পার্শ্বে, গালের হাড়ের উপর, সেরূপ কসিয়া ধরার ভার যাতনা বা অবশবোধ হয় (একন্‌, আন্টি-টার্ট, চেলিডন্‌, জেল্‌স্, মার্ক্); মাথার হাড় সমুচিত হইলে অথবা একটা ভারি পদার্থ লাগিয়া থাকিলে যে রূপ হয়, মাথার উপরিভাগে সেরূপ বেদনা এবং অবশবোধ; কপালের এক পার্শ্বে অসাড় বা অবশবোধ বাহা নিয় মাড়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং উক্ত স্থানে ঠাণ্ডা বোধ।

চক্ষু । চক্ষুর পাতার আক্সেলিক স্পন্দন (জেল্‌স্); বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট দেখায়; বস্তুগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায় (হায়োস্)।

কর্ণ । কানের মধ্যে সোঁ সোঁ, টন্‌ টন্‌ শব্দ হয়।

নাসিকা । নাক এবং নাকের গোড়ায় অবশবোধ এবং খিলখিল

বসিয়া থাকিলে কোমরের পশ্চাৎদেশের নিম্ন ভাগ, এবং ওহু বারের উপরি-  
ভাগে অবশবোধ ।

**অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।** কসিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেক্রপ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে  
সেক্রপ কসিয়া ধরার স্তায় বেদনা, উরুদেশেই বাচা অধিক অমুভূত হয় ; অঙ্গ  
প্রত্যঙ্গে খিল ধরার স্তায় যাতনা ; অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং সন্ধিতে অবশবোধ ;  
হাঁটু এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে অত্যন্ত দুর্বলবোধ ; বসিয়া থাকিলে  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থিরতা এবং কাঁপনি ও পা এবং পায়ের পাতায় প্রান্তিবোধ ।

**নিদ্রা ।** প্রবল হাঁই তোলার অত্যন্ত ইচ্ছা ; রাত্রিতে জাগিয়া  
কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অশক্তি ।

**ব্যবহার ।** হিষ্টিরিয়া এবং টিষ্টিরিয়া জ্বিত অস্থখ ; শুকুবাযু (Melan-  
cholia) ; উন্মত্ততা ; হায়ুশূণ ; আক্ষেপ বা কন্‌বাল্‌সন্‌স (Convulsions) ;  
পক্ষাঘাত ; সীসা জনিত বা চিত্রকরের শূন বেদনা (Lead or painter's  
colic) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; পুরুষের স্ত্রীসহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা এবং স্ত্রীলোকের  
পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা ; স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ (Ovaritis) ;  
অরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ; বোনি ইত্যাদির চুলকানি ; গর্ভস্রাব  
জনিত তন্নানক রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার স্তায় মুচ্ছা  
ইত্যাদি অস্থখে প্রাটিনা ব্যবহার্য্য ।

**বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।** অত্যন্ত দুর্বলতা এবং বলহীন ;  
কখন কখন সমুদয় শরীরের কাঁপনিব স্তায় অমুভূত হয় ; শরীরের নানা  
স্থানে বেদনা এবং অবশবোধ ; চোঁচ বিধিলে বেক্রপ হয়, শরীরের স্থানে স্থানে  
দগ্ধপ্‌করার স্তায় সেক্রপ যাতনা (আনাকার্ড) ; হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোক  
এবং শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের আক্ষেপিক অস্থখ (আসাকিটিডা,  
ইগ্‌নেস) ; স্ত্রী বা পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়ার দরুণ আক্ষেপ  
(Spasms) ; স্ত্রীলোকের অস্থখে বিশেষ উপকারী ; সন্ধ্যার সময়, বরের মধ্যে  
থাকিলে অথবা বিশ্রাম কালীন অস্থখের বৃদ্ধি এবং নড়াচড়া ও বহির্ন্যূতে  
অস্থখের উপশম ইত্যাদি প্রাটিনামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ  
এখা পরিগণিত ।

সমন্ত্রণ বিশিষ্ট ঔষধ । প্রাটিনার কার্য্যের সঙ্গে অরায়ু, পাল :

সেটিল, ইগ্নেসিয়া, প্লাস্টিম, আনাকিটিডা এবং ক্রোকাশের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এতদ্বির কোন কোন বিষয়ে ইহার কার্যের সঙ্গে বেলাডোনা, লাইকোপডিয়াম্, রাস্ট্রুম্, সাবাডিলা, দিপিয়া এবং সাল-কারের কার্যের সাদৃশ্য আছে।

প্রতিষেধক ঔষধ । পালসেটিল।

ডাইলুশন বিচার । ৬, ১২ এবং ৩০ ডাইলুশনই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার মেরার (Dr. Meyer) এই ঔষধের ২য় এবং ৩য় ক্রমের গুঁড়া ব্যবহার করিয়াই যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন। ডাক্তার হিউজ (Dr. Hughes), ডাক্তার মেয়ারের উক্ত মতের পোষকতা করেন। ৩ষ্ঠ ডাইলুশন ব্যবহার করিয়াই লেখক যথোচিত ফল পাইয়া থাকেন।

### পডোফিলাম্ পেল্টেটাম্,—পডোফ্

(*PODOPHYLLUM PELTATUM*,—*PODO.*)

ক্যানাডা, লুসিয়ানা এবং ইউনাইটেড্ স্টেট্‌সের অন্তান্ত স্থানের জঙ্গলা ভূমি এবং বাগানে এই গাছ জন্মে। শুক মূল বা শিকড় যথা নিয়মে ২০° ওয়ার ফ্রক্‌স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা মূল বা শিকড় দিয়াও ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণ ক্রিয়া । যকৃত এবং পরিপাক কার্যের সহায়কারী বস্তাদির উপর ইহার বিশেষ কার্য আছে। স্নৈয়িক ঝিল্লী এবং গ্রন্থিগুলি বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ উহার নিঃসরণের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং অনেক সময় উচ্চাতে ক্ষত এবং পূর্ব ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে টকগন্ধযুক্ত, সবুজবর্ণের পিত্তযুক্ত উদরাময় উৎপাদন করা এই ঔষধের একটা বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা গুণ যথো পরিগণিত।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

মন । মানসিক অবসন্নতা (বোবিটা, চেলিডন, আইরিস, নাক্স-বম্, পাল্‌স্); রোগী কল্পনা করে যে সে মরিবে অথবা তাহার কোন রোগ হইবে (একন, আর্স্, নাক্স-বম্, ফাইটোল, সিকেল)।

**মস্তক ।** মাথাধোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুখমুখে টলিয়া পড়ার ভাব ; প্রাতঃকালে মাথা বরা এবং উহার সঙ্গে মাথার উপরিতানে উকাহুতব ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে (নাক্স-বম্, পাল্‌ক্) ; মাথা ধোরা এবং মাথা কিম্ কিম্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ৰ ঠিক উপরি-ভাগে পূর্ণ বোধ ; পর্যায়ক্রমে মাথাধরা এবং উদরাময় ; মাথাধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারবার এদিক ওদিক মাথা ঘূর্ণণ এবং কোথানি বা কোকানি (ডেলিরিয়াম্) ; শিত্তর দাঁত উঠার সময় উক্ত প্রকারের মাথা ধরা অথবা উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অন্তর্ভ ।

**নাসিকা ।** নাকে টাটানি এবং নাকের উপর ত্রণের দ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুহুড়ী ।

**মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে ।** দাঁতে দাঁতে কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করা (আস্, সিকুটা, ডেলিরিয়াম্, হায়োস্, সিনা, ট্র্যামন্, সিকেল্), রাতিতে, বিশেষতঃ শিওগণের দাঁত উঠার সময় উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া; মুখে অত্যন্ত হর্ষক (অর্নিকা, অরায়, হিপ্-সাল্‌ক্, আরোড্, মার্ক্, নাক্স-বম্) ; জিহ্বা লাল লেপযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে অত্যন্ত বিষাদ (নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; মুখে প্রচুর পরিমাণে চট্‌চটিয়া আটাল স্ফেয়ার স্ফার (ক্যালী-বাই, মার্ক্-কর) ; প্রাতঃকালে জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের শুষ্কতা (ম্যাগ্-কার্ক্, পাল্‌স্, স্পাইকেল্) । গলার মধ্যে শুষ্ক বোধ (এপিস্, আস্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌স্) ; গলার মধ্যে বেদনা বা কত বাহা ডাটন পার্বে আরম্ভ হইয়া বাস পার্বে কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল, হিপ্-সাল্‌ক্, ক্যালী-বাই) ; গলগণ্ড (Goitre) (ক্যাল্‌ক্-কার্ক্, আরোড্, স্পাইক্) ।

**পাকস্থলী এবং উদর ।** কৃথা বা কচি শুষ্কতা (আলাস্, আস্, চারনা, কস্) ; উক্ত দ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা (অ্যান্টি-টার্ট্, হিপ্-সাল্‌ক্, কস্) ; একবারে অধিক পরিমাণ শীতল জল পানের ইচ্ছা (ব্রাই) ; উদরস্থ আটার ভগ্নাদি গলা দিয়া উঠিয়া পড়ে (কস্) ; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে হর্ষক এবং বিষাদ ; মুখ দিয়া জল উঠা (Water-brash) (আস্, নাক্স-বম্, কস্) ; উদরস্থ উক্ত টক দ্রব্য বিশিষ্ট দূষিত বায়ু উঠা ; কাঠবিষ বা উকিউঠা ; বুক জ্বালা এবং বুক দিয়া জল উঠা এবং উহার সঙ্গে

সঙ্গে পাকস্থলীতে উচ্চাহতব (আস্); বমনোদ্বেষ্ট এবং বমন ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ণবোধ; উদরস্থ আহার অব্যাদি বমন (ইপিকাক্, নাক্স-বম্, কস্); গত পিত্ত বমন (একন্, আস্, প্রাটিওলা, আইরিস্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকা (হামামেলিস্, এপিরাস্, নাক্স-বম্, ট্রাইমন্); উচ্চ, ফেগাটুক্ স্নেহা বমন; উদরোৰ্দ্ধ প্রদেশের গভীরতম অংশে খালি বোধ। উদরে পূর্ণ বোধ এবং উদরের ডাইন পার্শ্বে টাটানি; ক্ষীত স্থানে বেদনা এবং পূর্ণবোধ (একন্, বার্কেরিস্, ইউপেট্-পাক্); শেষ রাত্রি ৩টার সময় সরলা-য়ের মধ্যে গড়্ গড়্, কলকল শব্দ হওয়া এবং তৎপর উদরাময়; অস্ত্রের মধ্যে খিলধরার ভাঙ্গ বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদর প্রদেশস্থ পেশী কোঁচকাইয়া যায় (আলোজ্, চেলিডন্, প্রাখাম্); রাত্রি ১০টার সময় এবং প্রাতঃকালে ৫ টার সময় অস্ত্রের মধ্যে খিলধরা (চেলিডন্); অস্ত্রের মধ্যে উচ্চাহতব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগের ইচ্ছা; বকৃতের পুরাতন প্রস্রাৱ; অনিবার্য কোষ্ঠ বন্ধ; কামলরোগ; পিত্তশিলায় (Gall-stones) সঙ্গে সঙ্গে কামল রোগ; পাকস্থলী হইতে বকৃতের পিত্তাধার প্রদেশ পর্যন্ত বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বমনোদ্বেষ্ট; কামল রোগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বকৃতে রক্তাধিক্য বা বক্তাবরোধ; বকৃত প্রদেশে পূর্ণবোধ, টাটানি এবং বেদনা; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধ এবং উদরাময়।

মল এবং মলদ্বার। অর্শরোগ (আস্, নাক্স-বম্, সালফ্); ওহবার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani) (আস্); মলত্যাগের সময়, অথবা সামান্য নড়া চড়াতে ওহবার বাহির হইয়া পড়া (ইগ্‌নেস্); মল-ত্যাগের পর মুচ্ছার ভাব এবং উদরে খালিবোধ; অতি প্রকৃষে উদরাময় (আলোজ্, হুফর, ক্রুমল্, সালফ্); মল সবুল্‌বণ, টকগন্ধযুক্ত (হিপ্-সালফ্) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদরে অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রুতি বাহুর স্ফার (আলোজ্, লাইকোপ্, কলোস্); অতিরিক্ত আহার বা পানের পর উদরাময় (কলোস্); পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধ এবং উদরাময় (সিমিসিঙ্ক্, আটি-ক্রুড্, নাক্স-বম্, নেট্রাম্-আস্); মল স্বাভাবিক, কিন্তু দিনের বেলা বান্-বার মলত্যাগ এবং তদ্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্বলতা; বারবার বেদনা বা কষ্টহীন (হুফর), জলবৎ তরল (চারনা), দুর্গন্ধযুক্ত তরল মল বাহা অতি বেগে নির্গত

হয় (আস্) ; হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ; বীৰ্য্য সাগর জায় তলানি  
বিশিষ্ট তরল ভেদ ; সবুজ, টকগন্ধযুক্ত, জলবৎ তরল ভেদ ; হরিদ্রাবর্ণের  
উদরস্থ অক্লীৰ্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট তরল ভেদ (আৰ্ণিকা, চায়না) ;  
মল স্বেদা মিশ্রিত এবং ঘর্গন্ধযুক্ত ; মল রক্তের ছিট যুক্ত এবং উহার সঙ্গে  
সঙ্গে কৌৰ পাড়া ; কেবল প্রাতঃকালে কাল্‌চে মল ভেদ ; মলত্যাগের পূর্বে  
পেট কামড়াগী বা শূল বেদনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক ঘারে জ্বালা ও  
বেদনা ; মল কাছার রক্ত বিশিষ্ট অথবা চাখড়ি গোলায় জায় (বেল্,  
ক্যাঙ্ক-কার্ক্, হিগ্‌-সালফ্, নিরিকা) ; পুরাতন আকারের উদরাময়,  
প্রাতঃকালে বাহ্যর বৃদ্ধি হয় (ক্যালী-বাই, নেট্রাম্-সাল্‌ফ্, কন্, সাল্‌ফ্) ;  
প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ এবং স্রোতের জায় প্রবল বেগে শুষ্ক ঘার  
দ্বারা মল নির্গত হওয়া (বাট্টোকা, প্লাম্) ; শিশুগণের বারম্বার চাখড়ি  
গোলায় জায় ঘর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কাটবিহি, উকিউঠা  
এবং প্রবল পিপাসা (ক্যাল্‌ক-কার্ক্) ; গৌদ গোলায় জায় মলভেদ  
(আলোক্, কল্‌চ্, হেলিবোরাস্) ; মলত্যাগের সময় এবং উহার পর  
শুষ্কহার বাহির হইরা পড়া ; আহার বা পানের পর উদরাময়ের বৃদ্ধি ।

মূত্রযন্ত্র । রাত্রিতে ঘুমেরবোধে অসাড় হা অনিচ্ছা পূর্বক মূত্র-  
ত্যাগ ; রাত্রিতে বারম্বার মূত্রত্যাগ (কট্, পাল্‌স্) ; মূত্রাবরোধ (একন্,  
বেল, পাল্‌স্) ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । যুৱতী বালিকাগণের রক্তরোধ (পাল্‌স্) ;  
ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা, ডাইন ডিম্বকোষ প্রদেশেই বাহা অধিক অশ্রুত  
হয় (বেল্) ; অরাত্তিতে বেদনা ; মল ত্যাগের সময় মনে হয় যেন অরাত্তি  
ইত্যাদি বোনিহার দ্বারা সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইবে ; অরাত্তি স্থান দ্রষ্ট হওয়া  
(Prolapsus Uteri) এবং শুষ্ককণ অরাত্তি যেন নিয়মিতক নাহিতেছে একপ  
টন্‌ টন্‌ করা বা বেদনা (কোনারাস্, নিপিয়া) ; বেষ্টপ্রদর এবং শুষ্ককণ  
বোনি হার দ্বারা গাঢ়, বহু স্বেদা নির্গমন (আলাস্) এবং কোষ্ঠ বদ্ধ ; বাস  
ডিম্বকোষ প্রদেশে কন্‌ কন্‌ করা এবং উহাতে অবশবোধ ।

নিদ্রা । সর্পদা নিদ্রার তাব বা নিদ্রার ইচ্ছা, পূর্বাঙ্কেই বাহা  
অধিক অশ্রুত হয় (আবিস্) ; বিনান বা অর্দ্ধ নিদ্রা এবং চক্ষু অর্দ্ধ খোলা



রাখিয়া নিজা বাঁওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে কৌধানি বা কৌকানি এবং বৌদ্ধভানি, বিশেষতঃ শিশুগণের ; প্রাতঃকালে যুম ভাজিলে রোগী আপনাকে আপনি স্মৃষ্ মনে করে না ; অহির নিজা, প্রধানতঃ প্রথম রাত্রে ( কন্ ) ।

ব্যবহার । পিত্তাধিকা জনিত রোগ ; যকৃতের সকল প্রকারের অসুখ ; যকৃতে রক্তাধিকা বা রক্তাবরোধ ; যকৃতের তরুণ এবং পুরাতন আকারের প্রদাহ ; পিত্তশিলা (Gall-stones) ; কামলরোগ ; উদরাময় ; শিশুগণের ওলাউঠা, বিশেষতঃ শিশুগণের প্রথম দীর্ঘ উঠার সময় ; গুল্মহার বাহির হইয়া পড়া (Prolapsus ani) ; সীসা জনিত বা চিত্রকরের শূল বেদনা (Lead or painter's colic) ; কোষ্ঠবদ্ধ ; অর্শরোগ ; পিত্তজ্বর ; অজীর্ণ রোগ ; পাকস্থলী প্রদাহ ; সুখদিয়া লাল পড়া ; পারার (Mercury) অপব্যবহার জনিত অসুখ ; মস্তিষ্কের শোণ জনিত অসুখ ; যুবতী বালিকা-গণের রক্তরোধ ; শ্বেতপদম ; জ্বীলোকের ডিম্বকোষ প্রদাহ ইত্যাদি অসুখে পডোফিলাম্ ব্যবহার্য্য ।

বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ । পেটে বেদনাহীন ওলাউঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পারের ডিম, পারের পাড়া এবং উক্ৰদেশে প্রবল খিল ধরা ; প্রাতঃকালে অসুখের ( প্রধানতঃ পেটের অসুখের ) বৃদ্ধি ; শেষ রাত্রি ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অসুখের বৃদ্ধি ; শরীরের কোন কোন স্থানে হঠাৎ ঝাঁকা বা ঝাঁকি লাগার ভ্রাম বেদনা বা যাতনা ; ডাইন স্বক্কাহির নিম্ন প্রবেশে বেদনা (এসিস) ; প্রাতঃকালে দুই স্বক্কাহির মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা ; পিত্তাধিকা বাতু ; প্রধানতঃ পারার অপব্যবহারের পর ইত্যাদি পডোফিলামের কতকগুলি বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ ।

সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ । পডোফিলামের সাধারণ কার্যের সঙ্গে কলচিকাম্, আইরিস্, পেপ্টেণ্ড্রা এবং মার্কিউরিয়ামের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে ইহার কার্যের সঙ্গে এপিস্, ফুফ্র, কমেসের কার্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে । এতদ্বির অত্যন্ত বিবরে ইহার কার্যের সঙ্গে আলোজ্, আইওনিয়া, চেগিডোনিয়াম্, হেলিবোরাস্, নাইট্রিক্ আনিড্, নাক্স-বমিকা, পাল্গেটিনা, সালফার এবং বিরেট্টাম্ আল্‌বামের কার্যের সাদৃশ্য আছে ।

প্রতিষেধক ঔষধ । ল্যাকটিক অ্যাসিড, নাক্স, বরিকা ।

ডাইলুশন বিচার । ৩য় এবং ৬ষ্ঠ ডাইলুশনই সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ও, ১ ফোঁটা মাত্রার, ব্যবহার করিয়া থাকেন । অনিবার্য্য কোষ্ঠ বদ্ধে, যাহাতে মল ভ্যাগের সময় শুষ্কতার বাহির হইয়া পড়ে, এই ঔষধের মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রার ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় একপ অনেক রোগীর চিকিৎসার লেখক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ।

### সিকেল্ কর্নুটাম্,-(আর্গট্),-সিকেল্

(SECALE CORNUTUM,—ERGOT,—SEC. CORN)

কাঁচা আর্গট্ সংগ্রহ করিয়া উহা বখা নিরনে প্রক্ স্পিরিটে ভিজাইয়া ইহার মূল আরোক প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

সাধারণ ক্রিয়া । মস্তিষ্ক এবং কনেক্কা মজ্জার উপর ইহার কার্য্য অতি প্রবল । ইহা দ্বারা নিবাক্ত হইলে আক্ষেপ এবং গ্যাংগ্রিণ্ (Gangrene) হয় । দ্বাদ্ধ নিবাক্ত হইয়া আক্ষেপ হয় এবং রক্ত দূষিত হইয়া গ্যাংগ্রিণ্ হয় । ইহা মস্তিষ্ক এবং কনেক্কা মজ্জার রক্তাৱতা উৎপাদন করিয়া আক্ষেপ উৎপাদন করে । জ্রীলোকের জরায়ু উপরও ইহার কার্য্য অত্যন্ত প্রবল । জাঁণ শূত্র পেশীর উপরও ইহার কার্য্য অতি প্রবল, যাহার দরুণ জরায়ুতে আক্ষেপ বা স্কেচনের উদ্বেক হইয়া গর্ভবতী জ্রীলোকের গর্ভ নষ্ট বা গর্ভশ্রাব হইয়া থাকে । গর্ভশ্রাব নিবারণার্থ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার সিকেল্ কর্নুটাম্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতএব গর্ভাবস্থায় কোন রোগ চিকিৎসার সিকেল্ কর্নুটাম্ ব্যবহৃত করিতে হইলে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । নতুনা গর্ভশ্রাব হওয়া আশঙ্ক্য নহে । এই ঔষধের বিশেষ কার্য্যের বিবরণ নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক লক্ষণগুলিতেই বিদ্যুত রূপে লিখিত হইল ।

### সাধারণ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

**মন।** অর্ধ নিদ্রিতাবস্থা এবং নিস্তব্ধতাব বা অবসন্নতা (বেল্, ওপিয়াম্); সমুদ্র ইঞ্জিরের চেতনীর হ্রাস; মূহ বা উগ্র প্রলাপ (বেল্, হায়োস্, ট্রায়মন্); মনের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং মূহাত্ম্য (একন্, আস্)।

**মস্তক।** অবসন্নতা; মাথা ঘোরা; মাথার ভারিবোধ এবং তৎপর মাথায় টুটনানি।

**চক্ষু।** চক্ষু বসিয়া যায়; চক্ষু নীলবর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত (ফস্, চায়না, ক্যালী-আয়োড্, সাল্ফ্); চক্ষু পাংলের ভায় কট্ মটে দৃষ্টি এবং স্থির ভাব বিশিষ্ট (ক্যাস্, বেল্, হায়োস্); চক্ষু অন্ধকার দেখা; চক্ষু; তারা সাধারণতঃ বিস্তৃত (বেল্, হায়োস্, ট্রায়মন্)।

**কর্ণ।** কানে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনা (ক্যাল্ফ-ফার্ম্, মার্ক্, ফস্-আস্, সাল্ফ্); ওলাউঠার পর কানে কম শুনা।

**মুখমণ্ডল।** মুখমণ্ডল শিটা, বসিয়া যায়, উদ্বিগ্ন এবং মূহত্ব (আস্, ক্যাস্কার, বিরেট্, আল্ফ্)।

**মুখগহ্বর।** জিহ্বা হয় পরিক্রান্ত, নতুবা সান্না লেপযুক্ত (আন্টি-ক্রুড, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্ফ্); মুখ অত্যন্ত দুর্গন্ধ (আর্নিকা, হিপ-সাল্ফ্, মাক্, ক্যালী-আয়োড্); জিহ্বার পক্ষাঘাত হইলে যেক্রপ হয়, সেক্রপ কাঁপাইয়া মূহত্বের এবং অস্পষ্টভাবে কথা বলা (কষ্ট্, জেল্ফ্, হায়োস্, ট্রায়মন্)।

**গলার মধ্য।** গলার মধ্য শুক (এপিস্, আস্, নাক্স-মক্)।

**পাকস্থলী এবং উদর।** হঠাৎ ক্ষুধা (ব্রাই, ফেরাম্, সিনা, লাইকোপ্), অনিবার্য এবং পিপাসা (একন্, আস্, ব্রাই, রাস্-টক্স, সাল্ফ্); বমনো-দ্বিগ্ন এবং বমনের ইচ্ছা (আন্টি-টাইট্, হিপিকাক্); পিত্তযুক্ত পদার্থ বমন (ব্রাই, নাক্স-বম্, আইরিস্, পডোফ্); শ্লেষ্মা বমন; কাল্চে কটাবর্ণের ভাজা কাফি শুঁড়ার ভায় তরল পদার্থ বমন (কোনারাম্); পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠা বা রক্ত বমন (হামামেলিস্, ফস্); পাকস্থলীতে অত্যন্ত আঁটা বোধ ও উদ্বিগ্ন বা ব্যতনা এবং পাকস্থলী স্পর্শ করিলে অত্যন্ত

বেদনাবৃত্ত হয়; কোন একটা ভারি বস্তু লাগিয়া থাকিলে যেক্রপ হয়, পাকস্থলীতে সেক্রপ চাপা বোধ (একন্. আর্স্, ব্রাই, নাক্স-বম্, পাল্‌ম্) ; পাকস্থলীতে আলা বোধ (আর্স্, ক্যাঙ্ক্., আইরিস্, সান্সুনেরিয়া) । উদর ক্ষীত এবং বিস্তৃত (আর্গিকা, চায়না, কন্) ; যকৃতের বিবৃদ্ধি, শ্রবাহ এবং উহা পচিয়া যাওয়া ; অত্যন্ত কষ্টদায়ক শূল বেদনা এবং তদ্রূপ আক্কেপ বা কন্‌বাল্‌সন্স্ (Convulsions) ; টন্ টন্ করিয়া নিরন্তর সজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেক্রপ হয়, তলপেটে অনবরত সেক্রপ ঘটনা ; উদর এবং পৃষ্ঠদেশে ঠাণ্ডা বোধ ; তলপেটে বেদনা ।

মল এবং মলছার । শুষ্ক এবং শুষ্ক দ্বারের পক্ষাঘাত ; উদরায়-ময় ; বারবার কটাবর্ণের চট্‌চটিয়া তরল মল ভেদ ; কাল্‌চে মল ভেদ (আর্স্) ; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল ভেদ (আর্স্, অ্যাসাকিটিডা) ; হরিদ্রার আভাবিত্ত সবুজ বর্ণের তরল ভেদ : অসাড় বা অনিচ্ছাপূর্বক তরল ভেদ (আর্গিকা, আর্স্, হায়োস্) ; অত্যন্ত দুর্গন্ধ কারক তরল ভেদ (চায়না, কন্) ; স্যাংগাতিক আকারের ওলাউঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পতনাবস্থার লক্ষণ, মুখমণ্ডল বসিয়া যাওয়া, বিকৃত হওয়া, বাহাতে ওঠই অধিক বিকৃত হয় ; রক্তভেদ (হামোয়েলিস্, ওপিয়াম্) । কোষ্ঠবদ্ধ (আলান্, ব্রাই, ক্যাঙ্ক্.-কার্ক্., নাক্স-বম্, ওপিয়াম্, কন্, কমেস্, সাল্‌ফ্.) ।

মূত্রযন্ত্র । মূত্রাধারের পক্ষাঘাত (বেল্, কষ্ট্, কোনাগাম্, কায়োস্) ; মূত্রাবরোধ (বেল্, ওপিয়াম্, ট্রামন্) ; মূত্র ফিকা এবং কলবৎ (নেট্রোম্-মিউর, ফস্-আস্, ট্রাকিস্) ।

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় । অনেক দিন ব্যাপিয়া প্রচুর রক্তস্রাব (আমন্-কার্ক্, আর্স্, ক্যাঙ্ক্.-কার্ক্, ক্যালী-কার্ক্, নাক্স-বম্) ; জগায় হইতে রক্ত স্রাব, সামান্ত নড়াচড়াতেই বাহার প্রাচী হয় (ইরিজারগ্, স্যাবাইনা) ; রক্ত কাল্‌চে, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ; কোন বস্তু সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেক্রপ হয়, জরায়ুতে সেক্রপ বেদনা বা ব্যতনা (কলোফিগাম্) ; জরায়ু এবং ডাইন ভিষকোষে রক্তাবরোধ এবং স্পর্শনেও উহাতে বেদনা ; পর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া, বিশেষতঃ তৃতীয় মাসে (স্যাবাইনা) ; পর্ভস্রাবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত হয় না (কলোফিগাম্) ; জরায়ু চট্টে কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত